

皇漢醫學叢書

類聚方

吉益東洞
編

皇漢
醫書
叢學

類聚方

人民衛生出版社

皇漢醫學叢書
類聚方

開本: 787 X 1092/32 印張: 2 1/2 字數: 37千字

吉益東洞 編

人民衛生出版社出版

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

• 北京崇文區錢子胡同三十六號 •

人民衛生出版社印刷 • 新華書店發行
長春印刷廠

統一書號: 14048 • 0793

定價: (9) 0.30元

1955年11月新1版—第1次印刷

1956年6月新1版—第2次印刷

(長春版) 印數: 4,001—7,000

出版者的話

我國醫學，遠自公元六世紀已開始傳入日本。此後，歷代以來，日本又不斷派遣留學生到我國專門學習我國醫學。這樣，日本在「明治維新」以前的醫學，幾乎完全與我國醫學相一致；即在「明治維新」以後，有關中醫中藥的著作，也是繼承我國醫學思想體系的。因此，在今天看來，這類著作，對進一步加強學習與研究我國醫學遺產，仍有一定的參考價值。

「皇漢醫學叢書」原書，係輯自日本人所研究的中醫、中藥著作，初版於一九三六年發行。現為適應社會需要，本社決定重予出版。惟原書係合訂本，卷帙過大，不便選購。今為便利讀者閱讀，在形式上盡量利用原有紙型，不作大的變動，祇精簡其一部分參考價值不大的著作，其餘一律改為單行本，以符節約和實用的原則。

本書因係日本人的著作，書中除了有如稱我國為「漢土」、「彼邦」，稱中醫藥為「漢醫」、「漢藥」等一類不適宜的辭彙外，尤其是有許多觀點，不符合今天的要求。這是由於社會制度不同和著者受歷史條件的限制所產生的。因此，希望讀者要端正觀點，用科學的批判態度來閱讀和研究，以作為一種輔助學習的資料，而更好地接受祖國醫學遺產。

類聚方目錄

桂枝湯	一	桂枝加龍骨牡蠣湯	六
桂枝加桂湯	三	桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯	七
桂枝加芍藥湯	三	桂枝加芍藥生薑人參湯	七
桂枝去芍藥湯	三	桂枝二麻黃一湯	七
桂枝加葛根湯	三	桂枝二「越婢」一湯	八
栝蒌桂枝湯	四	桂枝麻黃各半湯	八
桂枝加黃耆湯	四	小建中湯	八
桂枝加厚朴杏子湯	四	黃耆「建中」湯	九
烏頭桂枝湯	四	黃耆桂枝五物湯	九
桂枝加附子湯	五	黃耆桂枝苦酒湯	九
桂枝去芍藥加附子湯	五	桂枝甘草湯	一〇
桂枝附子湯	五	半夏散	一〇
桂枝附子去桂加朮湯	六	桂枝甘草附子湯	一〇
桂枝去桂加苓朮湯	六	桂枝甘草龍骨牡蠣湯	一〇
桂薑棗草黃辛附湯	六	桂枝人參湯	一〇
桂枝去芍藥加皂莢湯	六	人參湯	一一
		茯苓甘草湯	一一

茯苓杏仁甘草湯	一二	栝蘘瞿麥丸	一七
茯苓戎鹽湯	一二	麻黃湯	一八
葵子茯苓散	一二	麻黃加朮湯	一八
苓薑朮甘湯	一二	麻黃甘草湯	一九
苓桂朮甘湯	一三	麻黃附子甘草湯	一九
苓桂甘棗湯	一三	麻黃附子細辛湯	一九
苓桂五味甘草湯	一三	麻黃杏仁甘草石膏湯	一九
苓甘五味薑辛湯	一四	麻黃杏仁薏苡甘草湯	二〇
苓甘薑味辛夏仁湯	一四	牡蠣湯	二〇
苓甘薑味辛夏仁湯	一四	麻黃醇酒湯	二〇
苓甘薑味辛夏仁黃湯	一四	半夏麻黃丸	二一
茯苓澤瀉湯	一五	小青龍湯	二一
澤瀉湯	一五	大青龍湯	二一
五苓散	一五	文蛤湯	二二
茵陳五苓散	一六	「越婢」湯	二二
猪苓湯	一六	「越婢」加朮湯	二三
猪苓散	一六	「越婢」加半夏湯	二三
牡蠣澤瀉散	一七	葛根湯	二三
八味丸	一七	葛根加半夏湯	二三

葛根黃連黃芩湯·····	二四	大黃甘遂湯·····	三五
小柴胡湯·····	二四	抵當湯·····	三五
柴胡加芒消湯·····	二七	抵當丸·····	三六
柴胡去半夏加枳實湯·····	二七	橘皮大黃朴消湯·····	三六
柴胡加桂枝湯·····	二七	大黃消石湯·····	三六
柴胡薑桂湯·····	二七	大黃牡丹皮湯·····	三六
柴胡龍骨牡蠣湯·····	二八	大黃甘草湯·····	三七
大柴胡湯·····	二八	調胃承氣湯·····	三七
白虎湯·····	二九	桃核「承氣」湯·····	三八
白虎加人參湯·····	二九	下瘀血湯·····	三八
白虎加桂枝湯·····	三〇	土瓜根散·····	三八
小「承氣」湯·····	三〇	甘草湯·····	三九
厚朴三物湯·····	三一	桔梗湯·····	三九
厚朴七物湯·····	三一	排膿湯·····	三九
大「承氣」湯·····	三二	芍藥甘草湯·····	三九
大黃黃連「瀉心」湯·····	三四	甘遂半夏湯·····	四〇
「瀉心」湯·····	三四	芍藥甘草附子湯·····	四〇
附子「瀉心」湯·····	三五	甘麥大棗湯·····	四〇
大黃附子湯·····	三五	甘草粉蜜湯·····	四〇

生薑甘草湯	四〇	梔子豉湯	四六
甘草乾薑湯	四一	梔子甘草豉湯	四七
四逆湯	四一	梔子生薑豉湯	四七
「通脈」四逆湯	四二	枳實梔子豉湯	四七
四逆加人參湯	四三	梔子大黃豉湯	四八
茯苓四逆湯	四三	茵陳蒿湯	四八
「通脈」四逆加猪膽汁湯	四三	梔子藥皮湯	四八
乾薑附子湯	四三	梔子厚朴湯	四八
附子粳米湯	四三	梔子乾薑湯	四九
蔥莖附子散	四四	大陷胸湯	四九
蔥莖附子敗漿散	四四	大陷胸丸	五〇
白通湯	四四	小陷胸湯	五〇
白通加猪膽汁湯	四四	栝蒌薤白白酒湯	五〇
大烏頭煎	四五	栝蒌薤白半夏湯	五〇
烏頭湯	四五	瓜蒂散	五一
赤丸	四五	文蛤散	五一
真武湯	四六	大半夏湯	五一
附子湯	四六	小半夏湯	五二
天雄散	四六	生薑半夏湯	五二

小半夏加茯苓湯	五二	白頭翁加甘草阿膠湯	五七
半夏苦酒湯	五二	木防己湯	五七
半夏厚朴湯	五三	木防己去石膏加茯苓芒消湯	五八
半夏乾薑散	五三	防己茯苓湯	五八
乾薑人參半夏丸	五三	防己黃耆湯	五八
半夏「瀉心」湯	五三	枳實芍藥散	五八
甘草「瀉心」湯	五四	枳朮湯	五九
生薑「瀉心」湯	五四	排膿散	五九
吳茱萸湯	五四	桂枝枳實生薑湯	五九
厚朴生薑半夏甘草人參湯	五五	枳實薤白桂枝湯	五九
黃連湯	五五	橘皮枳實生薑湯	六〇
乾薑黃連黃芩人參湯	五五	茯苓飲	六〇
大「建中」湯	五五	橘皮竹茹湯	六〇
黃連阿膠湯	五六	橘皮湯	六〇
黃芩湯	五六	桂枝茯苓丸	六〇
黃芩加半夏生薑湯	五六	芎歸膠艾湯	六一
六物黃芩湯	五六	旋覆花代赭石湯	六一
三物黃芩湯	五六	赤石脂禹餘糧湯	六一
白頭翁湯	五七	桃花湯	六二

大豬膽汁	六二	麥門冬湯	六六
蜜煎導	六二	雄黃熏	六六
酸棗仁湯	六二	頭風摩散	六七
葶蘆大棗「瀉肺」湯	六三	皂莢丸	六七
麻子仁丸	六三	葶莖湯	六七
己椒蘆黃丸	六三	當歸生薑羊肉湯	六七
蜀漆散	六三	瘧灰散	六七
十棗湯	六四	滑石白魚散	六八
桔梗白散	六四	猪膏髮煎	六八
走馬湯	六五	柏葉湯	六八
備急圓	六五	黃土湯	六八
礬石湯	六五	雞屎白散	六八
消礬散	六五	蜘蛛散	六八
礬石丸	六六	當歸芍藥散	六九
蛇床子散	六六	歸母苦參丸	六九
不試方十八方	六六	狼牙湯	六九
竹葉石膏方	六六	小兒疳蟲蝕齒方	六九

類聚方

藝陽吉益爲則公言撰

門人石陽中邨貞甫子亭校

桂枝湯。桂枝三兩。芍藥三兩。甘草二兩。生薑二兩。大棗
枚。

右五味。㕮咀。以水七升。微火煮取三升。去滓。適寒溫。服一升。已。須臾。飲熱稀粥一升餘。以助藥力。溫覆令一時許。遍身絳漿。微似有汗者。益佳。不可令如水淋漓。病必不除。若一服汗出。病差。停後服。不必盡劑。若不汗。更服。依前法。又不汗。後服小促其間。半日許。令三服盡。若病重者。一日一夜服。周時觀之。服一劑盡。病證猶在者。更作服。若汗不出者。乃服至二三劑。

「太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者熱自發。陰弱者汗自出。當發惡寒。」
「浙浙惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。」
「太陽病。」頭痛發熱。汗出惡風者。
「太陽病下之後。」其氣上衝者。可與桂枝湯。方用前法。若不上衝者。不可與之。
「太陽病。」初服桂枝湯。反煩不解者。先刺風池。風府。卻與桂枝湯。則愈。
「太陽病。」三日已發汗。若吐。若下。若溫鍼。仍不解者。此爲壞病。桂枝不中與也。觀其脈證。知犯何逆。隨證治之。
「桂枝本爲解肌。若其人脈浮緊。發熱汗不出者。不可與也。常須識此。勿令誤也。」
「若酒客病。不可與桂枝湯。得湯則嘔。以酒客不喜甘。」

故也。」「太陽病外證未解，脈浮弱者，當以汗解。」「太陽病外證未解者，不可下也。下之爲逆，欲解外者。」「太陽病先發汗不解而復下之，脈浮者不愈，浮爲在外，而反下之，故令不愈。今脈浮，故知在外，當須解外則愈。」「病常自汗出者，此爲榮氣和，榮氣和者，外不諧，以衛氣不共榮氣和諧故爾。以榮行脈中，衛行脈外，復發其汗，榮衛和則愈。」病人「藏」無他病，時發熱，「自汗出而不愈者，此衛氣不和也。」先其時發汗則愈。「傷寒」不大便六七日，頭痛有熱者，與承氣湯。「其小便清者，知不在裏，仍在表也，當須發汗。若頭痛者，必衄。」「傷寒」發汗解，半日許，復煩，脈浮數者，「可更發汗。」「傷寒」醫下之，續得下利，清穀不止，身疼痛者，「急當救裏。」後身疼痛，清便自調者，「急當救表，救裏」宜四逆湯。「救表」桂枝湯。「太陽病」發熱汗出者，「此爲榮弱衛強，故使汗出，欲救邪風者。」「傷寒」大下後，復發汗，心下痞，惡寒者，「表」未解也，不可攻痞。當先解表，解表乃可攻痞，解表」宜桂枝湯，攻痞宜大黃黃連瀉心湯。「陽明病」脈遲汗出多，微惡寒者，「表未解也，可發汗。」病人煩熱，汗出則解，又如瘧狀，日晡所發熱者，「屬陽明也。」脈實者，宜下之。脈浮虛者，宜發汗下之，與大承氣湯發汗，宜桂枝湯。「太陰病，脈浮者，可發汗。」下利，腹脹滿，身體疼痛者，「先溫其裏，乃攻其表，溫裏」四逆湯，「攻表」桂枝湯。吐利止而身痛不休者，當消息和解。

「其外。」宜桂枝湯。少和之。下利後，身疼痛，清便自調者，「急當救表。」宜桂枝湯。「發汗。」「婦人得平脈，陰脈小弱，其人渴，不能食，無寒熱，名妊娠。」桂枝湯主之。於法六十日，當有此證，設有醫治逆者，卻一月加吐下者，則絕之。」「產後中風」續之數十日不解，頭微痛，惡寒，時時有熱，心下悶，乾嘔，汗出雖久，「陽旦」證續在耳。服桂枝湯，大汗出，脈洪大者，與桂枝湯如前法。「若形如瘧」日再發者，汗出必解。宜桂枝二麻黃一湯。

桂枝加桂湯。於桂枝湯方內加桂二兩。

燒鍼令其汗，鍼處被寒，核起而赤者，必發奔豚氣，從少腹上衝心者，灸其核上各一壯，與桂枝加桂湯。

桂枝加芍藥湯。於桂枝湯方內加芍藥三兩。

「本太陽病，醫反下之，因爾。」腹滿時痛者，「屬太陰也。」
焉則按。腹滿時痛者，即拘急而痛也。是以芍藥為主爾。

桂枝去芍藥湯。於桂枝湯方內去芍藥。

「太陽病下之後，」脈促胸滿者，桂枝去芍藥湯主之。若微惡寒者，去芍藥方中加附子湯主之。

焉則按。不拘急故去芍藥也。

桂枝加葛根湯。於桂枝湯方內加葛根四兩。

「太陽病。」項背強几几，反汗出惡風者。

栝蒌桂枝湯。於桂枝湯方內加栝蒌根二兩。

「太陽病。」其證備。身體強。几几然。「脈反沈遲。此爲瘧。」

爲則按。桂枝湯之症。而渴者主之。

桂枝加黃耆湯。於桂枝湯方內加黃耆二兩。

「黃汗之病。兩脛自冷。假令發熱。此屬歷節。食已汗出。又身常暮盜汗出者。此勞氣也。若汗出已。反發熱者。久久其身必甲錯。發熱不止者。必生惡瘡。若身重汗出。已輒輕者。久久必身瞶。即胸中痛。」又從腰以上必汗出。下無汗。腰髀弛痛。如有物在皮中狀。劇者。不能食。身疼重煩躁。小便不利。此「爲黃汗。」「諸病黃家。但利其小便。假令脈浮。當以汗解之。」

爲則按。黃耆主治皮膚水氣。可考藥徵。

桂枝加芍藥大黃湯。於桂枝加芍藥方內加大黃一兩。

「本太陽病。醫反下之。因爾。」腹滿時痛者。「屬太陰也。」桂枝加芍藥湯主之。大實痛者。桂枝加大黃主之。

爲則按。桂枝加大黃湯。因桂枝加芍藥湯加大黃者也。故方名從之。

桂枝加厚朴杏子湯。於桂枝湯方內加厚朴二兩。杏子五十個。喘家作

桂枝湯。加厚朴杏子佳。「太陽病下之。」微喘者。「表未解故也。」

爲則按。當有胸滿證。

烏頭桂枝湯。烏頭五枚。

右一味。以蜜二斤煎減半去滓。以桂枝湯五合解之。得一升後。初服二合。不知卽服三合。又不知。復加至五合。其知者。如醉狀得吐者。爲中病。「寒疝」一腹中痛逆冷。手足不仁。若身疼痛。灸刺諸藥不能治。抵當用此方。

爲則按。是烏頭煎而合桂枝湯方也。當列烏頭煎方下。今列之桂枝加附子湯者。示其異也。又按煎法可依大烏頭煎之法。

桂枝加附子湯。

於桂枝湯方內加附子一枚。

「太陽病。」發汗遂漏不止。其人惡風。小便難。四支微急。難以屈伸者。桂枝去芍藥加附子湯。

於桂枝去芍藥湯方內加附子一枚。

「太陽病下之後。」脈促胸滿者。桂枝去芍藥湯主之。若微惡寒者。去芍藥方中加附子湯主之。

桂枝附子湯。

桂枝四兩。

附子三枚。

生薑三兩。

甘草二兩。

大棗

十二枚。

右五味。以水六升。煮取二升。去滓。分溫三服。

「傷寒八九日。風濕相搏。」身體疼煩。不能自轉側。不嘔。不渴。「脈浮虛而澹者。」桂枝附子湯主之。若其人大便鞭。小便自利者。去桂枝加朮湯主之。

爲則按。當有上衝證。此方與桂枝去芍藥加附子湯同。而治與方名異。彼方下曰。微惡寒。此方下曰。身體疼煩。惡寒輕。疼煩重。獨在附子之多少也已。

桂枝附子去桂加朮湯。於桂枝附子湯方內去桂加朮四兩。

右五味。以水三升。煮取一升。去滓。分溫三服。一服覺身痺。半日許再服。三服都盡。其人如冒狀。勿怪。卽是朮附並走皮中。逐水氣。未得除故耳。「傷寒」一八九日。風濕相搏。身體疼痛。不能自轉側。不嘔。不渴。「脈浮虛而澹者。」桂枝附子湯主之。若大便秘。小便自利者。

爲則按。桂枝附子湯證。而無衝逆者也。

桂枝去桂加苓朮湯。於桂枝湯方內去桂加苓朮各三兩。

服桂枝湯。或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱。無汗。心下滿。微痛。小便不利者。

爲則按。當有心下悸之證。

桂薑棗草黃辛附湯。桂枝三兩。生薑三兩。甘草二兩。大棗十二

枚。麻黃。細辛各二兩。附子一枚。

右七味。以水七升。煮麻黃。去上沫。內諸藥。煮取二升。分溫三服。當汗出。如蟲行皮中。卽愈。「氣分。」心下堅大如盤。邊如旋杯。「水飲所作。」

爲則按。證不備也。此方合桂枝去芍藥湯與麻黃附子細辛湯也。證當於二方之下求也。藥微有辨。

桂枝去芍藥加皂莢湯。於桂枝湯方內。去芍藥加皂莢二枚。

「肺痿」吐涎沫者。

桂枝加龍骨牡蠣湯。於桂枝湯方內。加龍骨牡蠣各三兩。

夫失精家。小腹弦急。陰頭寒。目眩髮落。「脈極虛。芤遲爲清穀。亡血失

精。脈得諸。孔動微緊。」男子失精。女子夢交。

爲則按。當有胸腹動證。

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯。

桂枝三兩。甘草二兩。生薑三兩。牡蠣五兩。大棗十二枚。蜀

漆三兩。龍骨四兩。

右爲末。以水一斗二升。先煮蜀漆。減二升。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。

「傷寒脈浮。」醫以火迫卻之。「亡陽」必驚狂。起臥不安者。「火邪也。」

爲則按。當有胸腹動而衝逆之證。

桂枝加芍藥生薑人參湯。於桂枝湯方內。加芍藥生薑各一兩。人參三

兩。

發汗後身疼痛。脈沉遲者。

爲則按。當有心下痞。或拘急。或嘔證。

桂枝二麻黃一湯。桂枝一兩十七銖。芍藥一兩六銖。麻黃十六銖。

生薑一兩六銖。杏仁十六個。甘草一兩二銖。大棗五枚。

右七味。以水五升。先煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。日再服。桂枝湯。大汗出。脈洪大者。與桂枝湯。如前法。若形如瘧。日再發者。汗出必解。