

校註婦人良方

宋 臨川 陳自明良甫編輯
明 古吳 薛己立齋補註

鄞縣 曹赤電炳章圈校

卷十三

妊娠數墮胎方論第一

夫胎乃陽施陰化。榮衛調和。經養完全。十月而產。若血氣虛損。不能養胎。所以數墮也。凡妊婦腰痛多墮胎。

愚按丹溪先生曰。陽施陰化。胎孕乃成。血氣虛乏。不能榮養。其胎則墜。譬如枝枯則果落。藤痿則花墜。嘗治賈氏婦。每有孕。至三月前後必墜。診其脈。左右大而無力。重則濇。知其血虛也。補其中氣。使血自榮。時正初夏。教以濃煎白朮湯。下黃芩末二錢。與數十貼。得保而生。因而思之。墮於內熱而虛者。於理爲多。曰。

熱曰虛。蓋孕至三月。上屬相火。所以易墮。不然。何以黃芩、熟艾、阿膠等爲安胎之妙如此也。大抵治法。須審某月屬某經。育養而藥之。

附治驗

一妊婦五月服剪紅丸而胎墮。及腹脹痛。乃服破血之劑。痛益甚。手不敢近。予曰。此峻藥重傷脾胃也。用八珍倍加參耆。半夏、乳香、沒藥二劑而痛止。數劑而安。吳江庠吏萬湖仲子室。年二十餘。疫疾墮胎時咳。服清肺解表之藥。喘急不寐。予以爲脾土虛而不能生肺金。藥復損而益甚也。先與補中益氣。加茯苓、半夏、五味、炮薑四劑漸愈。後往視之。用八珍加五味。及十全大補湯而愈。一方。鯉魚二觔者一尾。粳米一升。用鹽醬煮食甚善。月食三次。

芎藭補中湯。杜仲丸。治氣虛而胎墜。方見十二卷第一論

附方

十全大補湯

八珍湯。二方見二十四卷第四論

補中益氣湯。方見二十四卷第六論

妊娠不長方論第二

夫妊娠不長者。因有宿疾。或因失調。以致臟腑衰損。氣血虛弱。而胎不長也。當治其疾。益其氣血。則胎自長矣。

愚按前症更當察其經絡。審其所因而治之。

附治驗

一妊婦胎六月。體倦懶食。面黃晡熱。而胎不長。因勞欲墜。此脾氣不足也。用八珍湯倍加參朮茯苓三十餘劑。脾胃漸健。胎安而長矣。

一妊婦因怒。寒熱往來。內熱晡熱。脇痛嘔吐。胎至八月而不長。此因肝脾鬱怒所致。用六君加柴胡山梔枳殼紫蘇桔梗。病愈而胎亦長矣。

黃耆湯 治妊娠不長。更安胎和氣。

黃耆 妙

白朮 妙

陳皮

麥門冬 去心

白茯苓

前胡

人參 各五

川芎

甘草 妙三

右薑棗水煎服。

又驗方。用鯉魚長尺許。如食法。飲其汁。其胎漸大而長矣。

附方

六君子湯

方見二十四卷第六論

八珍湯

方見二十四卷第四論

妊娠胎動不安當下方論第三

夫人以胃氣壯實。衝任榮和。則胎得所。如魚處淵。若氣血虛弱。無以滋養。其胎終不能成也。宜下之。以免其禍。

愚按前症宜用第十二卷十四方論主之。其胎果不能安者。方可議下。慎之慎之。

附治驗

鴻臚張淑人痢疾後胎動。心神不安。肢體殊倦。用八珍散。二十餘劑漸愈。因勞加煩熱頭痛。以大劑補中益氣湯。加蔓荊子治之。熱痛頓止。仍用前散。又五十餘劑而安。其後生產甚易。

桂心散 治妊娠因病胎不能安者。可下之。

桂心

瓜蒌

牛膝

瞿麥

各分五

當歸一錢

用水煎。

又方。牛膝一兩。酒一鍾。煎七分。作二服。

小品方。用麥蘗一升。搗碎。水二升。煮一升。服之神效。觀麥蘗能損氣破血如此。脾胃虛弱。飲食不化者。不宜用明矣。

文仲取雞子一枚。鹽三錢。服之立下。

佛手散。服之。胎死者卽下。生者亦安。方見十二卷第七論

附方

八珍散

方見二十四卷第四論

補中益氣湯

方見二十四卷第六論

妊娠墮胎後血下方論第四

墮胎後。復損經脈而下血不止。甚則煩悶至死。皆以調補胃氣爲主。

愚按。前症若肝經血熱。用四物。參。朮。山。梔。肝經風熱。用防風。黃芩。丸。肝經怒火。用加味逍遙散。脾經氣虛。用四君。歸。地。脾經鬱滯。用加味歸脾湯。氣滯不和。用

紫蘇飲。胃氣下陷。用補中益氣湯。

附治驗

一妊婦墮胎昏憤。不時吐痰。自用養血化痰之劑。昏憤不省。自汗發搐。痰涎湧出。彼以爲中風。欲用祛風化痰。予曰。此屬脾氣虛寒所致。遂用十全大補湯。加炮薑二十餘劑。尋愈。

治妊娠損動。下血腹痛。

阿膠炒一兩

艾葉半兩

用水一大盞煎。

治墮胎下血煩滿。寒熱狂悶。鎔鹿角炒爲末。每服三錢。水調下。日三服。或家雞翎燒爲末。每服二錢。溫酒下。良久再服。以效爲度。

附方

四物湯

補中益氣湯二方見二十卷第六論

防風黃芩丸

方見十二卷第六論

加味逍遙散

加味歸脾湯

十全大補湯

三方見二十四卷第四論

妊娠未足月欲產方論第五

妊娠未足月而痛如欲產。或應產而難。或爲子煩。用知母一味。蜜丸桐子大。粥飲服之。或槐子、蒲黃等分爲丸。酒服。或蒲黃水調錢許。並效。

愚按小產重於大產。蓋大產如瓜熟自脫。小產如生採。斷其根蒂。豈不重哉。而人輕忽。死於是者多矣。大抵治法。宜補形氣。生新血。去瘀血爲主。若未足月。痛而欲產。用芎歸補中湯。倍加知母止之。產而血不止。人參黃耆湯補之。產而心腹痛。當歸川芎湯主之。元氣弱而欲產。八珍湯固之。出血過多而發熱。聖愈湯治之。若汗不止。或昏憤喘咳。急用獨參湯。若發熱煩躁。或肉瞤筋惕。用八珍湯。大渴面赤。脈洪而虛者。用當歸補血湯。身熱面赤。脈沉而微者。用四君。薑附以回其陽可也。

附治驗方藥

一妊婦八月。胎欲墜如產。臥久少安。日晡益甚。此氣血虛弱。朝用補中益氣湯。加茯苓。半夏。隨愈。更以八珍湯調理而安。

當歸川芎湯 治小產後瘀血。心腹疼痛。或發熱惡寒。

當歸

川芎

熟地黃自製

白芍藥炒

玄胡索炒

紅花

香附

青皮炒

澤蘭

牡丹皮

桃仁

右水煎。入童便。酒各小半盞服。

若以手按腹愈痛。此瘀血爲患。宜用此藥或失笑散消之。若按之不痛。此是血虛。宜用四物。參、苓、白朮。若痛而作嘔。此是胃虛。宜用六君子。若痛而作瀉。此是脾虛。宜六君子送二神丸。

芎歸補中湯 治氣血虛而欲產。

艾葉代薑

阿膠炒

川芎

五味子并炒

黃耆炙

當歸

白朮炒

芍藥炒

人參

杜仲炒各一錢

甘草炙五

右每服五錢。水煎服。

若脾氣虛弱。須用補中益氣湯。若氣虛而有火。宜用安胎飲。

人參黃耆湯 治小產氣虛血下不止。

人參

黃耆 膏妙

當歸

白朮 妙

白芍藥 妙

艾葉 錢各一

阿膠 錢妙二

右作一劑。水煎服。

當歸散 治產後氣血虛弱。惡露內停。增寒發熱。宜服此藥。

當歸

白芍藥 妙

川芎

黃芩 一妙兩

白朮 五錢

右爲細末。溫童便調下二錢。

聖愈湯 方見二十四卷第九論

獨參湯 方見十三卷

當歸補血湯

八珍湯 方見二十四卷第四論

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

斷產方論第六

易曰。天地之大德曰生。然婦人有臨產艱難。或生育不已。而欲斷之。故錄驗方。以備所用。若服水銀、蟲蟲、水蛭之類。不惟孕不復懷。且禍在反掌。

愚按前症用蠶故紙尺許燒灰爲末。產後酒服之。血虛者終不復孕。大抵斷產之劑多用峻厲。往往有不起者。是則產之害。未若斷產之害也。吾聞閣老張羅峰太常李恆齊俱因服斷產之劑。自謂形體俱怯。遇勞必病。有由然矣。千金斷產用油煎水銀。一日方息。空心服棗大一丸。永斷其孕。且不損人。千金去胎大麴五升。清酒一斗。煮二沸。去滓。分五服。隔宿勿食。旦再服。其胎如糜。母無所苦。千金不傳。

四物湯每服五錢。加芸薑子二撮。於經行後。空心溫服。

妊娠咳嗽方論第七

夫肺內主氣。外司皮毛。皮毛不密。寒邪乘之。則咳嗽。秋則肺受之。冬則腎受之。春則肝受之。夏則心受之。其嗽不已。則傳於肺。妊娠病久不已。則傷胎也。

愚按前症若秋間風邪傷肺。用金沸草散。夏間火邪尅金。用人參平肺散。冬間寒邪傷肺。用人參敗毒散。春間風邪傷肺。用參蘇飲。若脾肺氣虛。用六君芎歸。桔梗。若血虛。四物。桑皮。杏仁。桔梗。腎火上炎。用六味丸。加五味子煎服。脾胃氣

虛。風寒所傷。用補中益氣。加桑皮、杏仁、桔梗。蓋肺屬辛金。生於己土。嗽久不愈者。多因脾土虛而不能生肺氣。而腠理不密。以致外邪復感。或因肺氣虛不能生水。以致陰火上炎所致。治法當壯土金。生腎水爲善。諸臟腑嗽。見六卷第十一等論。

附治驗

一妊娠氣喘痰甚。諸藥不效。素有帶下。始於目下。降兩月餘。其面亦然。此氣虛而有痰飲也。用六味丸料。數劑而愈。

一妊婦嗽則便自出。此肺氣不足。腎氣虧損。不能司攝。用補中益氣湯以培土金。

六味丸加五味。以生腎氣而愈。

一妊婦咳嗽。其痰上湧。日五六碗許。諸藥不應。予以爲此水泛爲痰。用六味丸料。

及四君子湯各一劑稍愈。數劑而安。

一妊婦因怒。咳嗽吐痰。兩脇作痛。此肝火傷肺金。以小柴胡湯。加山梔、枳殼、白朮、茯苓治之而愈。但欲作嘔。此肝侮脾也。用六君子加柴胡、升麻而痊。

桔梗散 治風寒咳嗽喘急不食

天門冬去心

赤茯苓各一錢

桑白皮

桔梗炒

紫蘇各五分

麻黃去節三分

貝母

人參

甘草炒

右薑水煎。

馬兜鈴散 治咳嗽氣喘。

馬兜鈴

苦梗

人參

甘草

貝母各五分

陳皮去白

紫蘇

桑白皮

大腹皮黑豆水浸洗各一錢五味子五分

右薑水煎。

百合散 治咳嗽胸膈煩悶。

川百合

紫苑

麥門冬

苦梗

桑白皮各五分

甘草三分

竹茹二分

右薑水煎。

治妊娠傷寒。涎多咳嗽。

知母

杏仁

天門冬

桑白皮

用薑水煎服。

旋覆花湯。感冒喘嗽。胸滿痰盛。方見二十二卷第四論
華蓋散。治症同上。或項背拘急。鼻塞頭眩。時發寒熱。方見六卷第十二論
參蘇飲加杏仁、五味子。治症同上。

附方

金沸草散方見六卷第十二論

人參平肺散方見二十四卷第十二論 人參敗毒散方見二十四卷第十論

補中益氣湯

四君子湯

六君子湯三方見二十四卷第六論

六味丸方見二十四卷第十一論

小柴胡湯方見二十四卷第十二論

妊娠吐血衄血方論第八

妊娠吐血。繇七情臟腑所傷。氣逆於上。致血上溢不止。心悶甚者多死。或墜胎也。宜用局方必勝散。

愚按前症若肝經怒火。先用小柴胡、山梔、生地。次用前藥合四物。後用加味逍

遙散。肝經風熱。防風子芩丸。心經有熱。硃砂安神丸。心氣不足。補心湯。思慮傷心。妙香散。胃經有火。犀角地黃湯。膏梁積熱。加味清胃散。鬱結傷脾。加味歸脾湯。肺經有火。黃芩清肺飲。因氣鬱滯。紫蘇飲。子氣不攝血。用補中益氣湯。腎經虛火。加味六味丸。仍以七卷第五論互用。

附治驗方藥

一妊娠因怒吐血。兩脇脹痛。小便淋瀝。此怒而血蓄於上。隨火出也。用小柴胡合四物。四劑血止。用六君子安胎飲。調理而安。

紫蘇飲。治妊娠失調。胎氣不安。上攻作痛。或逆氣失血。方見八卷。若肝脾氣血虛而有火不安。宜兼逍遙散。若脾氣虛弱而不安。宜用四君芎歸。

小柴胡湯。方見二十四卷第一論。四物湯。

補中益氣湯。

六君子湯。方見二十四卷第六論。加味逍遙散。

加味歸脾湯。方見二十四卷第四論。

防風子芩丸。方見二十四卷第六論。硃砂安神丸。方見三卷第十論。

養心湯。方見三卷第十論。

妙香散。方見三卷第十一論。安胎飲。方見十二卷第一論。

犀角地黃湯。方見七卷。

加味清胃散。方見二十四卷第一論。黃芩清肺飲。方見八卷第一論。

加味六味丸。方見二十四卷第十一論。

妊娠子煩方論第九

論曰。妊娠苦煩悶者。以四月受少陰君火以養精。六月受少陽相火以養氣。若母心驚膽寒。多有是症。產寶云。是心肺虛熱。或痰積於胸。若三月而煩者。但熱而已。若痰飲而煩者。吐涎惡食。大凡停痰積飲。寒熱相搏。吐甚則胎動不安。

愚按。前症若因內熱。用竹葉湯。氣滯用紫蘇飲。痰滯用二陳。白朮黃芩枳殼。氣鬱用分氣飲。加川芎脾胃虛弱。用六君。紫蘇山梔。

附治驗

一妊婦煩熱。吐痰惡食。惡心頭暈。此乃脾虛風痰爲患。用半夏白朮天麻湯。以補元氣。祛風邪。數劑漸愈。惟頭暈未痊。乃用補中益氣湯加蔓荊子。以升補陽氣而愈。

竹葉湯 治子煩。

防風

黃芩炒

麥門冬錢一

白茯苓二錢

右竹葉數片。水煎服。

人參散 治熱乘心脾。煩熱乾渴。

人參

麥門冬

赤茯苓

地骨皮

乾葛

黃芩炒

犀角一鎰各錢

甘草五分

右水煎。

竹茹湯 治妊娠煩躁。或胎不安。淡竹茹一兩。水煎服之。

益母丸 知母炒爲末。棗肉丸。彈子大。每服一丸。人參煎湯下。

附方

分氣飲 治脾胃虛弱。氣血不和。胸膈不利。或痰氣喘嗽。飲食少思。

陳皮

茯苓

半夏炒

桔梗炒

大腹皮

紫蘇梗

枳殼麸炒

白朮炒

山梔炒各錢

甘草炙五分

右薑水煎服。

紫蘇飲方見二十四卷第八論

二陳湯方見二十四卷第五論

六君子湯

補中益氣湯四卷第六論

妊娠煩躁口乾方論第十

足太陰脾之經。其氣通於口。手少陰心之經。其氣通於舌。若臟腑不調。氣血不和。以致內熱乘於心脾。津液消燦。故心煩口乾也。與子煩大同小異。宜用益母丸。愚按前症若胃經實火。用竹葉石膏湯。若胃經虛熱。用人參黃耆散。若胃經氣虛。用補中益氣湯。若肺經虛熱。用紫蘇飲。若肝經火動。用加味逍遙散。若脾氣鬱結。用加味歸脾湯。若腎經火動。加味地黃丸。

附治驗

一妊婦煩熱兼咽間作痛。用知母散加山梔。以清肺經而愈。後內熱咳嗽。小便自遺。用補中益氣加麥門山梔。以補肺氣。滋腎水而痊。

知母

麥門冬

黃耆

子芩

赤茯苓

甘草

右水煎。入竹瀝一合。更煎二沸而服。