

中國本草圖錄

卷一

中國本草圖錄

卷一

中國本草圖錄

卷一

蓋載之三墳者也其三百六十五
百二十種爲君主養命以應天無
老延年之說中藥一百二十種爲
有遏病補虛益損之用下藥一百
可久服故有除寒熱邪氣破積聚
尹湯液之興本乎神農仲景傷寒

R281-64
642
11



中國本草圖錄

卷一

商務印書館(香港)有限公司
人民衛生出版社 合作出版

1196684

中國本草圖錄 卷一

全書主編——蕭培根

本卷主編——連文琰

編寫——《中國本草圖錄》編寫委員會

責任編輯——孫祖基 江先聲

編輯顧問——李甯漢

美術編輯——嚴麗娟

裝幀設計——王鑑豐

出版——商務印書館(香港)有限公司

香港鰂魚涌芬尼街2號D 僑英大廈

人民衛生出版社

北京天壇西里10號

製版——高迪電子分色有限公司

香港英皇道499號北角工業大廈20樓

印刷——中華商務彩色印刷有限公司

香港九龍炮仗街75號

版次——1988年11月第1版

1989年5月第2次印刷

© 1988 1989 商務印書館(香港)有限公司

ISBN 962 07 3078 X

版權所有，不准以任何方式，在世界任何地區，以中文或任何文字翻印

仿製或轉載本書圖版和文字之一部分或全部。

© 1988 1989 The Commercial Press (Hong Kong) Ltd.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording and/or otherwise without the prior written permission of the publishers.

All inquiries should be directed to:

The Commercial Press (Hong Kong) Ltd.

Kiu Ying Building, 2D Finnie Street, Quarry Bay, Hong Kong

中國本草圖錄編輯委員會

主任委員

蕭培根 中國醫學科學院藥用植物資源開發研究所所長，研究員

副主任委員

董綿國 人民衛生出版社社長兼總編輯，編審

編輯委員

連文琰 中國醫學科學院藥用植物資源開發研究所副研究員

嚴仲鎧 吉林省中醫中藥研究院中藥研究所中藥室主任，副研究員

高士賢 吉林省長春中醫學院中藥系教授

裴盛基 中國科學院昆明植物研究所所長，研究員

戴天倫 四川省中藥研究所副研究員

鄔家林 四川省中藥學校校長，副教授

胡廷松 廣西藥用植物園副主任，副主任技師

鄭漢臣 上海第二軍醫大學藥學系副教授

仇良棟 廣州市藥品檢驗所主任藥師

孫祖基 人民衛生出版社藥學編輯室主任

朱兆儀 中國醫學科學院藥用植物資源開發研究所藥用植物資源室主任，研究員

張效杰 吉林省中醫中藥研究院中藥研究所主管技師

中國本草圖錄卷一編者名單

編寫單位

中國醫學科學院藥用植物資源開發研究所、中國醫學科學院藥用植物資源開發研究所海南分所、廣西藥用植物園、長春中醫學院、廣州市藥品檢驗所、吉林省中醫中藥研究院、人民衛生出版社

主編

連文琰 胡廷松

編者

蕭培根 馮毓秀 朱兆儀 連文琰

馮瑞芝 林壽全 陳碧珠 司德昭

何明通 王曉光

胡廷松 黃燮才

仇良棟

高士賢 鄧明魯 李大經 李建平

嚴仲鎧 徐國經 潘 寧

孫祖基 王鐵僧 趙達文

圖片攝影

劉玉秀 王曉光 王 耘

彭治章

仇良棟

濟一農 高士賢 高文龍

張效杰 嚴仲鎧

孫祖基

審閱者

樓之岑 蕭培根 謝宗萬 鄧明魯

輔助人員

米泰康 林余霖 朱 平 李曉芬

本書在編寫過程中，得到了下列單位及個人的支持和協助，謹此一併致謝。

中國醫學科學院藥用植物資源開發研究所藥用植物園、海南省尖峯嶺林場、雲南省麗江縣拉美容高山藥物試驗場、甘肅省民勤沙生植物園、貴州省植物園、江蘇省植物所植物園、南京中藥學院藥用植物園、北京香山植物園、天津市醫藥研究所夏光成教授等。

前言

中華民族在長期和疾病鬥爭的過程中，積累了極為豐富的經驗，形成了獨特的中國醫藥學，它是世界傳統醫學的重要組成部分，可說是舉世矚目的。

作為中國醫學防治疾病的主要武器的中草藥，資源十分豐富，藥用種類達七千種。《中國本草圖錄》廣攬博收，通過彩色照片和簡要描述，真實記錄並介紹了五千種中草藥，可說是目前世界上收載和記錄藥用動物、植物、礦物的一部最大型專業性巨著和工具書。

本書由中國醫學科學院藥用植物資源開發研究所、吉林省中醫中藥研究院、長春中醫學院、昆明植物研究所、四川省中藥研究所、廣西藥用植物園、廣西醫藥研究所、上海第二軍醫大學、廣州市藥品檢驗所、四川省中藥學校、人民衛生出版社等十一個單位的數十名高級專業人員和著名學者通力合作完成。

收錄的所有彩色照片均在實地拍攝，其中不少品種是專業人員冒着生命危險，歷盡艱苦，深入荒山老林才獲得的，照片真實、生動，如實地反映了這些中草藥的生長習性和生態環境，具有珍貴的科學價值。文字描述部分包括了這些中草藥的來源，形態，分佈，採製，成分，性能和應用等項目，簡明扼要，深入淺出，最後還附有最基本的文獻書目，幫助讀者進一步查閱更多的科學資料。所以，《中國本草圖錄》既是專業醫藥人員必備的參考書，也是廣大群眾汲取中草藥知識的良師益友。

我們熱切希望本書日後能出版英文版，向全世界發行，這對於各國人民急切要求了解和熟悉中草藥的願望將能得到一定的滿足。

本書在編寫過程中，得到國際自然及自然資源保護組織 (IUCN)、世界衛生組織 (WHO) 的熱情關懷，國家自然科學基金會從經費上給予支持，衛生部的領導給予指導及鼓勵，使得這部巨著能在較短的時間內和讀者見面。

本書的編寫與攝影工作，不僅得到了各地研究機構的熱情支持與協助，還得到了各學術界老前輩的指導和幫助，有的親自參加了有關內容的審定工作，如樓之岑教授、謝宗萬教授、朱有昌教授、鄧明魯教授、吳征鎰教授等。在此一併向大家致謝。

衷心希望廣大讀者在使用過程中對本書提出寶貴意見，不吝指正。

蕭培根

中國醫學科學院藥用植物資源開發研究所，教授，所長。世界衛生組織傳統醫學合作中心，主任。

一九八八年五月一日

編 寫 說 明

1. 《中國本草圖錄》收載中草藥(包括植物、動物、礦物)五千種，分十冊出版。全書採用彩色照片拍攝中草藥的生態環境、生長狀態(活植物、活動物體態)，礦物則拍攝藥材形狀。

2. 每種中草藥附有簡要的文字描述，目的在於彌補彩照的不足，並使讀者對該中草藥有一個概括的認識。

3. 本書編排以植物(動物)科為順序；植物科以恩格勒系統為編排依據。科屬內的中草藥則按植物(動物)的拉丁學名的字母順序依次排列。

4. 書前的目錄備列中草藥所屬的植物(動物)的科及科內各中草藥。書後則分別附有中草藥及所屬植物(動物)的中名索引及拉丁學名索引。

5. 正名一般祇採用中草藥的常用名稱。若一種中草藥為多來源或來自同屬多種植物(或動物)，如黃連、貝母、天南星、前胡等，正名參照基源動植物名取名為三角葉黃連(黃連)、白花前胡(前胡)等，括號內附常用的中草藥名稱。如此藥為民間藥，則應採用民間藥名稱。若無中草藥名稱，可採用此藥的植物名或動物名。

6. 本書文字描述包括：來源、形態、分佈、採製、成分、性能、應用、文獻及附註等項目。

7. 來源是記載中草藥所屬的植物(動物)科的中名，植物(動物)名稱及其拉丁學名，藥用部分。礦物藥則記述其礦物來源的名稱或學名。

8. 形態一項是概述中草藥的原植物(或原動物)的全貌的形態特徵(尤詳於藥用部分)。若為礦物藥，則祇描述藥材性狀。

9. 分佈是描述該植物(動物)在野生狀態下的生態環境或栽培狀況，或其棲息環境及習性等。分佈是指野生植物(動物)在中國境內的自然分佈。由於篇幅限制，若分佈的省區太多，可採用大區描述，如東北、華北、華東、中南、西北、西南等，也可寫長江以南等。

10. 採製是描述該中草藥的採集季節，加工方法(如曬乾、陰乾、鮮用、切片、切段等)，或特殊的炮製加工等方法。

11. 成分祇記載該中草藥所含的主要成分或有活性成分，對一般次要的化學成分，可不予全部記載，而且也以該中草藥的藥用部位為主，非藥用部位的成分則或略而不述。

12. 性能是先描述該中草藥的性味(先寫味，後寫性)，再述其功能。功能祇描述該中草藥的主要作用。對有些有毒的中草藥，按毒性的size，寫明小毒、有毒、大毒等，以便引起注意。

13. 應用祇描述該中草藥沿用以治療的主要病症，也可能是與其他藥物配伍的效用。用法一般指內服或外用或其他用法。文中描述“用於”云云即指內服。用量是指成人每日的常用量。

14. 文獻一項是供進一步查閱該中草藥的詳細資料而編注的；如別名、成分、藥理等內容，可在文獻中查閱。為節省篇幅，常用文獻多採用簡稱。如《大辭典》上，865，即《中藥大辭典》上冊第865條。各卷所引用的文獻的書目資料，可於每卷後面所附的“參考書目”中找到。

目 錄

- 菌類植物
- 多孔菌科
- 1. 赤芝(靈芝)
- 蕨類植物門
- 卷柏科
- 2. 卷柏
- 3. 翠雲草
- 七指蕨科
- 4. 入地蜈蚣
- 蹄蓋蕨科
- 5. 小葉山雞尾巴草
- 水龍骨科
- 6. 抱樹蓮
- 7. 崖蕨
- 裸子植物門
- 蘇鐵科
- 8. 囉平
- 松科
- 9. 馬尾松
- 10. 油松
- 11. 雲南松
- 柏科
- 12. 側柏
- 麻黃科
- 13. 木賊麻黃(麻黃)
- 14. 膜果麻黃
- 15. 草麻黃(麻黃)
- 買麻藤科
- 16. 買麻藤
- 被子植物門
- 雙子葉植物綱
- 甲. 離瓣花亞綱
- 胡椒科
- 17. 小葉蒟
- 18. 海南蒟
- 19. 蘿撥
- 20. 胡椒
- 胡桃科
- 21. 核桃楸
- 22. 核桃仁
- 23. 楓楊
- 樺木科
- 24. 遼東檜木
- 桑科
- 25. 穿破石
- 26. 無花果
- 27. 印度橡膠
- 28. 對葉榕
- 29. 啤酒花
- 30. 葎草
- 31. 滑葉跌打
- 蕁麻科
- 32. 長葉芋麻
- 馬兜鈴科
- 33. 北馬兜鈴(馬兜鈴)
- 34. 馬兜鈴
- 35. 管南香
- 36. 耳葉馬兜鈴
- 蓼科
- 37. 竹節蓼
- 38. 毛蓼
- 39. 拳參
- 40. 虎杖
- 荩科
- 41. 牛膝
- 42. 空心莧
- 43. 蓮子菜
- 44. 反枝莧
- 45. 九層風
- 紫茉莉科
- 46. 葉子花
- 47. 紫茉莉
- 商陸科
- 48. 商陸
- 馬齒莧科
- 49. 土人參
- 落葵科
- 50. 落葵
- 石竹科
- 51. 荷蓮豆
- 52. 剪秋羅
- 毛茛科
- 53. 北烏頭(草烏)
- 54. 麻布七
- 55. 松潘烏頭(金牛七)
- 56. 打破碗花花
- 57. 大三葉升麻
- 58. 威靈仙
- 59. 盤盤木通
- 60. 鐵線蓮(威靈仙)
- 61. 牡丹皮
- 62. 毛茛
- 木通科
- 63. 五葉木通(八月炸)
- 64. 白木通(八月炸)
- 小蘗科
- 65. 華南十大功勞(十大功勞)
- 66. 南天竹
- 67. 桃兒七
- 防己科
- 68. 木防己
- 木蘭科
- 69. 八角茴香
- 70. 山玉蘭
- 71. 大花木蘭
- 72. 辛夷
- 番荔枝科
- 73. 鷹爪花
- 74. 雞爪風
- 75. 紫玉盤
- 肉豆蔻科
- 76. 肉豆蔻
- 樟科
- 77. 烏藥
- 78. 潺槁樹
- 蓮葉桐科
- 79. 三葉青藤
- 罌粟科
- 80. 刺罌粟
- 81. 圓葉齒瓣延胡索(元胡)
- 82. 角瓣延胡索
- 83. 元胡
- 84. 荷包牡丹
- 85. 罌粟
- 白花菜科
- 86. 白花菜子
- 87. 醉蝶花
- 88. 臭矢菜
- 景天科
- 89. 景天
- 90. 佛甲草
- 91. 垂盆草

虎耳草科

92. 落新婦

金縷梅科

93. 蚊母樹

94. 楓香脂

杜仲科

95. 杜仲

薔薇科

96. 龍牙草(仙鶴草)

97. 山楂

98. 山里紅

99. 枇杷葉

100. 棣棠花

101. 赤陽子

102. 月季花

103. 刺玫果

104. 金櫻子

105. 紅筋鈎

106. 甜茶

107. 烏泡刺

108. 地榆

豆科

109. 阿拉伯膠

110. 兒茶

111. 台灣相思

112. 鴨皂樹

113. 白花羊蹄甲

114. 龍鬚藤

115. 南蛇筍

116. 金鳳花

117. 望江南

118. 鐵刀木

119. 決明

120. 蝙蝠草

121. 印度檀

122. 鳳凰木

123. 假木豆

124. 排錢樹

125. 牛巴嘴

126. 廣金錢草

127. 三點金草

128. 過崗龍

129. 地米菜

130. 紅芪

131. 豆根木蘭

132. 雞眼草

133. 香花崖豆藤(雞血藤)

134. 大葉千斤拔(千斤拔)

135. 貓豆

136. 赤豆(赤小豆)

137. 山豆根(廣豆根)

138. 雞血藤

139. 苦馬豆

140. 葫蘆茶

141. 葫豆

142. 野豌豆

143. 丁癸草

酢漿草科

144. 感應草

亞麻科

145. 亞麻子

古柯科

146. 古柯

蒺藜科

147. 駱駝蓬

148. 霸王

芸香科

149. 柚皮(橘紅)

150. 橘紅

151. 檸檬

152. 橘(陳皮)

153. 金橘

154. 九里香

155. 筋欖花椒

156. 野花椒

楝科

157. 假茶辣

遠志科

158. 大金不換

159. 遠志

160. 一號泡

大戟科

161. 土密樹

162. 變葉木

163. 狼毒大戟

164. 澤漆

165. 鐵海棠

166. 斑地錦

167. 小飛楊草

168. 刮金板

169. 四裂算盤子

170. 算盤子

171. 佛肚樹

172. 白背葉

173. 餘甘子

174. 密甘草

175. 水油甘

176. 山兵豆(紅魚眼)

177. 圓葉烏柏

178. 龍脷葉

179. 一葉萩

180. 珍珠透骨草(透骨草)

漆樹科

181. 雞腰果

182. 南酸棗

183. 欖果

184. 鹽膚木

衛矛科

185. 調經草

186. 密花美登木

省沽油科

187. 野鴨椿

槭樹科

188. 蝴蝶果

無患子科

189. 無患子

190. 文冠果

清風藤科

191. 大發散

鼠李科

192. 鐵包金

葡萄科

193. 過山龍

194. 血薸

195. 粉藤果

196. 四方寬筋藤(四方藤)

錦葵科

197. 黃蜀葵

198. 磨盤草

199. 苘麻子

200. 海島棉

201. 黃槿

202. 野西瓜苗

203. 錦葵

204. 地桃花

- 梧桐科
205. 火索麻
206. 夜落金錢
207. 半楓荷
208. 小萃婆
- 山茶科
209. 金花茶
210. 小果金花茶
211. 茶
- 藤黃科
212. 黃牛茶
- 檉柳科
213. 西河柳
- 紅木科
214. 紅木
- 堇菜科
215. 三色堇
- 大風子科
216. 泰國大風子(大風子)
- 西番蓮科
217. 龍珠果
- 仙人掌科
218. 曇花
219. 劍花
220. 仙人掌
- 胡頹子科
221. 紅雞錫香
222. 木牛奶
223. 蒙古沙棘(沙棘)
224. 中國沙棘(沙棘)
- 八角楓科
225. 八角楓
226. 小花八角楓(八角楓)
- 使君子科
227. 華風車子
228. 使君子
- 桃金娘科
229. 丁香
230. 大葉丁香(丁香)
231. 番櫻桃
232. 白千層
- 野牡丹科
233. 地氈
234. 毛氈
- 菱科
235. 菱
- 柳葉菜科
236. 紅筷子
- 五加科
237. 三加皮
238. 槲木
239. 長白槲木
240. 甘肅土當歸
241. 廣西七葉蓮
242. 鴨脚木
243. 通草
- 傘形科
244. 白芷
245. 刺芫荽
246. 小茴香
247. 北沙參
248. 紅馬蹄草
- 山茱萸科
249. 山茱萸
乙. 合瓣花亞綱
- 鹿蹄草科
250. 普通鹿蹄草(鹿蹄草)
- 杜鵑花科
251. 照山白
252. 杜鵑
- 紫金牛科
253. 大雨傘
254. 紫金牛
255. 五托蓮
256. 空心草
- 白花丹科
257. 黃花補血草
- 山欖科
258. 人心果
- 柿樹科
259. 柿蒂
260. 君遷子
- 木犀科
261. 齊墩果
262. 白丁香
263. 暴馬子
- 馬錢科
264. 醉魚草
- 夾竹桃科
265. 黃蟬
266. 鱗藤
267. 羅布麻
268. 刺黃果
269. 紅雞蛋花
270. 花拐藤
271. 四葉蘿芙木
272. 蘿芙木
273. 小蔓長春花
- 蘿藦科
274. 蓮生桂子花
275. 牛角瓜
276. 古鈎藤
277. 青陽參
278. 隔山消
279. 圓葉弓果藤
280. 三分丹
- 旋花科
281. 馬鞍藤
282. 盒果藤
283. 大花牽牛(牽牛子)
284. 金鳳毛
- 馬鞭草科
285. 大葉紫珠
286. 紅葉紫珠
287. 蘭香草
288. 臭茉莉
289. 假連翹
290. 冬紅花
291. 五色梅
292. 豆腐柴
- 唇形科
293. 貓鬚草
294. 香青蘭
295. 半邊蘇(香薷)
296. 廣防風
297. 澤蘭
298. 薄荷
299. 羅勒
300. 丁香羅勒
301. 塊莖糙蘇
302. 糙蘇
303. 夏枯草
304. 香茶菜
305. 丹參
306. 大丹參

307. 小紅參
308. 荊芥
309. 山藿香
310. 百里香(地椒)
311. 地椒
- 茄科
312. 瓶兒花
313. 十萼茄
314. 地骨皮
315. 黑子刺
316. 假酸漿
317. 金鈕扣
318. 白英
319. 五指茄
320. 茄子
321. 丁茄
322. 假烟葉
323. 黃水茄
- 玄參科
324. 毛麝香
325. 母草
326. 通泉草
327. 泡桐
328. 苦玄參
329. 草本威靈仙
330. 硬骨凌霄
- 紫葳科
331. 梓白皮
332. 雞肉參
- 胡麻科
333. 黑芝麻(芝麻)
- 苦苣苔科
334. 牛耳朵
335. 石膽草
336. 兩面綢
- 爵床科
337. 球花馬藍
338. 山一籠雞
339. 九頭獅子草
340. 白泡草
- 茜草科
341. 金雞納
342. 豬殃殃
343. 梔子
344. 水梔子
345. 紅大戟
346. 海巴戟
347. 巴戟天
348. 百眼藤
349. 山石榴
350. 六月雪
351. 小葉鈎藤
352. 白鈎藤
- 忍冬科
353. 血滿草
354. 陸英
355. 五轉七
- 敗醬科
356. 甘松
- 葫蘆科
357. 黃瓜
358. 北瓜(桃南瓜)
359. 噴瓜
360. 絞股藍
361. 絲瓜絡
362. 苦瓜
363. 木鼈子
364. 羅漢果
- 桔梗科
365. 黨參
- 菊科
366. 千葉蓍(蓍草)
367. 牛蒡子
368. 艾蒿(艾葉)
369. 蒼朮
370. 茅蒼朮(蒼朮)
371. 白朮
372. 木香
373. 豬肚子
374. 金盞菊
375. 挖耳草
376. 矢車菊
377. 茼蒿
378. 大麗菊
379. 麝香菊(野菊)
380. 旱蓮草
381. 紅升麻
382. 野馬追
383. 向日葵
384. 羊耳菊
385. 仙人筆
386. 滑背草鞋根
387. 祁州漏蘆(漏蘆)
388. 狗舌草
389. 金腰箭
390. 萬壽菊
391. 菊蒿
392. 蟛蜞菊
- 單子葉植物綱
- 禾本科
393. 黃金間碧竹
394. 薏苡仁
395. 甜竹
396. 稗根苗
397. 浮小麥
- 莎草科
398. 九龍吐珠
399. 香附
- 棕櫚科
400. 檳榔
- 天南星科
401. 廣東萬年青
402. 海芋
403. 臭魔芋
404. 黑南星(天南星)
405. 千年健
406. 筋慈姑
407. 掌葉半夏
408. 石柑子
- 鳳梨科
409. 鳳梨
410. 水塔花
- 鴨跖草科
411. 蚌花
412. 紫鴨跖草
- 百合科
413. 鐵樹葉
414. 竹根七
415. 狗尾巴參
416. 鸞鷲蘭
417. 麗江山慈姑
- 百合
418. 百合
419. 卷丹(百合)
420. 麝百合(百合)

421. 囊絲黃精(黃精)	寶貝科	犬科
422. 玉竹	454. 虎斑寶貝(紫貝齒)	479. 狗骨
423. 黃精	石礮海牛科	480. 豬肉
424. 吉祥草	455. 石礮海牛	貓科
石蒜科	嗜黏液蛞蝓科	481. 東北虎(虎骨)
425. 仙茅	456. 雙線嗜黏液蛞蝓(蛞蝓)	馬科
426. 肝風草	蚌科	482. 野驢(阿膠)
蒟蒻草科	457. 魁蚌(瓦楞子)	牛科
427. 水田七	458. 毛蚌(瓦楞子)	483. 綿羊
428. 老虎鬚	藤壺科	484. 巖羊角
薯蕷科	459. 白脊紋藤壺	礦物類
429. 穿山龍	平甲蟲科	原礦物類
430. 山藥	460. 平甲蟲(鼠婦)	485. 小海浮石(海浮石)
431. 黃山藥	海岸水蝨科	486. 石燕
432. 褐苞薯蕷	461. 海岸水蝨	487. 禹餘糧
芭蕉科	美人蝦科	488. 桃色珊瑚
433. 香蕉	462. 日本美人蝦	489. 麥飯石
434. 鶴望蘭	梭子蟹科	490. 蛇含石
薑科	463. 三疣梭子蟹	礦物加工類
435. 竹葉山薑	球海膽科	491. 硫黃
436. 距花山薑	464. 馬糞海膽(海膽)	492. 瑪瑙
437. 益智	465. 光棘球海膽(海膽)	493. 爐甘石
438. 爪哇白豆蔻(白豆蔻)	蟾蜍科	礦物製劑
439. 白豆蔻	466. 中華大蟾蜍(蟾酥)	494. 朱砂
440. 海南砂仁	鵝鵝科	495. 雄黃
441. 黑心薑	467. 斑嘴鵝鵝(淘鵝油)	496. 白礬
442. 舞女薑	鷺科	497. 鉛粉
443. 山薑活	468. 草串兒	498. 銅綠
444. 山茶	鶴科	499. 綠鹽
美人蕉科	469. 鸛骨	500. 小靈丹
445. 大花美人蕉	鴨科	
竹芋科	470. 鴨血	參考書目
446. 花葉竹芋	471. 天鵝膽	拉丁學名索引
447. 柰葉	472. 尖嘴鴨骨	中文名稱索引
蘭科	雉科	
448. 白及	473. 鸚鵡	
449. 雞腎參	474. 茶花雞	
450. 青天葵	鳩鵲科	
動物類	475. 鴿肉	
海葵科	棕鳥科	
451. 黃海葵(海葵)	476. 灰札子	
磯砂蠶科	杜鵑科	
452. 巢沙蠶(沙蠶)	477. 紅毛雞	
隱板石鱉科	文雀科	
453. 紅條毛膚石鱉(海石鱉)	478. 白丁香	

1 赤芝(靈芝)

來源 多孔菌科植物赤芝 *Ganoderma lucidum* (Leyss. ex Fr.) Karst. 的全株。

形態 菌蓋木栓質，有側生柄，半圓形至腎形，偶有圓形，黃色至紅褐色，菌柄紫褐色，有光澤，表面有環狀稜紋和幅射狀皺紋；菌肉近白色至淡褐色；菌管硬，管口初期白色，後期褐色。孢子褐色，卵形，內壁具明顯小疣。

分佈 生於櫟樹及其他闊葉樹的木樁旁。分佈於中國東南部及西南部。

採製 秋季採收，曬乾。

成分 含多糖、氨基酸、麥角甾醇類(ergosterol)。

性能 甘，平。主治耳聾，利關節，養神益精，滋補，堅筋骨。

應用 用於虛勞，咳嗽，氣喘，失眠，消化不良，胃病。用量 2~5 g。

文獻 《大辭典》上，2395。



2 卷柏

來源 卷柏科植物卷柏 *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring 的全草。

形態 多年生草本，高 5~15 cm，全株呈蓮座狀，乾後內卷如掌狀。主莖直立，各枝為二叉式扇狀分枝。葉二型，覆瓦狀排成 4 列，側生葉斜展，長卵圓形，先端有長芒，外側有微齒，內側膜質，全緣，中葉 2 列，不排列成平行線，寬卵圓形，有長芒，不對稱。孢子囊穗頂生，孢子囊圓腎形。

分佈 生向陽山坡或巖石上。分佈於中國大部省區。

採製 全年可採，洗淨，曬乾。

成分 含鞣菌糖、甙類及黃酮類化合物。

性能 辛，平。活血通經，止血(炒炭)。

應用 用於閉經，子宮出血，便血，脫肛。用量 10~25 g。

文獻 《滙編》上，473；《大辭典》，3067。





3 翠雲草

來源 卷柏科植物翠雲草 *Selaginella uncinata* (Desv.) Spring 的全草。

形態 多年生草本。主莖伏地蔓延，黃綠色或略帶紅色。主莖上葉較大，2列疏生，斜卵圓形，基部不對稱；側枝疏生，多回分叉，葉密生，排列成平面，有4列，兩側2葉對稱，嫩時上面碧綠色。孢子囊穗單生於枝頂，四棱形，孢子葉卵狀三角形。孢子囊卵形。

分佈 生於林下陰濕處的巖石上、溪邊叢林中。分佈於中國東部、南部、西南部。

採製 全年可採、鮮用或曬乾。

成分 含霉菌糖 (trehalose) 約 1.6%。

性能 甘、淡，涼。清熱利濕，止血，止咳。

應用 用於急性黃疸性肝炎，膽囊炎，腸炎，腎炎，泌尿系感染。外用於跌打損傷，外傷止血。用量 15~30 g。

文獻 《匯編》上，903。



4 入地蜈蚣

來源 七指蕨科植物七指蕨 *Helminthostachy zeylanica* (L.) Hook. 的根狀莖。

形態 根狀莖粗壯，橫走，有多數肉質粗根。近頂部生葉 1~2 片，基部有 2 片長圓形的肉質托葉，頂部生不育葉和孢子囊穗，不育葉通常 2 叉，每叉由 1 片頂生羽片和 1~2 對側生羽片組成。基部有略具狹翅的短柄。孢子囊穗通常高出不育葉，孢子囊無柄，3~5 枚聚生於囊托，頂端有不育的雞冠狀突起。

分佈 生於雨林下。分佈於台灣、海南、廣東、廣西和雲南南部。

採製 全年可採。

性能 淡，平。除熱，去瘀，止痛。

應用 用於癆熱咳嗽，痢疾，跌打損傷，瘀血疼痛。外用於毒蛇咬傷。用量 2 g，外用適量。

文獻 《大辭典》上，0070。