

校註婦人良方

宋 臨川 陳自明良甫編輯
明 古吳 薛己立齋補註
鄞縣 曹赤電炳章圈校

卷二

衆疾門

經脈不調衆疾生焉故以次之

產寶方論第一

古人治婦人。別著方論者。以其胎妊生產崩傷之異。况鬱怒倍於男子。若不審其虛實而治之。多致夭枉。

愚按前說誠爲精確。諺云。寧治十男子。莫治一婦人。寧治十婦人。莫治一小兒。義可見矣。

博濟方論第二

夫人將攝順理。則氣血調和。六淫不能爲害。若勞傷血氣。則風冷乘之。脾胃一傷。飲食漸少。榮衛日衰。肌膚黃燥。面無光澤。若入大腸則下利。若入關元則絕嗣。故婦人病有三十六種。皆由衝任勞損而致。蓋衝任之脈。爲十二經之會海。其病皆見於少陰太陽之經。當於此候之。

愚按前論精密。學者當從此類推之。

寇宗奭論第二

婦人雖有別科。然亦有不能盡聖人之法。岐伯曰。凡病察其形氣相得則易治。形氣相失則難治。又曰。診病之道。觀人勇怯。骨肉皮膚。能知其情。以爲診法。今富貴之家。身處帷幔。出手診候。不能盡望聞問切之情。率爾投藥。烏可盡其術乎。况醫者質問諄諄。病家遂謂業術不精而不信。豈能使藥之奏效耶。丹溪云。凡人之形。長不及短。大不及小。肥不及瘦。人之色。白不及黑。嫩不及蒼。厚不及薄。而况肥人。

濕多。瘦人火多。白者肺氣虛。黑者腎氣足。形色既殊。臟腑亦異。外證雖同。治法迥別。所以肥人責脈浮。瘦人責脈沉。躁人疑脈緩。緩人疑脈躁。以其不可概觀也。若夫病勢危急。必須察色以觀其外。診脈以知其內。醫之道。庶乎不至於有誤矣。府庠徐道夫母。胃脘當心痛極。右寸關俱無。左雖有微而欲絕。手足厥冷。余以上部無脈。不吐爲不治。然察其眼胞上下青黯。此脾虛肝木所勝。以參朮茯苓陳皮甘草補中益氣。以木香和胃氣。行肝氣。以吳茱萸散脾胃之寒。止心腹之痛。遂急與一劑。連服二次。再進諸病悉愈。

通用方序論第四

夫通用方者。蓋產前產後皆可用也。或一方治諸症。不可入於專門。當通變而施治。烏可泥也。

加減四物湯。治血虛月經不調。腰腹作痛。崩中漏下。半產產後。惡露內停。或去

血過多而痛。

方見第八十三論

愚按血虛之症。若肝脾血燥。用加味逍遙散。肝火血燥。用八珍湯。加山梔牡丹

皮。肝經風熱血燥。用六味地黃丸。肝脾血燥血虛。用四物、柴胡、山梔。肝經氣血虛弱。用四君、芎、歸、熟地。腎水涸而肝血虛。用六味地黃丸。金剋木而肝血虛。與心火亢而肝血虛。亦用前丸。若氣虛而血弱。用補心湯。胃氣陷而血虛。用補中益氣湯。脾氣弱而血虛。用六君子湯。脾氣鬱而血虛。用加味歸脾湯。大凡血虛之症。或氣虛血弱。或陽氣脫陷。或大失血。以致發熱煩渴等症。必用四君、歸者。或獨參甘溫之劑。使陽旺則陰生。其病自愈。若用寒涼降火。乃速其危也。

交加散

治經脈不調。腹中撮痛。或結聚癥瘕。產後中風。

生地黃取汁

生薑取汁

右以地黃汁炒薑渣。薑汁炒地黃渣。乾爲末。每服三錢。溫酒調下。芎、藥、玄胡索、當歸、蒲黃、桂心各一兩。沒藥、紅花各五錢。尤效。

補中丸 治氣血俱虛諸症。即八珍湯爲丸。方見二十四卷第四論

附方加味歸脾湯

加味逍遙散

八珍湯三方見二十四卷第四論

六味丸

方見二十四卷第十一論

四物湯

四君子湯

六君子湯

補中益氣湯

四方見二十四卷第六論獨參湯方見三卷第十三論

燥也。遂用六味丸。加五味、麥門、芎、歸。一劑而飲食頓進。小便頓調。隨用補中益氣。加茯苓、山梔、鉤藤、丹皮而安。至十月。復以傷食腹痛作瀉。左目仍小。兩關尺脈弦洪。鼓指。予以六君加木香、吳茱、升麻、柴胡。一劑而痛瀉俱緩。復以六君加肉果。故紙一劑。諸脈頓平。痛瀉俱止。余謂左關弦洪。絲肝火血燥。故左目緊小。右關弦洪。絲肝邪乘脾。故脣口喎斜。腹痛作瀉。二尺鼓指。絲元氣下陷。設以目緊口喎。誤作風中。投以風藥。以腹痛泄瀉。誤作積滯。投以峻劑。復耗元氣。爲害甚矣。後以陽虛惡寒。圍火過熱。致痰喘。誤服寒劑而卒。

一歸人因怒仆地。語言蹇澀。口眼喎斜。四肢拘急。汗出遺尿。六脈洪大。肝脈尤甚。皆絲肝火熾盛。蓋肝主小便。因熱甚而自遺也。用加味逍遙散。加鉤藤及六味丸尋愈。

一老婦兩臂不遂。語言蹇澀。服祛風之藥。反致筋攣骨痛。余謂此肝火血虛所致。用八珍湯補氣血。用地黃丸補腎水。佐以排風湯。年餘而愈。

一婦人經行。口眼歪斜。痰涎壅盛。此血虛而肝火動。用加味逍遙散。加牡丹皮治之。尋愈。後因飲食停滯。口吐痰涎。此脾氣虛。不能攝涎歸經也。用六君子二十

餘劑而安。

一婦人因怒。口眼歪斜。痰涎上湧。口噤發搐。此脾肺氣虛而肝木旺。用六君子。加木香。鈎藤。柴胡。治之。漸愈。又用加味歸脾湯。調理而安。

一產婦勤於女工。忽仆地。牙關緊急。痰喘氣粗。四肢不遂。此氣血虛而發瘳。朝用補中益氣湯。加茯苓。半夏。夕用八珍湯。加半夏。各三十餘劑。不應。此氣血之未復。藥之未及也。仍用前二湯。又五十餘劑。尋愈。

一婦人素有內熱。月經不調。經行後。四肢不能伸。臥床半載。或用風濕痰火之劑。不效。其脈浮緩。按之則濡。名曰瘳症。屬風寒所乘。用加味逍遙散。加肉桂。防風。四劑頓愈。更以八珍湯。調理兩月餘而痊。

一婦人素經行後期。因勞怒。四肢不能屈。名曰瘳症。此血虛而風熱所乘。先用八珍湯。加鈎藤。柴胡。漸愈。更佐以加味逍遙散。調理而痊。

一婦人四肢攣屈。煩痛自汗。小便短少。畏見風寒。脈浮弦緩。此氣血虛而風寒濕熱相搏。先用東垣清燥湯。漸愈。再用加味逍遙散。及八珍湯。加牡丹皮而痊。

一婦人素有火。忽然昏瞶。瘳瘳抽搐。善伸數欠。四肢筋攣。痰涎上升。此肺金燥甚。