



北京市中草药制剂选编

北京市卫生局 编

北京市 中草药制剂选编

北京市卫生局 编

人民卫生出版社

北京市中草药制剂选编

开本：787×1092/32 印张：8 $\frac{1}{2}$ 字数：178千字

北京市卫生局 编

人 民 卫 生 出 版 社 出 版

(北京书刊出版业营业许可证出字第〇四六号)

• 北京市宣武区迎新街100号 •

人 民 卫 生 出 版 社 印 刷 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行 • 各地新华书店经售

统一书号：14048·3329

1973年7月第1版—第1次印刷

定 价： 0.52 元

印数：1—50,600

毛主席语录

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

前 言

遵照伟大领袖毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”和“古为今用，洋为中用”，“推陈出新”的伟大教导，我市广大医药卫生人员积极进行中西药结合工作，开展中草药群众运动，发扬自力更生，艰苦奋斗的精神，坚持“三土”（土医、土药、土法）上马，“四自”（自采、自种、自养、自制）创业，各医疗单位创办了“土药厂”，通过临床观察和医疗实践，筛选出不少疗效较好的新方剂，并不断改革剂型，加工生产了丸、散、膏、酏、片、针等多种剂型的中草药制剂。为了总结推广，交流各单位在防病治病、科研等方面的经验，为进一步巩固和发展农村合作医疗制度，推动医药卫生事业不断发展，创造我国统一的新医药学，我局组织了市药检所、药材公司等单位组成“中草药制剂选编”组，并组织区（县）市属各医疗单位组成了九个协作组，共同收集整理了这本《北京市中草药制剂选编》。

本书在编写、整理、审稿过程中，得到了各区（县）卫生局、北京医学院药学系、中国科学院植物研究所、市属各医院等有关单位的大力支持。初稿编印后虽发动各医疗单位的广大医药卫生人员进行讨论，广泛征求意见，并召开了审稿会议，但由于我们对马列的书和毛主席著作学习得不够，同时缺乏实践经验，时间仓促，选编工作中一定有很多缺点与错误，希望广大医药卫生人员和“赤脚医生”批评指正。

北京市卫生局

1972.10

编写说明

1. 本书收载北京地区医疗单位、市属中西制药厂及人民公社土药厂报送的中草药制剂材料，选择其中方剂药味组成少（个别方剂除外），并多采用本地区所产的药材（包括栽培品种），临床使用效果较好的中草药制剂编汇而成。

2. 本书内容分正文与附录两部分。正文共收载 284 个方剂，按剂型分类，排列顺序是煎剂（包括浓缩煎剂）、酒剂和酊剂、糖浆剂、散剂、丸剂（包括蜜丸、水丸、浓缩丸）、冲服剂、片剂、注射剂、膏剂（包括浓缩膏即浸膏、黑膏药即铅膏、软膏和油剂）、其它包括胶囊剂、滴鼻剂、眼药水、栓剂、洗剂、搽剂、糊剂、热敷剂即“腾药”等十类。除其它类外，每类剂型均分概述和处方例两部分。概述用以叙述本剂型的含义、共同制法、使用工具及注意事项等问题，处方例，是列举本剂型具体方剂。

3. 每一处方例，包括品名、处方、制法、用途、用法用量、报送单位等六项，必要时，加附注一项。

4. 本书处方内所用的中草药名，除新发现草药外，一般均采用全国习惯使用名称。

中草药同名异物与同物异名现象甚为普遍，为了防止用错药，影响制剂质量、临床效果，将本地区习惯使用，一般易于混淆及目前已发现错用的药材品种，在附录中列表，注明药材名、植物名、拉丁学名、科名和本书页数，以供查对。

5. 本书收载的处方，除个别品种外，基本上按报送单

位材料，选编组只作文字上的删改。

中草药制剂处于发展阶段，特别是中草药注射剂，它是随着中草药群众运动新发展起来的剂型，在制作生产过程中，必须具备必要的技术条件和严格执行操作规程。在农村合作医疗站生产注射剂更应慎重，不具备条件，不宜生产这种剂型。目前我们对中草药化学成分的了解还很不够，许多中草药有效成分尚不清楚，故中草药制剂的剂型和制备方法等，随着有效成分的发现在不断改进中，所以本书所收录的处方、剂型及制备方法不是一成不变的。希望广大医药卫生人员和“赤脚医生”应用时，结合具体实践加以改进，逐步提高制剂质量和保证临床使用安全与有效。

6. 本书处方例内所使用的中草药，由市药材公司购进饮片，即可直接供制剂使用。凡自采、自种或购进者为原货，必须经加工炮制合格后，方可供制剂使用。中草药加工炮制方法，可参考北京市卫生局编印的《北京市中药饮片切制经验》一书或北京市药品检验所编写的《北京中草药手册》关于饮片加工炮制部分，本书不另行加注。

7. 本书处方例内使用的中草药，除已注明鲜、干、生或炮制外，未注明者，根据北京地区调剂处方的习惯进行调配。

8. 本书收录的煎剂是指医疗单位土药厂、制剂室成批生产的煎剂，不包括门诊煎药室的煎剂。

9. 本书所使用的度量衡，旧市制：1斤=16两；1两=10钱；公制：克、毫升为计算单位。附录中列有克-钱换算表及钱（两）-克换算表，供换算时参考。

10. 本书为结合中草药制剂特点，故某些剂型（如煎剂、酊剂等）其含义与中国药典规定的含义有所不同。

11. 本书所列的规格、包装、贮藏等三项，仅供参考。

12. 附录中除重点介绍注射用水的制备、部分生物试验、薄膜蒸发浓缩及其土装置、灵芝的人工培养及其制剂，以便推广外，并列表介绍有关常用溶媒的理化特性、中国药典 1963 年版的药筛与常用铜筛对照表、蒸气压力与温度对照表、乙醇浓度稀释表、常用衡量换算表、洗液的配制等，以供参考。

13. 为便于查阅，书后附方剂按首字笔画排列索引及按病种排列索引各一份。

目 录

一、煎剂	1
概述	1
处方例	3
1. 预防流感汤	3
2. 地菊浓缩煎剂	3
3. 流感Ⅰ号	4
4. 流感Ⅱ号	4
5. 流感Ⅲ号	4
6. 小儿流感浓缩煎剂	5
7. 上感浓缩煎剂	5
8. 清解汤	6
9. 浓缩感冒煎剂	7
10. 儿童咳液	8
11. 气管炎煎剂	8
12. 气管炎浓缩煎剂	9
13. 平喘浓缩煎剂	10
14. 柳柏浓缩煎剂	10
15. 穿山龙浓缩煎剂	11
16. 复方地丁浓缩煎剂	11
17. 复方棒棒木浓缩煎剂	12
18. 咳喘宁浓缩煎剂	13
19. 葶苈浓缩煎剂	13
20. 葶苈侧柏合剂	14
21. 喘息煎剂	14
22. 棉黄浓缩煎剂	15
23. 肺炎浓缩煎剂	15
24. 肺炎汤	17
25. 肺脓疡汤Ⅰ	18
26. 肺脓疡汤Ⅱ	18
27. 乙脑煎剂	19
28. 杨梅花浓缩煎剂	20
29. 溃瘍煎剂	20
30. 调中煎剂	21
31. 止吐汤	21
32. 止泄汤	22
33. 小儿理脾汤	23
34. 小儿肝炎煎剂	23
35. 肝炎Ⅰ号	24
36. 肝炎Ⅱ号	24
37. 清肝汤	25
38. 肝炎汤	25
39. 单柳煎剂	26
40. 健肝灵煎剂	26
41. 降压煎剂	26
42. 降压浓缩煎剂	27
43. 利眠汤	28
44. 肺结核祛痰汤	28
45. 滋阴退烧汤	28
46. 抗癆湯	29

47. 止汗湯·····29	59. 痔瘡止血煎劑·····39
48. 甲亢煎劑·····30	60. 复方土大黃濃縮煎 劑·····40
49. 甲状腺腺瘤煎劑·····31	61. 抗破傷風湯·····40
50. 龍葵濃縮煎劑·····31	62. 复方蒼耳子煎劑·····41
51. 脉管炎煎劑·····31	63. 鼻竇炎濃縮煎劑·····41
52. 靜脉炎煎劑·····33	64. 腮腺炎湯劑·····42
53. 胆道蛔蟲湯·····36	65. 清咽煎劑·····42
54. 消脹湯·····37	66. 口炎湯·····43
55. 急性闌尾炎湯·····37	67. 牙周敗毒飲·····43
56. 慢性闌尾炎湯·····38	68. 急性皮炎湯·····44
57. 驅尿石湯·····33	69. 白癜風湯·····44
58. 前列腺炎湯·····39	

二、酒劑和酊劑·····46

概述·····46	9. 表面麻醉劑·····52
處方例·····48	10. 复方草烏麻醉酊·····52
1. 丹參酊·····48	11. 薊酒·····53
2. 复方丹參酊·····49	12. 丁香酊·····54
3. 安眠酊·····49	13. 生發酊·····54
4. 猬皮酊·····50	14. 補骨脂酊·····55
5. 抗風濕酊·····50	15. 燒傷Ⅰ號·····55
6. 舒筋活血酊·····50	16. 燒傷Ⅱ號·····56
7. 复方穿山龍酊·····51	17. 燒傷Ⅲ號·····56
8. 蒼耳子酊·····51	

三、糖漿劑·····57

概述·····57	4. 核桃枝糖漿·····60
處方例·····58	5. 神經衰弱糖漿·····60
1. 小兒咳寧糖漿·····58	6. 小兒口炎糖漿·····61
2. 抗過敏糖漿·····59	7. 鼻炎糖漿·····61
3. 降酶糖漿·····59	

四、散剂	63
概述	63
处方例	67
1. 小儿牛黄散	67
2. 寒砂散	68
3. 小儿磨积散	68
4. 保婴散	69
5. 制痈散	69
6. 胃肠溃疡散	70
7. 胃宁散	70
8. 溃疡散	71
9. 肝炎粉	71
10. 泄痢平	71
11. 三黄粉	72
12. 宫颈糜烂粉	72
13. 正骨散	73
14. 正骨洗药粉	74
15. 外伤止血粉	75
16. 复方地榆止血粉	75
17. 牙痛粉	76
18. 口疮粉	77
19. 口腔散	77
20. 口腔溃疡散	78
21. 养阴生肌散	78
22. 霜梅乳没散	79
23. 制癌粉	79
五、丸剂	81
(一) 蜜丸	81
概述	81
处方例	83
1. 止嗽化痰定喘丸	83
2. 止血丹	84
3. 清肺丸	84
4. 健肺丸	85
5. 健脾舒肝丸	85
6. 肝得安	86
7. 滋补肝肾丸	86
8. 溃疡丸	87
9. 肾炎丸	88
10. 高血压 I 号	89
11. 丹参丸	89
12. 壮身丸	89
13. 坤蜜丸	90
14. 补筋丸	90
15. 紫金丹	91
16. 截瘫丸	91
17. 抗骨质增生丸	92
18. 口腔溃疡丸	93
19. 生发丸	93
(二) 水丸	94
概述	94
处方例	97
1. 关节炎丸	97
2. 狐惑丸	97
3. 泻肝安神丸	98

4. 神经衰弱丸·····99	处方例·····104
5. 清肝丸·····99	1. 四黄丸·····104
6. 喘一丸·····100	2. 肝炎丸·····104
7. 喘二丸·····100	3. 降压丸·····105
8. 喘三丸·····101	4. 柳叶麻黄丸·····105
(三)浓缩丸·····101	5. 痢疾丸·····106
概述·····101	
六、冲服剂·····107	
概述·····107	4. 冠心冲剂·····110
处方例·····108	5. 消食冲剂·····111
1. 小儿感冒散·····108	6. 催乳冲剂·····112
2. 止咳喘冲剂·····109	7. 鼻炎冲剂·····112
3. 降压冲剂·····110	
七、片剂·····114	
概述·····114	13. 消炎Ⅱ号片·····125
处方例·····116	14. 金莲花片·····126
1. 三棵针片·····116	15. 穿心莲片·····126
2. 双黄片·····117	16. 肝炎片·····127
3. 气管炎片Ⅲ号·····117	17. 降压片·····127
4. 新支气管炎Ⅰ号片·····119	18. 关节炎片·····128
5. 柳柏片·····119	19. 活络散风片·····128
6. 平喘片·····120	20. 消痢片·····129
7. 复方啤酒花片	21. 复方马齿苋片·····129
(咳喘灵)·····121	22. 胃宁片·····130
8. 杏苏片·····122	23. 健骨养胃片·····131
9. 柴黄片·····122	24. 止血片·····132
10. 青芥片·····123	25. 血宁片·····133
11. 抗感冒片·····123	26. 眼用止血片·····133
12. 抗炎片·····124	27. 化瘀片·····134

28. 活血片·····135	31. 愈风宁心片·····138
29. 苍术片·····136	32. 舒血宁(6911)片·····140
30. 冠心病片·····137	
八、注射剂·····141	
概述·····141	18. 紫花地丁注射液·····162
处方例·····149	19. 地丁Ⅰ号注射液·····163
1. 乙脑注射液·····149	20. 地丁Ⅱ号注射液·····164
2. 三黄注射液·····150	21. 锦灯笼注射液·····165
3. 三棵针注射液·····151	22. 抗腮腺炎注射液·····165
4. 牛西西注射液·····152	23. 消炎Ⅲ号注射液·····166
5. 地龙注射液(止喘 宁注射液)·····153	24. 消炎Ⅳ号注射液·····167
6. 棒棒木注射液·····154	25. 野菊花注射液·····168
7. 复方射干注射液·····154	26. 红花注射液·····169
8. 芫蒿注射液·····155	27. 核桃枝注射液·····169
9. 茵陈注射液·····156	28. 复方地榆注射液·····170
10. 复方金银花注射液·····156	29. 复方三黄注射液 (6910注射液)·····170
11. 青龙衣注射液·····157	30. 复方公英注射液·····171
12. 柳叶注射液·····158	31. 复方红藤注射液·····172
13. 复方茵陈注射液 (6912注射液)·····159	32. 复方金钱草注射液·····173
14. 当归注射液·····159	33. 复方黄耆注射液·····174
15. 独活注射液·····160	34. 黄精注射液·····174
16. 复方老鹳草注射液·····161	35. 胚胎组织注射液·····175
17. 柴胡注射液·····161	36. 农吉利注射液·····176
九、膏剂·····177	
(一)浓缩膏·····177	1. 龙葵膏·····178
概述·····177	2. 柳叶膏·····178
处方例·····178	(二)黑膏药·····179

概述·····	179	5. 祛湿膏·····	188
处方例·····	181	6. 铁箍散膏·····	189
1. 拔膏棍·····	181	7. 黑布药膏·····	190
2. 痈疽膏·····	183	8. 跌打软膏·····	190
3. 鸭鸣膏·····	184	9. 烧烫伤药膏·····	191
(三)软膏和油剂·····	185	10. 复方紫草膏·····	192
概述·····	185	11. 石黄油·····	192
处方例·····	186	12. 儿茶油·····	193
1. 三棵针软膏·····	186	13. 花椒油·····	193
2. 化毒消肿膏·····	187	14. 复方大黄油·····	194
3. 九华膏·····	187	15. 紫草油·····	194
4. 芙蓉膏·····	188	16. 紫黄油·····	194
十、其它·····	196		
处方例·····	196	12. 皮炎洗剂·····	204
1. 十滴水·····	196	13. 复方苍耳子洗剂·····	204
2. 宽胸丸·····	196	14. 冰片龙胆紫溶液·····	205
3. 蒲麻滴鼻剂·····	197	15. 溃瘍纸·····	205
4. 鼻炎滴剂·····	198	16. 蜂房甘油·····	206
5. 辛黄液·····	199	17. 苍灭脓·····	206
6. 红藤滴鼻液·····	199	18. 牛西西鞣酸止血剂·····	207
7. 抗炎眼药水·····	200	19. 紫草止血剂·····	207
8. 藤菊兰眼药水·····	201	20. 冻伤糊·····	207
9. 冰硼栓·····	202	21. 骨伤糊·····	208
10. 口腔洗液·····	203	22. 臍洗药·····	209
11. 含漱液·····	203	23. 臍药·····	209
附录·····	211		
一、注射用水的制备·····	211		
二、部分生物试验·····	219		
三、薄膜蒸发浓缩及其土装置·····	222		

四、灵芝的人工培养及其制剂	225
五、附表	229
药材名、植物名、拉丁学名对照表	229
常用溶媒的理化特性	235
《中国药典》(1963年版)药筛与常用铜筛对照表	236
蒸气压力与温度对照表	236
乙醇浓度稀释表	237
常用衡量换算表	238
克-钱换算表(单位:钱)	238
钱(两)-克换算表(单位:克)	239
洗液的配制	240
按病种排列索引	241
按首字笔画排列索引	248

一、煎 剂

概 述

煎剂系将药材加水煎煮，去渣取汁服用的液体制剂。是临症最常用的剂型，一般多用于新病和急病。

将煎液加热浓缩至规定量，即称为浓缩煎剂。浓缩煎剂，缩小了体积，提高药液单位含量，减少服量，为煎剂的一种发展，甚受工农兵群众欢迎。

煎药容器：根据条件和制备量选用砂锅、搪瓷锅、铝锅等，但勿用铁锅，以防药材所含化学成分与铁离子发生作用，影响制剂质量。

煎剂制法：按处方调配，经核对无误后，放煎药容器内，加入清水，加水量一般没过药材 2~4 厘米（第一煎应多加水），搅拌后，放置浸泡 20~30 分钟，直火加热煎煮，未沸前用武火（大火）；沸后改用文火（小火），保持微沸，并时加搅动。煎煮次数和时间：一剂药煎煮两次，第一次（头煎）于沸后再煎 20~30 分钟，滤取煎液。药渣再加清水，第二次（二煎）于沸后再煎 15~20 分钟，滤取药液。每一剂，煎取药液量：儿童 100~150 毫升；成人 200~300 毫升。若为多剂，可根据药材性质、生产量，来决定煎煮次数和时间。一般煎煮三次，第一次于沸后再煎 1~2 小时；第二、三次于沸后再煎 1~1.5 小时。煎取药液量，按上述一剂煎取药液量乘投料剂数，即为煎取药液总量。

制备煎剂应注意：

1. 方剂中含有大量的生矿物、生贝壳类等质地坚硬的药材，如：生石膏、生石决明、生赭石、生牡蛎、生龙骨、生磁石、生瓦楞子等，应先煎（15~20分钟），然后再加入群药共煎至规定时间。

2. 方剂中含有挥发性成分的药材，如：薄荷、紫苏叶、藿香叶、佩兰叶、荆芥穗等，应后下（群药煎成前5~10分钟）。若制备浓缩煎剂，含挥发性成分的药材，应先用水蒸气蒸馏法（具体操作方法，参阅本书注射剂制法有关项下），提取挥发性成分备用。蒸馏瓶或蒸锅内的药液过滤与煎液合并，药渣与群药共煎，最后再将馏液与煎液合并。

3. 含粘性成分、带有绒毛及粉末性的药材，如：牵孙子、葶苈子、旋复花、青黛、六一散、滑石粉、黛蛤散、益元散、伏龙肝等应用纱布袋装（装七成满），扎紧袋口，再与群药共煎。

浓缩煎剂制法：将上述所得的煎液，置容器内，直火加热浓缩，待药液转浓时，改用水浴锅或文火继续浓缩（时加搅拌，以免糊焦，并利于水分蒸发）至规定量（一般1:1~1:2，本书收载的浓缩至1:4，即每一毫升含4克原药材），或在搅拌下，加入1.5~3倍量95%乙醇，静置过夜。过滤。滤液减压回收乙醇。再浓缩至规定量。缓缓加入防腐剂，随加随搅拌，放冷后，加入提取的挥发性成分，搅拌均匀即得。

煎剂的防腐：

1. 配制时，操作人员应做好个人、环境、工具等卫生工作。

2. 贮药瓶及瓶塞应洗刷洁净，烘干，有条件应行灭菌。

3. 应加适当的防腐剂，常用的防腐剂有：苯甲酸，常用量为0.2~0.3%，制剂呈酸性者适用；苯甲酸钠，常用量为