

王孟英 著

鵝

鳴



上海科學技術出版社

鷄鳴錄目次

女科第一	一
兒科第二	一
養生第三	一
虛勞第四	一
哮喘第五	一
反胃及竊噎隔第六	一
痞積第七	一
腫脹疽瘻第八	一
癲狂癇疫第九	一
中毒第十	一
頭面七竅病第十一	二
風痺脚氣轉筋鶴膝第十二	三
前陰病第十三	四
後陰病第十四	四
外科第十五	四
傷科第十六	五
祛蟲害物第十七	六

鷄鳴錄

海昌野雲氏鈔

烏程荔牆蹇士參

後學諸暨劉淡如校

女科第一

一千金寶要列婦人門于第一殆易始
乾坤詩首闢雌之義也茲仿其例

帶下

帶下女子生而卽有津津常潤天賦之恆或至太多是病也然古以
婦人隱疾統名帶下今人但知白帶赤帶等名耳病因非止一端

丸。每晨淡鹽湯送服二錢。

○火盛者。黃藥烏鵲骨等分研末。女貞子煎濃汁。法丸。葛豆大砂仁一錢研末泡湯。早晨送服二錢。

○屬濕盛者。松石猪肚丸。每早蓮草

早淡豆腐漿送服三錢。

○火盛者。黃藥烏鵲骨等分研末。女貞子煎濃汁。法丸。葛豆大砂仁一錢研末泡湯。早晨送服二錢。

○旱蓮草酒水各半煎服。如治血崩加木耳

炭一錢五分 血餘一錢 共研細末調入服。

調經

人參 甘草 桑寄生

酒炒

丹參各二兩

製白朮八兩

黃芩 當

歸各六兩

牡蠣煅飛

杜仲炒鹽水

扶苓

免絲餅

枳殼

白芍各四兩

川芎

澤瀉各三兩

十五味爲末。煉蜜丸。每重錢半。以一丸空心開水調服。治氣虛血少。經事不調。赤白帶下。腰痠胎滑。或不受孕皆效。一方去丹參人參加西洋參製香附陳艾各一兩。尤爲保胎要藥。凡胎氣易滑者。每交三五七月。頻服之甚效。或不用蜜丸。每服散藥一錢二分。開水

下亦可。並治胎前惡阻亦驗。

秦氏養胎法 妊娠二月氣血不足。胎氣始盛。逆動胃氣。惡阻嘔吐不食。

半夏湯主之

半夏

橘紅

鹽水

茯苓

各一錢

酒芩

麸炒枳殼

紫蘇

各八分

炙甘草

五分

生薑

一片

煎服

野雲氏曰。腹中藏府各有定位。受孕則多了一日長夜大之活物。藏府覺其偏仄而不安。氣血爲之窒礙而不調。不但痰飲漸生。甚或不能客谷。病名惡阻。以其嘔惡而阻納也。治以通氣化痰。固爲扼要。若脾氣素弱者。用繆氏資生丸。培運兼施。更爲妥妙。此丸兼治大人小兒胃強能食。脾虛少運。飢飽失時。致生諸證。及病後老年。膏粱安逸。氣機窒滯。思慮傷脾等恙。神妙不可殫述。在善用者。神明其意耳。○抑青丸。三月前十日服。川連

三兩

蜜

薑汁炒三次爲末。米糊丸。葛豆大。每三四分。或七八分。煎前方半夏湯送服。○和氣飲。四月倦臥不安。或口舌頭痛。脚弱及腫者。

白朮

土炒一錢

鹽橘紅

一錢

鹽香附

二錢研

茯苓

八分

炒

白芍

酒芩

各一錢

川芎

炙草

各五分

酒歸身

六分

煎服。熱多加梔炭

如無恙可勿服。按各月皆然
不僅此方也汪謝城曰。妊娠無疾。不宜服藥丸。無故服藥。名曰保胎。適使墮胎。富貴之家。雖勸停藥。必不肯信。真庸人自擾也。蓋無病不必服藥。凡人皆然。豈獨妊娠哉。養胎飲。五月胎長。腹

重睡臥不安者。酒洗歸身 酒芍 鹽澤瀉各一錢 土炒白朮一錢
酒芩 蘆枳殼 川芎各八分 炙草四分 煎服二劑。○如勝飲六月
胎氣不和。或腹痛胎動不安。歸身二錢 焦白朮一錢 酒芩 酒芍
炒砂仁 袋芩 酒蒸續斷各一錢 炙草五分 煎服。萬全飲。七月腹大重墜者。
續斷 土炒歸身 川芎各一分 阿膠 熟地 酒芍 炒荆芥各八分 炒橘皮二錢
煎服二劑。○調氣飲。八月喘腫。不拘有無外感皆治。焦白朮各一錢 酒芩五分
酒芩五分 土炒袋芩 焦白朮各一錢 蘆枳殼八分 炙草三分 煎服六日進一劑。
二劑。七日再服。○順胎飲。九月雖無病。宜順氣和中。使無難產。歸
身二錢 皮各八分 焦白朮一錢 酒芩 滑石末 酒蘇梗 酒芍 酒洗腹
煎服二劑。八日進一劑。○滑胎飲。臨月服。一二日進一劑。燒
而止。袋芩 歸身各一錢 焦白朮 煙川芎 製香附 廣皮各二錢
蘇梗八分 酒芩五分 炙草五分 煎服。氣虛加人參一錢。胎肥加蘆枳
殼一錢。按素患墮胎。及難產者。逐月按方服之。可保無虞。
孕婦心腹痛甚。鹽少許炒赤。取一撮淬酒服立止。
胎氣上頂。好醬油如常滌湯飲卽安。
日月未足欲產。全蛇蛻一條。絹囊之繞繫腰間。

保產催生

大黃

酒蒸

益母草

酒醋
薑炒

艾

另研酒
醋薑炒

生地

酒蒸各
二兩

莪朶

醋炒

赤芍

延胡

酒醋
薑炒

烏藥

醋酒
炒

冬葵子

炒

蒲黃炭

人參

川芎

酒炒

劉寄奴

酒炒

香附

薑酒
醋炒

蒼朮

泔水
侵炒

黃芩

酒炒

白芍

酒炒各
一兩

肉桂

大錢
二十

三稜

醋炒

青皮

炒

枳殼

麸炒

丹皮

乾薑

炒黑各
八錢

人參

川芎

酒炒

胎衣不下

黑大豆

一二三合

洗淨炒香

入醋一椀

煎數沸去豆

取汁分二

肉桂

六錢

人參

川芎

酒炒

生新臨產服之可免諸病。按亦惟氣血有餘或奉養太過者宜之。檢方者能量體裁衣斯用無不效矣。如氣鬱血滯而經不調者亦可治之。

胎衣不下 黑大豆二三合洗淨炒香入醋一椀煎數沸去豆取汁分二次服立下。○山奈二片含口中津生嚥下自落。

產後鼻衄若口鼻有黑氣乃不治之證急取紅線一縷併本婦頂心髮一二莖緊縛中指上以糞萬一。

產後昏暈 清澈童瀉乘熱灌之即甦。○鐵器燒紅於牀內淬醋中俾

醋氣衝入鼻間自醒此法兼治男婦神魂不斂諸證神效併辟邪祟禾

人名曰醋箭。

產後呃逆不止 陳壁錢卽喜兒窠三五個煎湯呷下立止。

乳不通 白殭蠶末二錢 酒下 ○老絲瓜連子燒存性研末酒下被蓋

出汗自通。○麻仁

漏蘆

穿山甲

鵝管石

各三錢

麥冬

王不留

行各六錢 六味爲末。每二錢七釐。牡猪蹄煎湯調服。其乳如泉。

兒科第二

初生不啼 鮮石菖蒲杵汁灌入口即生。

初生瀨閉

芸薹即油菜

葱管五寸 煎湯熏洗。

胎毒鵝白痰盛

蠻金皂莢水煮乾磨切一株

綠豆粉各五錢

炙甘草 馬牙硝各一錢

共

研細。以生地汁對蜜煎成膏和丸。用時磨濃汁。鵝翎掃入口內。方名黃

地膏。○白礬

朱砂各二錢五分

牙硝五錢

共研極細。先拭淨口。每二分

半水調塗口舌上。名保命散。

臍受風濕臭水時流

枯礬六錢

牡蠣殼三錢

海螵蛸 白螺殼各二錢

芷一分一錢 冰片一分 爲末。繆之。半日後用熱水紋乾布拭去。再繆二日。

斷臍後外傷風濕唇青口撮多啼不乳口出白沫

全蝎二十一個去頭尾酒塗灸研

麝

香少許另研

和勻。每一分金銀花湯或麥冬湯調服。名宣風散。

噤口撮口臍風

蠟蛇一條酒灸

蠍梢四條

殼蟲七條

瞿麥五分

共研細。以

一字吹鼻中取嚏。啼哭可治。仍用薄荷湯調一字

二分半也 服。名益黃散。

汪謝城曰。古人所云一錢。錢者量也。以錢一文取藥末堆滿錢上爲一錢。錢半之爲半錢。錢又半之爲一字。蓋錢文有四字。故以四分之一爲一字也。今人所云十分爲一錢。十錢爲一兩者也。每一錢爲二錢四分。

與一錢錢大異。此乃以二分半釋一字。是衡量不分矣。

○生地 生

薑 蔥白 芥菔子 田螺肉 杵爛塗臍四圍一指厚。抱住洩屁卽
瘥。名五通膏。

臍瘡不瘥風傳經絡欲變癰證 黃連二錢 胡粉 龍骨煅各一錢 各另研。再
合研。每少許傅臍中。名金黃散。

諸驚 辰砂三錢 蓬砂 牙硝各一錢 明粉二錢 全蠍 珍珠末各一錢

麝香半分 共研細末。和棗肉杵。自然成膏。每一豆許。金銀花薄荷湯下。

潮熱甘草湯下。月內嬰兒。乳汁調塗臍上。令吮下。名辰砂膏。

○天竹

黃 飛辰砂各一錢 雄黃一錢 牛黃四分 真珠 麝各三分

冰片二分 製

巴豆霜四十粒 人味研細。用鈎藤鈎一兩 糯米一撮 煎湯共丸。如菉豆大

密儲。每一丸。鮮竹葉湯調下。

○附製巴豆霜法。取新川巴豆四十九

粒。同生南星 生半夏各一 用水煮。至南星半夏極爛。取出巴豆。以大

棗七枚去核。將巴豆包入棗內外。以陳酒調麪糊厚。放飯上蒸三次。去
麪棗。將巴豆研。去油作霜。

痰熱癰厥俗名急驚風 生石膏十兩 研細。研勻。三歲內者服一錢。七歲

內者錢半。十一歲內者一錢。十六歲內者一錢五分。大人痰厥類中風者。二三五錢。均用生白蜜調下。一服卽安。

杜驚稀痘

生川大黃

生粉甘草各三

辰砂一分

共研細。以赤沙糖

一錢

開水調烊。入藥末。再調勻。凡小兒落地後一周。特用茶匙。徐徐勻

作兩日內隔水頓溫灌下。永杜驚風之患。日後出痘必稀。若未服此。至

五七日之間。已動驚風。用此一服即愈。

稀痘

橄欖核

拭淨打碎

連仁曬乾研細。用瓶收起。每逢水閉日。將末挑一二三

茶匙。加糖霜少許。開水調服。至多次。痘可不出。即出亦稀。併治魚骨鯁喉。

痘出珠內

麥冬一兩五錢

杵爛如泥。如乾加無根水數滴成餅。左目貼右足心。右目貼左足心。其痘自落。

痘瘡倒陷。毒甚便血昏睡。

麝退雞卵殼

去膜

新瓦焙研。熟湯調服五分。

月內嬰兒。酒調抹唇上。並塗胸背。及風池穴更妙。穴在督萎骨下頸處左右皆是救急便方法人無算

痘疔 凡痘中數粒不起。變黑而痛者。痘疔也。或緊黑而大。或黑壞而臭。

或中有黑線。此十死八九之證。急用豌豆俗名寒豆。豆圓如珠。其味甜熟于孟夏四十九粒。煅存性真珠一分入豆煮過頭髮灰三分各研細末。先以簪挑破疔。唾去惡血。點藥少許。即時變

爲紅色。名四聖丹。

胎瘡滿頭。水邊烏桕樹根。曬燥研末。入雄黃少許。生麻油調塗。

胎癩

明礬

松香各五

蔥白七莖

飯鍋上蒸熟。

待冷研細。加東丹二錢。

冰片 三分 研勻。麻油調敷。○松香二兩 黃丹一兩 無名異

炒一錢

黃丹一兩

無名異

炒一錢

鉛

丹

炒一錢

輕粉

炒三錢

五味

研細和勻。入原株葱管內。葱尖之口用線紮入。

鍋水煮熟。去水曬乾去蔥。再研細。鳳凰油或麻油調塗。

乳香

炒一錢

甘草

沒藥

川連

牛黃

各一錢

六味

研細。

每五分

金銀花湯

調服。治一切惡瘡脂水淋漓。沿及偏體。乍癢乍疼。外用製甘石研細濃煎。川連調搽即愈。

胎剝 雨大腹近小腹處生瘡。若皮脫開近小腹則不救。此名胎剝。先用

豬膽汁抹之。再用黃藥

炙研

研敷。或加伏龍肝末等分。唾濕患處繆之。

濕瘡疳癬

黃連

黃藥

各五錢

黃丹

水飛一兩

輕粉

一錢

麝香

半分

研勻洗

淨患處繆之。名金華散。

走馬牙疳

蛔蟲瓦上焙乾。研極細。加青黛冰片各少許。研勻吹之。

○

屋楞上乾貓屎。

以磚白結燥者佳

研細末。

每一分錢

加冰片一分。研勻童便調敷。

○蛇

牀子

炒黑各五錢

黃丹

地龍

炒黑各五錢

青礬

一錢

共研細揩牙齦上。日三次。名

紫金散。

口舌生瘡

薄荷葉

荊芥穗

各五錢

青黛

明粉

蓬砂

各二錢五分

百藥煎

甘草

各三錢

研細

每一分半至五分

點舌上

令自化。

或新水入蜜調點舌上。亦治大

人名緣袍散。

○黃藥

蜜塗鹽十數次

甘草

各一兩

研細繆。

或用麥冬湯調點名緣袍散。

黃金散。

口內多涎。涎不流出乳食不下。此脾胃蘊熱也。朱砂 半夏 膽星各一兩
扶苓五錢 石膏六錢 飛金頁二十。俱研極細。生薑汁丸。黍米大。每十
丸。枇杷葉湯下。名金珠丹。按小兒不能吞丸藥。調烊灌服爲宜。
咽喉痺痛不能吞嚥。蓬砂 冰片 雄黃 朴硝等分研細繆入。名立
效散。

喉腫而痛。氣塞不通。朴硝一兩 生甘草二錢研細吹入之。

久嗽 生西瓜子煎濃湯常服。亦治大人兼治吐血。

諸疳肚大黃瘦及腹痛蟲積痰熱風癆等證

雄黃三錢

膽星一錢

全蠍去足炒

殭蠶炒各一錢

麝香

飛

巴豆霜各五分

俱秤淨末。神麴糊丸。菜子大。飛辰砂爲衣。每一丸白湯下。

疳積便瀉

皮硝三錢

杏仁 生梔子

紅棗各七枚

連鬚葱白七莖

飛

麴三錢

酒釀或渾酒腳和擣如泥。攤貼腹上。以布縛之。腹露青黑色。五

日一換。以腹白爲度。重者二作必愈。

○蓮子

山藥各五錢

史君子肉

生熟各半四錢

川連 胡連

神麴 查炭

麥蘖各三錢

青皮炒各一錢

九味研細

水法丸。每服一錢五分。開水送下。

疳膨食積蟲氣上攻至晚不能視物目生翳障等證。雞肝一具不落水竹刀切片。用牡蠣粉八分辰砂少許。水飛研細拌勻。繆入肝內。飯上蒸熟食之。如此

十次。翳障退淨。服藥時忌茶湯油膩。

目閉不開不赤不腫不能用藥。黃連煎濃汁塗足心。

無辜卒死。葱白杵爛納入兩鼻孔及下部氣通。有嚏即活。

養生第三

養生之道不必旁求。大易云。慎言語。節飲食。豈非不刊之論。應休璉詩云。量腹節所受。斯得其旨矣。○孔子曰。食無求飽。隨園詩話云。無求便是安心法。不飽真爲却病方。

無病平人飲食宜節。體稍不適尤勿強食。病之初來未必甚劇。不慎口腹遂至結轎。變證多端。不能盡述。非遇明眼。貽誤莫識。凡在病中。慎口須知。猪羊鷄鴨外感忌之。堅硬壅滯諸病不宜。薑黃椒蒜熱證勿施。瓜果生冷寒病休窺。產婦痘後發物毋沾。沈疴痼疾禁例同嚴。正衰邪盡。食宜餐。胃弱忌苦。脾困喜酸。滑澀辛甜各有宜忌。物性多偏不可專嗜。病從口入。膏粱莫及。厚味腊毒古訓須識。澹泊能甘。病奚能肆。撙節得宜。病愈必易。無如愚人罕明食性。當禁不禁。禁非所禁。倒行逆施。反以加病。彼此貿貿。甚至殞命。我見實多。弊難筆竟。聊贅俚言。以爲世鏡。

虛勞第四

童勞 鮮百合 鮮地骨皮 紅棗 蒸白梗米等分。砂飴蒸露常服

代茶。百日自效。童栻盧云。此方不但童幼適口。且無敗土之虞。真妙法也。治經多人。歷有成效。按大人內熱津虛者亦治。
○黑大棗 猪肉
斤各一

地骨皮四兩 煮食。薛瘦吟極言其效。按大人羸瘦內煩者亦治。
蛤殼煅飛五兩 滴乳石水煉飛 參貝六賢散一兩五錢 方見後 共研

細。秋石湯調五六分。治虛火上炎。氣升欬逆。時吐涎沫。爲保肺清金。而不礙脾胃之要藥。
○生地三兩 茯神三兩五錢 紫石英煅飛 遠志 蔡

不 碳 各 仁

當歸一兩五錢

川連一錢

十四味研細。用連血豬心一個。入辰砂

石菖蒲八錢

盤十兩 七味。以甘泉桑柴火砂鍋。或銅鍋煎至味盡去渣。熬膏將成。入

黑驢皮膠三兩

收。另用人達杏仁去皮尖一斤

研末和搗爲丸。如蓮子大。飛

冬蟲夏草六兩 紫花地丁八兩 沙苑蒺藜八兩 人角金
盤十兩 七味。以甘泉桑柴火砂鍋。或銅鍋煎至味盡去渣。熬膏將成。入
黑驢皮膠三兩 收。另用人達杏仁去皮尖一斤 研末和搗爲丸。如蓮子大。飛

金爲衣。名清金養血丹。治男婦虛勞。夜熱咳嗽。痰喘胸悶。咯血腸紅。並
治血不養心。夜不安寐。手足拘攣。步履艱難。及老年喘逆。胃閉溲短便
泄等證。每服二丸。絲瓜絡煎湯。或藕湯送下。小兒減半。孕婦忌服。或併

人達杏仁熬膏服亦可。

○西洋參

龍眼肉同蒸透

沙蒺藜

鹽水炒

萸肉

酒炒

茯苓人乳拌藥各二兩

直生地

直熟地

炒仁末拌砂

白朮

土炒各四兩

杞子

酒蒸五次一兩五錢

肉

茺蔚焙五兩

血餘

一兩二錢

虎脰骨

酥炙一對

酒

水炙取濃汁打丸。桐子大。每服四錢。淡鹽湯下。治下元虛弱。腰足軟。神疲色瘁。勞怯損傷諸證。神效。名培本丸。

解佚

橘虛體竭也

辰砂

飛

乳香

去油燙心研各一兩

以雞卵一枚。打一孔去其黃白。將二

味各裝雞卵殼內。紙糊七層。青絹袋盛之。令精壯婦人。貼肉懷于臍間。常使溫暖。辰砂懷三十五日。乳香先十四日備懷。四十九日取出。各再研細。另用茯神。赤石脂。川椒。炒出汗各二兩。二味預爲細粉。與砂乳粉和勻。以蒸熟紅棗肉杵丸。菉豆大。每三十丸。空心參湯或溫酒下。一月外。加至四十丸。名遐齡萬壽丹。又名五老還童丹。須甲子庚申夜。幽靜處修合。忌婦人雞犬見之。

陽衰

胡椒五粒

母丁香三粒

黃丹三分

生礬一分

共研細。醋調塗臍

中外以膏藥封之。名健陽膏。

○生附子

甘草

大蒜

青蔥

甘遂

各二兩

海馬

川椒

紫梢花

沙苑子

蛇床子

狗膽

良薑

故紙鹿茸木鼈子狗頭骨山奈五味子大茴香

各一兩

海螺鈞韭子木香地龍胡椒穿山甲鎖陽全蠍當歸

蛤蚧 蟠蛇 蜂房

各五錢

三十一味。用麻油四斤浸。

夏五月冬半月春秋一旬煎枯去渣

公丁香一兩

熬至滴水成珠。以鉛丹收。待溫攬入。後十二味肉桂

二兩

鴉片 陽起石 石硫黃 乳香 珠砂 乾安息

各五錢

元精石 蟲

酥 麝香

各三錢以上俱研極細

蘇合油

五錢

丁香油

三錢

並徐徐攬入。卽成治陽氣虛弱腰突腳酸。瀦冷便溏。神衰痿憊等證。以此攤貼涌泉腎臍丹田等穴甚有效。名黍谷回春膏。

杜仲

歸身

乳香

各五兩

丁香 甘草

川芎 半夏 蒼朮 黃耆 檀香

木香

各三兩

附子 大茴 洋參

各二兩芸香 降香 薄荷 甘松 桂枝 巴戟

杷子 山柰 辛夷

鎖陽 乾薑 益智 獨活 五味子 乾安息

各一兩

沉香

六錢

三十味研細。或加海馬一對。拌入蘇合油瓊玉膏

各三兩

丁香油

二兩

勻收儲。每一劑用藥四兩五錢。配艾絨

八錢

加肉桂鹿茸冰片

各一錢

麝

研細拌勻。鋪於縣上。闊二寸半。長二尺餘。再用紅布包而縫之。

五分麝

外包以絲綢或綢繩。長四五尺。綫行爲帶。可繫於腰。名緩臍帶。或作肚兜式。繫之亦可。故一名緩臍兜。治陽虛體弱。食少便溏。氣滯血寒。結成癥痞。男婦內疝。腹痛腰痺。諸證極效。但止宜繫於冬令。春時卽當解下。

略焙藏錫器中。勿洩氣。則一劑可用一二年。男子陰虛火盛。女子血虛內熱者勿用。

唾血

甘梨六十個去心打取汁二十鍾酸者勿用

白茅根汁

生地汁

各十鍾

麥冬凍分五鍾

生蘆菔汁

五鍾

右汁合和重濾去渣緩火煎之入煉蜜

一斤

飴糖

柿霜各八兩

生薑汁

半小杯

再熬如稀糊收起去火氣每挑服三五匙日

三不拘時。

咳血

去皮仁尖

天冬

麥冬各二錢

生地

薄荷各二錢

川貝

去心茯苓各一錢

桃

生薑汁

犀角

鈎羊角

各五分

水八杯煎至三杯去渣

入梨汁

蘆菔汁

蘆菔汁

青蔗汁

白人乳

各二杯

熬成膏加煉白蜜二兩收重湯

再頓半日服法如前按前方名元霜紫雪膏此名五汁膏所用取汁之物或非全有之日則竹瀝蘆根汁之類易一二味可也。

火嗽

去皮仁尖

梨汁

藕汁

蘆菔汁

鮮薄荷

各二錢

入酒炒枯芩細末一兩

白糖霜一兩

細火熬成膏服如前法名化痰膏

乾嗽

直生地二斤人達杏仁去皮尖白蜜各四兩生薑洗淨二兩

共擣如泥飯

久嗽

直生地

直熟地浸並酒

天冬

麥冬各二兩川黃檗鹽酒炒

白芍

酒炒水浸二五次

茯苓

山藥

杞子

元參

生苡仁

川貝

去心

陳皮

各一兩甘草五錢

各研細

白蜜丸

彈子大空心噙化名滋化丸

七錢

甘草七錢

各研細

白蜜丸

彈子大空心噙化名滋化丸

綠豆粉

水浸二五次

北五味

○天花

粉一斤用清水浸洗刮去粗皮切片曬乾磨細末篩過取極細者盛錦袋內於清水中揉洗出漿去渣澄清換水如此五七次芳味去盡曬燥取十二兩

靈乾四兩

一二粉共一斤。用薄荷一斤。入瓶内。葉層層間隔。裝好封瓶口。入鍋內。隔水煮二炷香。取起冷定。開瓶。篩去葉。取粉。配入白蓬砂各五錢。白荳蔻仁。元明粉各一兩。白石膏二兩。炳霜三兩。白糖霜八兩。同研細末。和一二粉密盛鉢內。每以一二匙噙化。消痰止渴涼血滋陰。明日安神。條煩解渴。醒酒辟穀。名白玉丹。

○好道地橘皮陳而色紅者米置緩處候發過不鹽而味酸爲度。鹽乾研末名百藥煎。七用生薑汁蘆菔汁浸拌照前蒸鹽名七製陳皮能消食寬中化痰順氣。配以百藥煎。五倍子不拘多少敲如豆辦大塊淨用白酒糟拌勻。

○好道地橘皮陳而色紅者米置緩處候發過不鹽而味酸爲度。鹽乾研末名百藥煎。七用生薑汁蘆菔汁浸拌照前蒸鹽名七製陳皮能消食寬中化痰順氣。配以百藥煎。五倍子不拘多少敲如豆辦大塊淨用白酒糟拌勻。

○前湯浸蒸鹽乾二三用甘草三兩去皮照水照前煎浸鹽乾四兩用桔梗去蘆淨四兩用米水浸一宿煎濃汁二碗去渣入白蓬

○竹鹽浸拌照前蒸鹽乾四兩用米水浸一宿蒸透鹽乾

○人參。細茶葉紅者勿用亦勿太陳。半夏製。烏梅肉。薄荷葉。山楂末各一兩。沉香。檀香各一錢。北五味。白蓬砂各五錢。共研極細。加白糖霜十兩。煉白蜜十兩。和勻。擣千杵。印成小餅子。味以好泉水同煮。候乾鹽燥爲細末。以蛤粉以叭瞳杏酪。丸如龍眼核大。臨臥噙之口中。聽其自化。滲入咽中。尤滌痰治嗽良法。並治胸膈不舒。痰多食少。極效。

○製半夏。陳皮一斤去白略煎去辣味。六元參。甘草各三兩。薑製南星一兩。西洋參。川貝母去心各二兩。蛤殼六兩。俱研細和勻。每用五六分。不拘時。開水調下。名參貝六賢散。去