

R 26
2-2

95-112

御纂醫宗金鑑卷四

編輯外科心法要訣目錄

項部

腦疽

偏腦疽

天柱疽

魚尾毒

百蟬疽

喉癰

夾喉癰

少陽經癰瘰

太陽經濕癰瘰


馬刀癰瘰

陽明經癰瘰

重臺癰瘰

上石疽

失榮證



鈕扣風

背部

上中下發背

上搭手

中搭手

下搭手

蓮子發

蜂窩發

陰陽二氣疽

串疽

酒毒發

連珠發

丹毒發

禽疽

痰注發

黃瓜癰

腰部

金剛卷四

腎俞

纏腰火丹

中石疽


御纂醫宗金鑑卷四

編輯外科心法要訣

腦疽圖



腦疽生項後入髮際正中屬督脈經



御纂醫宗金鑑卷四
編輯外科心法要訣

偏腦疽

圖



偏腦疽項後髮際傍開于半屬膀胱經濕濕癢異

醫宗金鑑卷四



項部

腦疽

腦疽項正屬督脈左右偏腦太陽經陽正陰偏分難易治與癰疽大法同

註

此疽有正有偏正屬督脈經入髮際名爲腦疽俗名對口偏屬太陽膀胱經名爲偏腦疽俗名偏對口正腦疽係陽亢熱極而生其證多焮赤腫痛色鮮紅活根束頂尖時痛時止督脈純陽起於尾閭上貫顛頂挾毒上升故易膿易腐易斂多屬順證若偏腦疽係寒熱錯雜所生其證漫腫色暗平塌堅硬然足太陽經外陽內陰從頭走足陽降陰

凝難膿難腐難斂多屬逆證更有兼風濕者其瘡根又易
於散大旁流故順逆二證治法當辨別是癰是疽腦癰者
皮薄易破腦疽者皮厚難破初起有表證令人寒熱往來
宜服荆防敗毒散有裏證令人口唇焦紫大渴大便結燥
宜服內疎黃連湯若瘡勢已成按癰疽腫瘍潰瘍門大法
治之

荆防敗毒散

荆芥

防風

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

川芎

枳殼

礞石炒

茯苓 各一錢

人參

甘草 各五分

薑三片水二鍾煎八分食遠服

寒甚加葱三枝

方歌荆防敗毒治初瘡憎寒壯熱汗出良羌獨前柴荆防桔普

枳參苓甘草強

內疎黃連湯 見腫瘍門

天柱疽圖



天柱疽項後堆骨高尖處屬督經

此水二臉照人衣食致

人參

廿

天柱疽

天柱疽生天柱骨上焦鬱熱蓄督經灸之有炮方爲順色黑形陷逆而凶

註

此疽生於項後高骨名天柱骨卽大椎骨也疽之初起形如臥蠶由上焦鬱熱蓄於督脈以致肩背拘急極痒入骨宜於疽上以艾灸之若灸之有炮者順無炮者逆甚至色黑形陷血出不止潰爛神昏嘔噦惡心等證是爲大凶其內外治法同腦疽

魚尾毒圖



魚尾毒在項後髮際下兩傍魚俗名燕尾即偏腦疽之小際也左君臣

魚尾毒

魚尾毒生後髮角在左在右淺而輕膀胱濕熱七日潰膿出腫消痛白寧

註

此毒生於項後髮際兩旁角處由足太陽膀胱經濕熱凝結而發其毒或在左或在右皆屬輕淺初起宜荆防敗毒散膿將成宜服托裏排膿湯其外治之法同癰疽腫瘍潰瘍諸證

托裏排膿湯

當歸

白芍 酉炒

人參

白朮

土炒

茯苓

連翹

去心

金銀花

浙貝母 各一錢
去心

生黃耆 二錢

陳皮 八分

肉桂 六分

桔梗 胸之上加一錢

牛膝 下部加八分

白芷 頂之上加五分

甘草 四分

薑一片水三鍾煎一鍾食遠溫服

方歌托裏排膿治潰瘡排膿消腫實稱強歸芍四君翹桂芷銀

耆貝桔膝陳良

荆防敗毒散 見腦疽

百 岷 疽 圖

百岷疽生邊頃



百衲疽

百衲疽生腫色形引耳繞頸色紫紅痛熱不食氣逆嗽刺出膿
吉血出凶

註

此疽初發漫腫大小數塊環繞頸項其色紫紅痛熱不食
氣逆咳嗽其發引耳十五日可刺遲則毒攻咽喉刺見膿
者順見血者逆餘治法按癰疽腫瘍潰瘍門

結 喉 癰 圖



結喉癰主項前頰下結喉處