

御纂醫宗金鑑

御纂醫宗金鑑卷七十二

編輯外科心法要訣目錄

發無定處上

疔瘡

流注

癰瘤

多骨疽

結核

癰發

二 療疽

烏白癩

此症多由血虛風燥所致。初起時，皮膚上生有細小之瘡，如粟粒狀，或如針刺。其色或紅或白，或黑或黃。其癢甚，搔之則痛。若不早治，則瘡漸大，深及肌肉，甚至潰爛。此症之起，多因血虛，血虛則風燥，風燥則生瘡。故治此症，當以養血為主，兼以祛風。可用藥水塗之，或內服藥丸。其藥水可用生地、白芍、當歸、川芎、羌活、獨活、秦艽、桂枝、白芷、細辛、薄荷、甘草等藥，煎水而成。其藥丸可用生地、白芍、當歸、川芎、羌活、獨活、秦艽、桂枝、白芷、細辛、薄荷、甘草等藥，研末，用酒或水送下。此症之治，不可不慎。若治之得法，則瘡可愈。若治之不得法，則瘡可成癰。此症之起，多因血虛，血虛則風燥，風燥則生瘡。故治此症，當以養血為主，兼以祛風。可用藥水塗之，或內服藥丸。其藥水可用生地、白芍、當歸、川芎、羌活、獨活、秦艽、桂枝、白芷、細辛、薄荷、甘草等藥，煎水而成。其藥丸可用生地、白芍、當歸、川芎、羌活、獨活、秦艽、桂枝、白芷、細辛、薄荷、甘草等藥，研末，用酒或水送下。此症之治，不可不慎。若治之得法，則瘡可愈。若治之不得法，則瘡可成癰。

御纂醫宗金鑑卷七十二

編輯外科心法要訣

疔

黃鼓疔多產顙骨角

紫燕疔多產筋骨之間

火焰疔多產脣指

瘡

黑靨疔多產耳竅
牙縫胸腰

圖

白刃疔多產鼻孔

紅絲疔



發無定處

疔瘡

五藏皆可發疔瘡現於形體細考詳若論陰陽分
上下欲知經藏辨何方

疔名火焰發心經往往生於脣指中心作煩時神
恍惚痛兼麻癢炮黃紅

毒發肝經名紫燕此患多於筋骨見破流血水爛
串筋指青舌強神昏亂

黃鼓由於脾發毒多生口角與顴骨炮黃光潤紅

色纏麻癢硬殭兼嘔吐

毒發肺經名白刃白皰頂硬根突峻易腐易陷多損腮咳吐痰涎氣急甚

從來黑靨發腎經黑斑紫皰硬如釘爲毒極甚疼牽骨驚悸沈昏目露睛

以上五疔應五藏又有紅絲疔一樣初如小瘡漸發紅最忌紅絲攻心上

凡治疔證貴乎早三陰三陽更宜曉在下宜灸上宜鍼速醫卽愈緩難保

註

此數證俱名曰疔蓋疔者如丁釘之狀其形小其根深隨處可生由恣食厚味或中蛇蠱之毒或中疫死牛馬豬羊之毒或受四時不正疫氣致生是證夫疔瘡者乃火證也迅速之病有朝發夕死隨發隨死三五日不死一月半月亦必死此係藏府之乖逆性情之激變節候之寒溫肅殺且毒中有淺深也若一時失治立判存亡有名爲火焰疔者多生於脣口及手掌指節間初生一點紅黃小炮痛

癢麻木甚則寒熱交作煩燥舌強言語疎忽
此屬心經毒火而成也有名爲紫燕疔者多
生於手足腰肋筋骨之間初生便作紫炮次
日破流血水三日後串筋爛骨甚則目紅甲
青邪視神昏睡語驚惕此屬肝經毒火而成
也有名爲黃鼓疔者初生黃炮光亮明潤四
畔紅色纏繞多生口角腮顴眼胞上下及太
陽正面之處發時便作麻癢重則惡心嘔吐
肢體木痛寒熱交作煩渴乾噦此屬脾經毒

火而成也有名爲白刃疔者多生白皰頂硬
根突破流脂水癢痛兼作多生鼻孔兩手易
腐易陷重則腮損咽焦欬吐痰涎鼻掀氣急
此屬肺經毒火而成也有名爲黑靨疔者多
生耳竅牙縫胸腹腰腎偏僻之處初生黑斑
紫皰毒串皮膚漸攻肌肉頑硬如丁痛徹骨
髓重則手足青紫驚悸沈困輒陷孔深目睛
透露此屬腎經毒火而成也以上五疔本於
五藏而生又有紅絲疔發於手掌及骨節間

初起形似小瘡漸發紅絲上攻手膊令人寒熱往來甚則惡心嘔吐治遲者紅絲攻心常能壞人又有暗疔未發而腋下先堅腫無頭次腫陰囊睪丸突兀如筋頭令人寒熱拘急炊熱疼痛又有內疔先發寒熱腹痛數日間忽然腫起一塊如積者是也又有羊毛疔身發寒熱狀類傷寒但前心後心有紅點又如疹形視其斑點色紫黑者爲老色淡紅者爲嫩以上諸證初起俱宜服蟾酥丸汗之毒勢

不盡憎寒壯熱仍作者宜服五味消毒飲汗
之如發熱口渴便閉脈沈實者邪在裏也宜
服黃連解毒湯加生大黃一錢五分蔥頭五
個清之凡證輕者宜服化疔內消散若疔毒
將欲走黃急服疔毒復生湯已走黃者令人
心煩昏憤急用七星劍湯以救之若手足冷
六脈暴絕者係毒氣閉塞元氣不能宣通先
宜蟾酥丸隨服木香流氣飲行氣其脈自見
若疔毒誤灸煩躁譫語者乃逼毒內攻也宜

服解毒大青湯若潰後餘毒未盡五心煩熱者宜服人參清神湯鍼後出膿之時氣虛驚悸者宜服內托安神散若攻利太過以致發渴六脈虛大者宜服補中益氣湯若發汗之後汗不止熱不退瘡不疼便不利者此屬裏虛宜服八珍湯加黃耆麥冬治之凡疔潰後不宜補早雖見真虛只可平補忌用溫補之藥外治用藥鍼灸亦當循其次第書云疔瘡先刺血內毒宜汗瀉禁灸不禁鍼怕絲不怕

鐵初覺貴乎早治十證十全稍遲者十全五六失治者十壞八九初發項以上者三陽受毒必用鈹鍼刺入瘡心四五分挑斷疔根令出惡血隨用立馬回疔丹或蟾酥條插入孔內外以巴膏蓋之如項以下生者三陰受毒卽當艾灸以殺其勢灸之不痛亦須鍼刺出血插蟾酥條旁腫以離宮錠塗之如旁腫頑硬推之不動用鍼亂刺頑硬之處令多出惡血否則必致走黃挑法先用鍼幹將毒頂焦

皮刮開鍼入疔根堅硬如鍼者爲順若鍼刺入繇軟如瓜穰而不知痛者爲逆百無一生凡挑疔根先出紫黑血再挑刺至鮮血出以知痛爲止隨填拔疔散令滿以萬應膏蓋之過三四時撥去舊藥易以新藥若藥乾無水不痛者此挑法未斷疔根也再深挑之必以上藥知痛藥入水流爲率三四日後瘡頂乾燥以琥珀膏貼之令疔根托出換九一丹撒之黃連膏抹之外蓋白膏藥生肌歛口若初

起失治或房勞夢遺損氣以致毒氣內攻走黃不住者其瘡必塌陷急當隨走黃處按經找尋有一芒刺直豎卽是疔苗急當用鐵鍼刺出惡血卽在刺處用艾壯灸三壯以宣餘毒若身面漫腫神昏悶亂乾嘔心煩作渴遍身起炮抽搐者俱爲逆證惟紅絲疔於初起時急用磁鍼於紅絲盡處砭斷出血尋至初起瘡上挑破卽用蟾酥條插入萬應膏蓋之隨服黃連解毒湯再暗內二疔不用挑法先

以蟾酥丸含化令盡以冷水漱去毒涎再用
三九嚼葱白三寸裹藥黃酒送下蓋臥出汗
少時無汗再飲熱酒催之仍無汗係毒熱滯
結急用霹靂火法令汗出毒熱隨之而解次
用雙解貴金丸下之自效若暗內二疔初起
牙關緊急者用蟾酥丸三五粒葱頭煎湯研
化灌之俟稍甦治法如前至羊毛疔先將紫
黑斑點用衣鍼挑出如羊毛狀前後心共挑
數處用黑豆蕎麥研粉塗之卽時汗出而愈

一法用明雄黃末二錢青布包紮蘸熱燒酒
於前心擦之自外圈入內其毛卽奔至後心
再於後心擦之其羊毛俱拔出於布上埋之
忌茶水一日再諸疔部位形色亦有急緩生
於頭項胸背者最急生於手足骨節之間者
稍緩一疔之外別生一小瘡名曰應候四圍
赤腫而不散漫者名曰護場四旁多生小瘡
者名曰滿天星有此者緩無此者急疔證初
起至四五日間由白色而至青紫色疔頭潰