

痢疾丛谈

痢疾叢談目錄

閩縣王濤仙採編
二十二年暑期作

甲 導言

乙 名稱考釋

丙 病源與症候

丁 治法大綱

戊 痢疾類別

(詳述原因與治法)

一 休息痢
二 燒蟲痢

十三 膿血痢
十四 暑痢

廿五 酒客痢
廿六 下痢腹痛

三 噤口痢
四 奇恆痢

十五 積痢
十六 虛痢

廿七 下痢肛門腫痛
廿八 下痢脫肛

五 水穀痢
六 淫痢

十七 滑痢
十八 勞痢

廿九 下痢孔大
三十 下痢裏急後重

七 淫熱痢
八 熱痢

十九 氣痢
二十 風痢

卅一 下痢虛坐努責
卅二 下痢乾嘔

九 寒痢
十 赤痢

廿一 毒痢
廿二 疫痢

卅三 下痢呃噦
卅四 下痢色黑

十一 白痢
十二 赤白痢

廿三 五色痢
廿四 久痢

卅五 下痢發熱
卅六 下痢譫語

廿七下痢身腫
廿八痢後瘡

四九瀉痢
五十痢疾初起

九痼疾心煩自痢瘡黑
十年久痢飲食不減

廿九瘡後痢
四十痢風

已 痢疾醫案

選粹
十一咳嗽而兼瀉痢
十二瘡疾變痢

四一痢後風
四二下痢青色

一痢經一月神煩氣虛
二畏寒食減痢下肛門大痛

庚 痢疾驗方

四三痢後便血
四四痢前痢

三老人痢下一月有餘
四陳積不行變為休息痢

一治熱性痢疾方
二治熱痢便膿血方

四五產後痢
四六老年痢

五下痢黃赤壯熱如火
六痢下純紅後傷土飲七

三痢疾効方
四治噤口痢方

四七痢疾吐
四八痢疾

七胎前下痢產後未止
八由瀉成痢正虛而表邪未清

五噤口痢外治方
六熱痢腹痛七劇方

七 久痢膿血方
八 痢久勢執生毒方

三 枳壳湯
四 荊防敗毒散

癸
補遺

九 痢疾通用駱方
癰痢疾初起方

五 白朮氣湯
六 芍子湯

十二 治痢疾兼有表症者
十三 久痢不止

七 木香檳榔丸
八 枳實導滯丸

十三 赤痢駱方
十四 五色痢方

九 魚鱗丸
十 桃花湯

辛 痢疾要方

十一 溫脾湯

一 薑椒黃芩芍藥湯
二 白芷湯

壬 結論

醫家儀製

痢疾叢談

(甲) 導言

吾人生存天地間。端賴飲食以資養之。衣服以衛護之。故飲食衣服。兩大問題。務求飽煖適當而後已。若夫夏令。暑溼升騰之際。民多畏熱而喜涼。飲食生冷。袒衣露宿。祇求一時之舒適。而不知內之飲食生冷。

外之風寒暑濕。乘此羈留于体内。受之重者。當時即發為霍亂吐瀉。受之重者。淺者入秋復以新涼。偏于表者則成瘧。偏于裏者化為痢矣。

(乙) 名稱考釋

痢疾之名。考內經謂之腸辟。古今方書。因其閉滯不利。故又謂之滯下。後又稱之曰痢。近世則名曰痢。煩夥。

蓋隨其各症候，病因，夾症，以定名。故其治法亦各異焉。

(丙) 病源與症候

夫痢疾之因，由於消化機能受生冷之壓迫，暑溼之阻滯，腸胃蠕動力因之薄弱，上不能運化水穀精氣，下不能分泌水穀糟粕，上下交相淆混，應當排洩之。

廢物。留滯不出。經幾度變化。成一種白色或紅色之
毒質。由便道排洩而出。痢疾成矣。總之。其病源不外
手暑溼寒滯。塞窒凝滯。阻滯腸中為病也。若在西醫
解剖觀察。腸壁間患有爛斑。或腸癰瘍等。此說正與
內經所稱為腸癖者同義。
其症候初起。覺大便不爽。甚則澀澀有聲。赤白相雜。

或膿或血。或無糟粕。或糟粕相雜。或腸垢。或發熱。或不發熱。腹中作痛。裏急後重。及如圓則又不爽。至于夾症異同。則在其人感受而見焉。

(丁)

治法大綱

其治法當分為四步。第一步宜攻下。第二步宜清化。第三步固澀滑脫。第四步調理善後。

(一)攻下

痢症初起。未勢凶凶。邪盛氣足。可任攻擊。

如

木香

枳榔

大黃

枳實

神曲

青皮

黃連

黃芩

全瓜蒌

黑白丑

如挾表邪。可參用

荊芥

薄荷

防風

羌活等

(二)清化

既經攻下。其勢稍殺。血執轉盛。法從清化。

如黃連黃芩赤芍木香製附

白頭翁黃柏秦皮等

(三)固澀

症延日久。正氣虧弱。須以固澀之品。防其

消脫。如赤石脂禹餘糧炒白芍

阿膠訶子肉炒棗肉御米壳

痢疾

類

別

(四) 調補

邪勢既清。以調理為急務。四君子湯。人參

白朮。茯苓。甘草。加減。

(戊) 痢疾類別

(一) 休息痢

名稱 此證時作時止。經年不愈。故稱休息。

原因 多因收澀太早。致邪氣留于衝任。久則氣血

愈臨。清湯不升。

症狀

乍作乍止。久久不愈。或愈半月。或愈一星期。

旋復。昔作纏綿不已。

治療

法當雙補脾腎。助脾消積。

處方

用補中益氣

人參 當歸 甘草 白朮 升麻 陳皮

參芍

人參 白芍 炙甘草 附子 五味

四君子

人參 白朮 茯苓 甘草

等湯隨症施治。

結果

倘眼前方後不應反下血塊者此肝木不能

藏血宜三奇湯

生枳壳 黃芪 防風 木欬或蜜湯下

倍防風加

羌活 升麻 柴胡 葛根

禁忌

一切破氣利水之劑皆所禁忌

補遺

朱振聲先生沈休息痢助脾消積方

炒白朮 三錢

炒枳實 二錢

炒六曲 二錢

炙肉金 二錢

白茯苓 三錢

炒麦芽 三錢

新會皮 一錢

製半夏 二錢

春砂仁 五錢

(二) 蟯蟲病

名稱

因蟯蟲作祟為病。故名。

原因

此症多因胃弱腸虛。滯執蘊釀而生蟲。其形

極小。九蟲之一也。

症狀

其症腹大。青筋暴露。面目皮膚呈萎黃色。肛

門或痛或癢。蟲從穀道溢出。形細如線。以小

兒患者為多。

治療

宜逐逐驅蟲兼補脾胃。

處方

先以雄黃銳散

雄黃 苦參 黃連 桃仁 蘄芥 青相子

蕪荑丸

蕪荑 黃連 蜉蝣 蛇胆

烏梅丸

烏梅 細辛 肉桂 人參 附子 干姜 黃柏 黃連 芍藥

等殺蟲之劑甚者

加大黃蟲淨乃已。

繼以參苓白朮散

人參 茯苓 白朮 扁豆

陳皮 砂仁

山藥 苡仁

甘州 桔梗

蓮肉 大棗

四君子湯（見前）

調補腸胃兼