

濟陰綱目卷之四

吳興 金德生 聞風父輯著 白嶽 曹啟祥 長胤父訂正

西陵 汪 淇 懔 漪 子箋釋 天都 查 望 于周父 參閱

虛勞

補中益氣是
論婦虛勞與男子不同

治勞倦內傷
之劑乃初治
法凡久病勞
瘵骨蒸所宜

精血雖殊而
虛勞形症不
遠治亦不異
宜與雜症參
既殊其施治亦異故應別其方法而陳氏良方分勞瘵骨蒸勞血

看按而風勞者用血虛而風熱成勞也風勞冷勞因虛乘虛日久變成勞熱氣虛者氣不足熱勞者血不足至骨蒸勞瘵大都難治矣

風勞氣虛勞風勞冷勞熱勞客熱等門未免惑亂後人靡所適從今釐正如左醫者更參雜病虛勞傳尸勞二門而用之則無遺少之患矣

○論初病大法

保命集云治婦人虛勞局方中謂首尾六合如大聖散熟地黃丸是治無熱虛勞也中道藥牡丹煎丸空心食前人參荆芥散臨臥食後是治有熱虛也

戴氏曰有病後血虛者有本体血虛者其人往來寒熱或五心發熱言語無力面色痿黃頭目昏量變生諸疾芎歸湯加羊肉少許或十全大補湯四物湯養榮湯服之血虛而氣旺者宜抑氣湯即香附未

無熱虛勞乃

陽虛症其病

自上而下損

之脉也法宜

溫補惟東垣

元禮立齋先

主獨得其治

宜宗之氣虛

易補宜早為

妙不比有熱

虛勞之難療

理也

有熱無熱可

以古氣血虛

實矣立齋証

治方法可補

前論不足

○論無熱虛勞

大全云婦人冷勞屬血氣不足臟腑虛寒以致臍下冷痛手足時

寒月經失常飲食不消或時嘔吐惡寒發熱骨節痠疼肌膚羸瘦

面色痿黃也

薛氏曰前證有內外真寒有內外真熱有內真熱而外假寒有內

真寒而外假熱若若飲食難化大便不實腸鳴腹痛飲食畏寒手

足逆冷面黃嘔吐畏見風寒此內外真寒之證也宜用附子理中

湯以回陽八味地黃丸以壯火若飲食如常大便堅實胸腹痞脹

飲食喜冷手足煩熱面赤嘔吐不畏風寒此內外真熱之證也宜

用黃連解毒湯以消陽六味丸以壯水若飲食如常大便堅實胸

腹痞脹飲食喜寒手足逆冷面黃嘔吐畏見風寒此內外真熱而外

假寒也。亦用解毒湯六味丸。若食少思大便秘不實吞酸噯氣胸
腹痞滿手足逆冷面赤嘔吐畏見風寒此內真寒而外假熱也。亦
用附子理中湯與八味丸當求其屬而治之。經曰益火之源以消
陰翳。壯水之主以制陽光。使不知真水火之不足。泛以寒熱藥治
之。則舊疾未去新病復生矣。夫所謂屬者猶主也。謂心腎也。求其
屬也者言水火不足而求之於心腎也。火之源者陽氣之根。即心
是也。水之主者陰氣之根。即腎是也。非謂火為心源為肝木為腎
主為肺也。

以內外俱寒
而不用附子
理中何也

以內外真熱
不用二黃解
毒而以二味

一婦食少作嘔口吐痰涎面黃腹痛月經不調手足逆冷此內外
俱寒之證以六君加香附木香治之而瘳

一婦忽嘔吐酸水內熱作渴飲食不進惟喜冷水面色青赤投之

黃連者瀉火之源也其餘

加白朮等藥皆切恐苦寒

傷胃耳

有熱渴便秘

二症故雖近

冷亦是假寒

狀亦有可下

者后用六味

丸求其屬也

然須以脉有

力無力分虛

實

此得熱因寒用之法從之

以藥入口卽吐此內外真熱之證積十餘日以黃連一味煎湯飲

之徐加白朮茯苓仍加陳皮當歸炙甘草至月餘始進來飲稀粥

調理而瘳

一婦內熱作渴大便秘結畏惡風寒手足逆冷此內真熱而外假

寒先用黃連解毒湯後用六味丸而瘳

一婦初患痰喘熱渴醫以降火散氣治之肌日削而氣日索延至

甲辰木旺痰盛身熱口腐腹脹神昏絕食幾死此虛熱無火投以

壯火生土之劑隨服隨效越數歲夏初坐則頭墜不能起視臥則

背冷覺風透體煩熱暈眩咳嗽痰湧手足麻冷此內真寒外假熱

之證也遂以大補薑附之劑投之不三四服而大勢已平仍以前

藥加減而瘳

此案餘重出
然不刪去者
存之以備遺
亡也

明是上實下
虛

得熱因寒用

韓懋治其嫂年三十餘十八胎九殯八天會家難作驚憂過甚遂
昏昏不省人事口唇舌皆瘡或至封喉下部虛脫白帶如注如此
四十餘日或時少甦至欲自縊悲不能堪醫或投涼劑解其上則
下部疾愈甚或投熱劑及以湯藥熏蒸其下則熱暈欲絕此亡陽
證也急以鹽煮大附子九錢爲君制以薄荷防風佐以芎歸薑桂
之屬水煎入井冰冷與之未盡劑剝睡通宵覺卽能識人或曰此
何謂也曰方書有之假對假真對真爾士乃假熱故以假冷之藥
從之下乃真冷故以真熱之藥從之斯上下和而病解矣繼以女
金丹錯綜以三二方不但去其疾且調治元氣無何連生三子
以上論及治驗有無當於虛勞者而實治寒與熱變通之大法
爾不可不察也

論有熱虛勞

此屬陰虛刀自下而上至脉之病也宜以丹溪立齋古庵諸公之方參用然陰虛難治以血生於氣

先無形而后有形也且滋陰之劑有害脾胃脾傷則氣損氣損則血無以生氣盛則火有所助誠難調治惟審胃氣有無以決

治則此為良法耳

大全云婦人熱勞由心肺壅熱傷於氣血以致心神煩躁頰赤頭疼眼澁唇乾口舌生瘡神思昏倦四肢壯熱飲食無味肢體痠疼心忪盜汗肌膚日瘦或寒熱往來當審其所因調補氣血其病自愈矣。

壯火食氣是

言實火非同

少熱之火可

補

大僕所論乃

真木真火此

根有生中來

故當求屬以

薛氏曰熱勞乃壯火食氣虛火煎熬真陰之所致也王太僕云如大寒而甚熱之不熱是無火也熱來復去晝見夜伏夜發晝止是無火也當治其心如大熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止條忽往來時動時止是無水也當助其腎心盛則生熱腎甚則生寒

衰之

竊謂以下諸

症或肝或則

或肺而心腎

者甚少總以

分氣分血主

治却與求屬

之意不同

此下二節

分經虛實

定方確有見

解

腎虛則寒動於中心虛則熱於內竊謂前證若肝脾血虛用四

物參朮肝脾鬱怒小柴胡合四物湯脾胃氣虛補中益氣湯肝脾

血虛加味逍遙散肝經風熱加味小柴胡湯心經血虛天王補心

丹肺經氣虛人參補肺湯肝經血虛加味四物湯大抵午前熱屬

氣分用清心蓮子飲方見雜病午後熱屬血分用四物湯參朮牡

丹皮熱從左邊起肝火也實則四物湯龍膽山梔虛則四物參朮

黃耆熱從臍下起陰火也四物參朮黃檗知母酒拌炒黑五味子

麥門冬肉桂如不應急用加減八味丸不時而熱或無定處或從

脚心起此無根虛火也用加減八味丸及十全大補湯加麥門五

味主之

一婦經行不調飲食少思日脯熱甚此肝脾氣血俱虛用十全大

療有鬼鬼病
常察故療字
從之葛氏鈐
方有祭煉法
有以癸亥夜
半跪拜北斗
者皆於療法
也若果有療
鬼亦必是孽
鬼為崇藥石

補加山茱萸山藥牡丹皮麥門五味而瘡次年秋寒熱如瘡仍用
前藥而瘡一婦生育多胎經月不調兩足發熱年餘其身亦熱勞
則足瘦痛又年許唇腫裂痛又半年唇裂見血形体瘦倦飲食無
味月水不行此氣血俱衰之證彼誤用通經丸等藥復傷氣血遂
致不起

○論療骨蒸熱

準繩云五勞六極七傷諸證治已見雜病虛勞門茲不贅敘婦人
致此多因經行胎產或飲食起居七情重傷肝脾之所致又或失
於調攝或過於攻伐而成與男子治法稍有不同故彙集古禁方
專治婦人者於此若欲究其源流更當稽之彼籍
良方云骨蒸勞者由積熱附於骨而然也亦曰傳尸殭殭復連無

云何

此至所之病也。夫腎主骨，骨至于蒸，真陰竭矣。陽何以依而傳戶？無羣皆是孽。

肝熱生風，故病名血風。曰

勞者病久，血虛月候不行而發熱不止也。此是肝腎之陰不足，富從至脈主治。

事其名不一。此病皆由脾胃虧損所致。其形羸瘦，腹脹泄痢，肢體無力，傳於腎則盜汗不止，腰膝冷痛，夢鬼交侵，小便赤黃，傳於心則心神忪悸，喜怒不時，頰唇赤色，乍熱乍寒，傳於肺則胸滿短氣，咳嗽吐痰，皮膚甲錯，傳於肝則兩目昏暗，脇下妨痛，閉戶忿怒，五臟既病則難治療。

○論血風勞

大全云：婦人血風勞證，因氣血素虛，經候不調，或外傷風邪，內挾宿冷，致使陰陽不和，經絡痞澁，腹中堅痛，四肢痠疼，月水或斷或來，面色痿黃，羸瘦。又有因產後未滿百日，不謹將護，臟腑虛腫，百脈枯竭，遂致勞損，久不瘥，則變寒熱，休作有時，飲食減少，肌膚瘦瘠，遇經水當至，即頭目昏眊，胸背拘急，四肢疼痛，身體煩熱，足重。

面孚或經水不通故謂之血勞氣也。

薛氏曰東垣云喜怒不節起居不時有所勞傷皆損其氣氣衰則火旺火旺則乘其脾土脾主四肢故因熱懶言動作喘乏表熱自汗心煩不安當病之時宜安心靜坐存養其氣以甘寒瀉其熱氣以酸味收其散氣以甘溫補其中氣經言勞者溫之損者溫之要略云平人脉大為勞以黃耆建中湯治之。

一婦人勞則足跟熱痛此是三陰血虛用聖愈湯而痊後遍身瘙癢誤服風藥發熱抽搐肝脉洪數此肝家血虛火盛而生風以天竺黃膽星為丸用四物麥門五味苓連炙甘草山梔柴胡煎送而愈。

此所謂風勞也當從損脉治

此丁諸方於虛損初病者

一婦素清苦勤於女工因感風邪自用表散之劑反朝寒暮熱自

宜酌用之
夫血病治血
氣病治氣人
所易知而血
病補氣氣病
補血人未盡
知故四物復
有增損之法
蓋以地更滯
氣而損脾非
四肢怠惰乏
力少氣者所
宜故嘗損而
人參甘草所
以益脾也故
增若炮薑既
能溫中又能
引血以歸氣
此增損之妙
也

汗盜汗形氣虛甚其脉或浮洪或微細其面或青白或痿黃此邪
去而氣血愈虛也用十全大補湯三十餘劑漸瘳又用加味道遙
散兼治半載而痊

○治虛勞平補諸方

增損四物湯 治婦人氣血不足四肢怠惰乏力少氣兼治產後
下血過多榮衛虛損陰陽不和乍寒乍熱

當歸

川芎

白芍藥

人參

乾薑

炮

甘草

各
等分

右咬咀每服四錢水一盞煎至六分去滓熱服

六神湯 治脾氣不和榮衛不足怠惰困倦不嗜飲食服之補養

真氣進美飲食充澤肌膚

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

黃耆

地骨皮

各等分

按无肌澤者衛氣也氣不可執此方以黃芪益衛氣而又以地骨皮清衛熱則無壯火食氣之虞又以四物引衛氣以歸四臟而生血則又有少火生氣之用如是則榮衛足而因倦去矣其曰脾不和嗜食亦為氣不足之病氣足則愈也宜知之

右為龜末每服五錢水煎空心溫服

聖愈湯 治血虛心煩睡臥不寧或五心煩熱

黃耆

當歸

酒洗各一錢

人參

川芎

熟地黃

酒洗

生地黃

酒洗各五分

右水煎服

加減大建中湯

治婦人胎前產後一切虛損月水不調臍腹痛

痛往來寒熱自汗口乾煩渴

芍藥二兩

當歸

川芎

黃耆

肉桂

各二兩

白朮

甘草

炙各七錢五分

右為末每服二錢加薑棗水煎服食前

當歸建中湯

治婦人一切血氣不足虛損羸乏

聖愈湯重在

血虛心煩四

字然去白芍

而用生地者

所以涼心生

血也川芎之

用豈為火鬱

宜散歟不若

以麥門冬易

之

按前三方一

用參薑以溫

中一用黃芪

地骨以益衛

清熱以參芪

並用而中外

兩補均以四

物加減為血

分居多此名

建中又重在

氣也然桂之

當歸四兩

白芍藥兩

肉桂

去皮

甘草

炙各二兩

右咬咀每服三錢加生薑三片棗一枚水煎空心服

此方以歸芍為主而

無著水雖薑棗和中然在血分建業知配合之妙則知古人之心

雙和散 治一切大病之後虛勞乏力補血益氣

黃耆

熟地黃

當歸

川芎

白芍藥

炒各一錢

肉桂

甘草

炙各五分

右咬咀每服四錢加生薑三片棗二枚水煎服

補中益氣湯

治形神勞倦或飲食失節以致脾胃虛損清氣下

陷發熱頭痛四肢倦怠心煩肌瘦日漸羸弱

黃耆

人參

有嗽去之

白朮

錢名一

甘草

炙王

當歸

陳皮

各七分

升麻

柴胡

各三分

色可以通榮
血桂之氣味
可以通衛氣
故水經以之
通血脉又同
芪朮甘草薑
集等則建中
之功尤大矣
以其兼中上
也雙和者專
和榮衛而非
建中意也然
則大建中湯
以白朮易熟
地而分兩亦
殊要知古人
不執方不泥
法讀之令人
有言外之意

右作一服水煎食遠稍熱服

八珍湯

治脾胃虧損氣血俱傷蓋人之生以脾胃為主脾胃一

虛諸臟失所百病生焉

即四君子合四物湯加薑棗煎服

歸脾湯

治脾經失血少寐發熱盜汗或思慮傷脾不能攝血妄

行或健忘怔忡驚悸或心脾傷痛怠惰嗜臥飲食不思

方見血崩門 勞傷條

黃耆散

治勞氣食後身疼倦夜間盜汗此因失血榮衛損也

黃耆

防風

當歸

白芍藥

乾地黃

各七錢五分

甘草

炙半兩

右每服五錢薑三片棗二枚水煎食前溫服

大形勞者氣傷於外神勞者氣傷於內飲食不節者中氣受傷傷則水穀衰少後天氣病而上下二焦亦無所養故以甘溫之劑以益上中之氣而又妙在升藥以舉下陷之陽使藥衛和而氣自益也氣益則何病之有故東垣先生得方盡在于此其本方加

桔梗引子 治心不足解勞倦益血

黃耆

人參

麥門冬 去桔梗

甘草

炙各二兩 青皮半兩

右爲末每服三錢水一盞煎七分溫服

桔梗飲食氣不足也故以參耆甘草爲君加多

門者所以通心而清火桔梗載諸藥以益上焦之氣青皮利膈氣以制諸藥之壅所謂血生於氣

劫勞散

治心腎俱虛勞嗽二三聲無痰遇夜發熱熱過卽冷時

有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜臥恍惚神氣不寧睡

多異夢此藥能治微嗽有唾唾中有紅線名曰肺痿失治便成

羸劣之疾

白芍藥

六兩

黃耆

蜜炙四兩

人參

去芦

白茯苓

半夏

湯炮七次

甘草

炙

當歸

去蘆酒洗

五味子

阿膠

炒

熟地黃

洗淨焙乾

各三兩

右以咀每服三錢生薑七片棗三枚水煎溫服目三