

三集
二二

素問病機氣宜保命集卷之中

中風論第十

神醫劉守真撰

論曰。經云風者百病之始。善行而數變。行者動也。風本生於熱。以熱為本。以風為標。凡言風者。熱也。叔和云。熱則生風。冷生氣。是以熱則風動。宜以靜勝其躁。是養血也。治須少汗。亦宜少下。多汗則虛其衛。多下則損其榮。汗下各得其宜。然後宜治。在經雖有汗下之戒。而其中臟中腑之說。中腑者。宜汗之中臟者。宜下之。此雖合汗下。亦不可過也。仲景曰。汗多則亡陽。下多則亡陰。亡陽則損其氣。亡陰則損其形。經曰。氣血者人之神。不可不謹養也。初謂表裏不和。須汗下之。表裏已和。是宜治之。在經也。其中腑者。面加五色。有表證。脉浮而惡風。惡寒拘急。不仁。或中身之後。或中身之前。或中身之側。皆中腑也。其治多易。中臟者。唇吻不收。舌不轉。而失音。鼻不聞香臭。耳聾而眼瞽。大小便秘結。皆曰中臟也。其治多難。經曰。六腑不和。流結為癰。五臟不和。九竅不通。若外無留結。內無不通。必知在經也。初證既定。宜以大藥養之。當順時令。而調陰陽。安臟腑。而和榮衛。察病機。審氣宜。而少有不愈者。若風中腑者。先以加減續命湯。隨證發其表。若忽中臟者。則大便多秘。泄宜服三化湯。通其滯。表裏證已定。別無他變。故以大藥和治之。大抵中腑者。多着四肢中臟者。多滯九竅。雖中腑者。多兼中臟之症。至於舌強失音。久服大藥能自愈也。有中風濕者。夏月多有之。其證身重如山。不能轉側。宜服除濕去熱之藥。治之不可用鍼。可用灸。今具六經續命湯方。小續命湯。通治八風五痺痿厥等疾。以一歲為總。以六經為別。春夏加石膏。知母。黃芩。秋冬加桂附芍藥。又於六經別藥。隨證細分。加減自古名醫。不能越此。

凡覺中風。必先審六經之候。慎勿用大熱藥。為附之類。故陽劑剛勝。積燎原為消狂瘡腫之屬。則天癸竭而榮涸。是以中風有此誠。故經所謂邪風之至。疾如風雨。易曰。撓萬物者莫疾乎風。若感之淺。

者留於肌膚感之深者達於骨髓蓋禍患之機藏於細微非常人之豫見及其至也雖智者不能善其後是以聖人之教下皆謂之虛邪賊風避之有時故中風者俱有先見之證凡人如覺大姆指及次指麻木不仁或手足不用或肌肉蠕動者三年內必有大風之至經曰肌肉蠕動命曰微風宜先服八風散愈風湯天麻丸各一料為效故手大指次指手太陰陽明經風多著此經也先服祛風滌熱之劑辛涼之藥治內外之邪是以聖人治未病不治已病又曰善治者治皮毛是止於萌芽也故初成者獲愈固久者伐形是治未病之先也

中風之人如小便不利不可以藥利之既得自汗則津液外亡小便自少若利之使榮衛枯竭無以制火煩熱愈甚當候熱退汗止小便自行也兼此證乃陽明大忌利小便須當識此中風之人能食者凡中風病多能食蓋甲已化土脾盛故能食由是多食則脾氣愈盛上克制腎水水虧則病增據也病宜廣服藥不欲多食病能自愈中風多食者風木也盛則克脾脾受敵求助於食經曰實則夢與虛則夢取是也當瀉肝木治風安脾脾安則食少是其効也中風之人不宜用龍麝犀珠譬之提鈴巡於街使盜者伏而不出益使風邪入於骨髓如油入麵莫能出也此之類焉若痰潮不省昏憤不知人事宜用藥下其痰涎故風者百病之長庸可忽諸

小續命湯

麻黃去節

人參

黃芩各一兩

芍藥

防己

桂枝

川芎各一兩

防風二兩半

附子半兩

杏仁

甘草各一兩

右除附子杏仁外搗為麤末後入二味令勻每服五七錢水一盞半生薑五斤煎至一盞去滓稍熱服食前

凡中風不審六經之加減雖治之不能去其邪也內經云開則漸然寒閉則熱而悶知暴中風邪宜先以加減續命湯隨證治之

中風無汗惡寒麻黃續命主之

麻黃

防風

杏仁

依本方添加一倍宜鍼太陽至陰出血崑崙陽蹻

中風有汗惡風桂枝續命主之

桂枝

芍藥

杏仁

依本方加一倍宜鍼風府以上二證皆太陽經中風也

中風無汗身熱不惡寒白虎續命主之

石膏

知母

一料中各加二兩

甘草

依本方加一倍

中風有汗身熱不惡風葛根續命主之

葛根

桂枝

黃芩

依本方加倍

宜鍼陷谷刺厲兌鍼陷谷者去陽明之賊刺厲兌者瀉陽明經之寔也

以上二證陽明經中風也

中風無汗身涼附子續命主之

附子

加倍

乾薑

加二兩

甘草

加三兩

宜刺隱白穴去太陰之賊也此一證太陰經中風也

中風有汗無熱桂枝續命主之

桂枝

附子

甘草

依本方加倍

右六鍼太谿此證少陰經中風也

中風六證混淆繫之於少陽厥陰或肢節掌痛或麻木不知西羌活連翹續命主之

小續命

八兩

加羌活

四兩

連翹

六兩

考之續命混淆無六證之別今各分經治療又分經鍼刺恰厥陰之井大敦刺以通其經少陽之經

絕骨。多以引其熱。是鍼灸同象法。治之大體也。

中風外無六經之形證。內無便溺之阻格。知血弱不能養筋。故手足不能運動。舌強不能言語。宜養血而筋自榮。大秦羌湯主之。

秦羌 三兩

甘草 二兩

川芎 二兩

當歸 二兩

白芍藥 兩

細辛 半兩

川羌活

防風

黃芩 各兩

石膏 二兩

吳白芷 兩

白朮 一兩

生地黄 兩

熟乾地黄 兩

白茯苓 二兩

川獨活 二兩

右一十六味。剉。每服一兩。水煎。去滓。溫服。無時。如遇天陰。加生薑煎。如心下痞。每兩加楮寔一錢。同煎。

中風外有六經之形證。先以加減續命湯。隨證治之。內有便溺之阻格。復以三化湯主之。

厚朴

大黃

枳實

羌活 各等分

右剉如麻豆大。每服三兩。水三升。煎至一升半。終日服之。以微利為度。無時法。曰。四肢不舉。俗曰癱瘓。故經所謂太過。則令人四肢不舉。又曰。土太過。則敦阜。阜高求敦厚也。既厚而又高。則令除去。此真所謂膏粱之疾。非肝腎經虛。何以明之。經所謂三陽三陰發病。為偏枯痿。易四肢不舉。王注曰。三陰不足。則發偏枯。三陽有餘。則痿。易二為變。易常用。而痿弱無力也。其治則瀉。令氣弱陽衰。土平而愈。或三化湯。調胃承氣湯。選而用之。若脾虛則不用也。經所謂土不及。則卑陷。卑下也。陷坑也。故脾病。四肢不用。四肢皆稟氣於胃。而不能至。經必因於脾。乃不得稟受也。令脾不能與胃行其津液。四肢不得稟水穀氣。日以衰。脉道不利。筋骨肌肉皆無氣以生。故不用焉。其治可補十全散。加減四物。去邪留正。

愈風湯。中風證。內邪正除。外邪已盡。當服此藥。以行導諸經。久服大風悉去。縱有微邪。只從此藥。加減治之。然治病之法。不可失其通塞。或一氣之微汗。或一旬之通利。如此為常。治之法也。久則清濁

自分榮衛自和如此初覺風動服此不致倒仆。

羌活

甘草

防風

蔓荊子

川芎

細辛

枳殼

人參

麻黃

甘菊

薄荷

枸杞

當頭

知母

地骨皮

黃耆

獨活

杜仲

吳白芷

秦朮

柴胡

半夏

前胡

厚朴

熟地黃

防已各二兩

茯苓

黃芩各二兩

石膏四兩

芍藥三兩

蒼朮

生地黃各四兩

桂一兩

以上三三味通七十三兩

右判每服一兩。水二盞煎至一盞。去滓溫服。如遇天陰。加生薑煎。空心一服。臨卧再煎藥滓服。俱要食遠服。空心一服。嚥下二升丸。為之重劑。臨卧一服。嚥下四升丹。為之輕劑。動以安神。靜以清肺。假令一氣之微汗。用愈風湯三兩。麻黃一兩。均作四服。一服如生薑五斤。空心服。以粥投之。得微汗則佳。如一旬之通利。用愈風三兩。大黃一兩。亦均作四服。如前煎。臨卧服。得利則妙。常服之藥。不可失四時之轉。如望春大寒之後。加半夏二兩。通四兩。柴胡二兩。通四兩。人參二兩。通四兩。謂迎而奪少陽之氣也。望夏之月。半加石膏二兩。通六兩。黃芩二兩。通五兩。知母二兩。通四兩。謂迎而奪陽明之氣也。季夏之月。加防已二兩。通四兩。白朮二兩。茯苓二兩。通五兩。謂勝脾土之濕也。初秋大暑之後。加厚朴二兩。通四兩。藿香二兩。桂一兩。通二兩。謂迎而奪太陰之氣也。霜降後望冬。加附子一兩。桂一兩。通二兩。當歸二兩。通四兩。謂勝少陰之氣也。得春減冬。四時類此。雖立法於四時之加減。更宜臨病之際。審病之虛實。熱寒土地之宜。邪氣之多少。此藥具七情六慾。四氣無使五臟偏勝。及不動於榮衛。如風秘服之。則永不燥結。如火瀉服之。則能自調。初覺風氣。便能服此藥。及新方中。天麻丸各一料。相為表裏。治未病之勝藥也。及已病者。更宜常服。無問男子婦人。及小兒驚癇。瘡毒急慢驚風等病。服之神効。如解利四時傷風。隨四時加減法。又療脾腎虛弱。惡訖言難精神昏憤。及治內弱風濕內弱者。乃風熱火光體為芳風濕土餘。內弱之為病。或一臂

肢體偏枯。或肥而半身不隨。或恐而健忘。喜以多思。故思忘之道。皆情不足。衛是以心亂則百病生於心。靜則萬病悉去。故此藥能安心養神。調陰陽。無偏勝。及不動榮衛。

四白丹能消肺氣。養魄謂中風者。多昏。胃氣不清。利也。

白木半兩

白芷一兩

白茯苓半兩

白檀一錢半

人參半兩

知母二錢

縮砂仁半兩

羌活一錢半

薄荷三錢半

獨活二錢半

防風

川芎各五錢

細辛二錢

甘草五錢

甜竹葉三兩

香附子五錢

龍腦半錢

麝香一字

牛黃半錢

藿香一錢半

右併二十味。計八兩六錢。三字為細末。煉蜜為丸。每兩作十丸。臨卧嚼一丸。分五七次嚼之。上清肺氣。下強骨髓。

二丹丸

治健忘。養神定志。和血。內安心神。外華腠理。

丹參二兩半

丹砂五錢

遠志半兩

茯神一兩

人參五錢

菖蒲五錢

熟地黃二兩半

天門冬二兩半

麥門冬二兩半

甘草一兩

茯苓一兩

人參五錢

菖蒲五錢

熟地黃二兩半

右為細末。煉蜜為丸。如桐子。大每服五十丸。至一百丸。空心食前常服。安神定志。一藥清肺。一藥安神。故清中清者。歸肺以助天真。清中濁者。堅強骨髓。血中之清。榮養子神。血中之濁。華榮腠理。如素有痰。久病中風。津液湧溢。在胸中氣所不利。用獨聖散吐之。後用利氣瀉火之劑。本方在後。

瀉青丸

治中風自汗。昏冒發熱。不惡寒。不能安卧。此是風熱煩燥。

當歸

龍膽

川芎

梔子

羌活

大黃

防風各等分

天麻丸

係新方中

右為細末。煉蜜為丸。如彈子。大每服一丸。竹葉湯化下。

天麻六兩

牛膝六兩

杜仲七兩

草解六兩

玄參六兩

當歸十兩

生地黃十六兩

羌活十兩

附子一兩

右為細末練蜜為丸如桐子大常服五七十丸病大至百丸空心食前溫酒或白湯下平明服藥至日高饑則止服藥大忌雍塞失于通利故服藥半月稍覺壅微以七宣丸輕疎之使藥再為用也牛膝草解治筋骨杜仲使筋骨相着天麻羌活和風之勝藥當歸地黃養血能和榮衛玄參主用附子佐之行經也

獨聖散 治諸風隔疾諸癰痰涎津液湧溢雜病亦然

瓜蒂 一兩

右剉如麻豆大燥令黃色為細末每服量虛寔久新或三錢藥末茶一錢酸薑汁一盞調下若用吐法天氣清明陰晦無用如病卒暴者不拘于此法吐時辰午已前故內經曰平旦至日中天之陽陽中之陽也論四時之氣仲景曰大法春宜吐是天氣在上人氣亦在上一日之氣卯辰之寅候也故宜早不宜夜也先令病人隔夜不食服藥不吐再用熱薑水投之如吐風癰病者加全蝎半錢微炒知有虫者加狗油五七點雄黃末一錢甚者加芫花末半錢立吐其虫如濕腫滿者加赤小豆末一錢故此不可常用大要辨其虛寔寔則瓜蒂散虛則梔子豉湯滿加厚朴不可一概用之吐罷可服降火順氣安神定志之劑

治風癰病不能愈者從厚朴尤宜春秋加添外又于每一料中加

人參

葛蒲

茯苓

去本各一兩半

右依厚朴丸春秋加添法和劑服餌厚朴丸方在吐論中

防風通聖散

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

芒硝

連翹

薄荷

麻黃

石膏

桔梗

黃芩

白朮

山梔子

荊芥穗 各二兩 滑石 三兩

甘草 二兩

右為麝末。每服一兩。生薑同煎。溫服。日再服。勞汗當風。汗出為酸。鬱乃座勞。汗出于玄府。脂液所凝。去芒硝。倍加芍藥。當歸。發散玄府之風。當調其榮衛。俗云風刺。或生癰疹。或赤或白。倍加麻黃。鹽豉。葱白。出其汗。麻黃去節。亦去芒硝。鹹走血。而內凝。故不能發汗。罷依前方中。加四物湯。黃連解毒。三藥合而飲之。日二服。故內經曰。以苦發之。謂熱在肌。表連內也。小便淋瀝。去麻黃。加滑石。連翹。煎藥湯。調木香末二錢。七麻黃主表。不主于裏。故去之。腰脇痛。走疰疼痛者。加硝石。當歸甘草。一服各二錢。調車前子末。海金沙末。各二錢。內經曰。腰者腎之府。破傷風者。如在表。則卒以散之。在裏。則苦以下之。兼散之。汗下後。通利血氣。祛逐風邪。每一兩內。加荊芥穗。大黃各二錢。調全蝎末一錢。羌活末一錢。諸風潮搐。小兒急慢驚風。大便結秘。邪熱暴甚。腸胃乾燥。寢汗咬牙。上竅睡語。筋轉驚悸。肌肉蠕動。每一兩加大黃二錢。梔子二錢。調茯苓末二錢。如肌肉蠕動者。調羌活末一錢。故經曰。肌肉蠕動。命曰微風。風傷于肺。故嗽喘急。每一兩。加半夏。桔梗。紫苑各一錢。如打撲傷損。支節疼痛。腹中惡血不下。每一兩。加當歸。大黃各三錢。半調沒藥。乳香末。各二錢。解利四時傷寒。內外所傷。每一兩內。加益元散一兩。葱白十莖。鹽豉一合。生薑半兩。水一椀。同煎至五七沸。或煎一小椀。溫冷服。一半以筋探之。即吐罷。後服一半。稍熱。服汗出立解。如飲酒。中風身熱。頭痛如破者。加黃連。鬚二錢。葱白十莖。依法立愈。慎勿用桂枝。麻黃湯解之。頭旋。腦熱。鼻塞。濁涕。時下。每一兩。加薄荷。黃連各二錢。半。內經曰。膽後熱于腦。則辛頰鼻淵。鼻淵者。濁涕下不已也。王注曰。膽液下澄。則為濁涕。下不已。如水泉。故曰鼻淵也。此為足太陽脉。與陽明脉俱盛也。故氣逆者。調木香末一錢。

癰風論第十一

內經曰。癰風者。有榮氣熱。附其氣不清。故使鼻枉。壞而色敗。皮膚瘍潰。故先風寒客于脉。而不去。名曰癰風。又曰。脉風成為癰。俗云癰病也。故治法云。大風骨節重。鬚眉墮。名曰大風。刺肌肉病。故汗出。

百曰王注曰泄衛氣之怫熱刺骨髓汗出百曰泄榮氣之怫熱凡二百曰鬚眉生而止鍼怫熱屏退陰氣內復故多汗出鬚眉生也先樺皮散從少至多服五七日後灸承漿穴七壯灸瘡輕再灸瘡愈再灸後服二聖散泄熱祛血之風邪戒房室三年鍼灸藥止述類象形此治肺風之法也然非止肺藏有之俗云鼻屬肺而病發于肺端而言之不然如此者慨鼻准腫赤脹但為瘡之類乃謂血隨氣化既氣不施化則血聚矣然血既聚使肉腐爛而生虫也謂厥陰主生五虫厥陰為風木故木主生五虫蓋三焦相火熱甚而制金金衰故木來尅侮經曰侮勝也宜瀉火熱利氣之劑虫自不生也法云流水不腐戶樞不蠹此之類也故此疾血熱明矣當以藥緩疎泄之前局方內外升麻湯下徐氏內瀉青丸餘各隨經言之故病風者陽氣先受傷也

樺皮散

治肺藏風毒遍身瘡疥及癰疹癢痒接之成瘡又治面風刺及婦人粉刺

樺皮

四兩燒灰

荊芥穗二兩

甘草

半兩炙

杏仁二兩

去皮尖用水一升已後收放合煎

枳殼

四兩

去穢用炭火燒

去穢用炭火燒

去穢用炭火燒

去穢用炭火燒

去穢用炭火燒

去穢用炭火燒

去穢用炭火燒

去穢用炭火燒

去穢用炭火燒

去穢用炭火燒

去穢用炭火燒

去穢用炭火燒

去穢用炭火燒

去穢用炭火燒

去穢用炭火燒

去穢用炭火燒

右件除杏仁外餘藥為末將杏仁別研合細次用諸藥合勻磁合內放之服每三錢食後溫酒調下

二聖散

治大風癱疾

大黃

半兩

皂角刺

三錢燒灰

三錢燒灰

三錢燒灰

三錢燒灰

三錢燒灰

三錢燒灰

三錢燒灰

三錢燒灰

三錢燒灰

三錢燒灰

三錢燒灰

三錢燒灰

三錢燒灰

三錢燒灰

三錢燒灰

右將皂角刺一二斤燒灰研細煎大黃半兩湯調下二錢早服樺皮散中煎升麻湯下瀉青丸晚服二聖散此數等之藥皆為緩疎泄血中之風熱也

七聖丸

局方中

七宣丸

局方中

局方中

局方中

局方中

局方中

局方中

局方中

局方中

局方中

局方中

局方中

局方中

局方中

局方中

局方中

局方中

局方中治法曰雖柯子味苦澁而能止臟腑此利藥中用柯子合大黃枳實緩緩而推陳泄去邪氣若年老風秘澁者乃津液內亡也故不可用峻劑攻之內經曰年四十而氣自半也起居衰矣年五

十體重耳目不聰明矣。年六十陰痿氣大衰九竅不利下虛上寔涕淚出矣。故曰知之則強不知則老。舉世皆言年老之人無熱俱虛。豈不明年四十而陰氣自半。故陰虛陽盛明矣。是以陰盛其下陽盛其上。故上實下虛此理明矣。

破傷風論第十二

論曰夫風者百病之始也。清淨則腠理閉拒雖有大風苛毒而并無為害也。故破傷風者通于表裡分別陰陽同傷寒證治問閼往往有不知者。只知有發表者不知有攻裏者和解者。此汗下和三法也。亦同傷寒證有在表者有在裏者有半在表半在裏者。在裏宜下在表宜發汗在表裏之間宜和解然汗下亦不可過其法也。又不可妄意處治各通其臟脉免汗泄之非宜也。故破傷風者從外至內甚於內者則病也。因此卒暴傷損風襲之間傳播經絡至使寒熱更作身體反強口噤不開甚者邪氣入臟則分汗下之治諸瘡不瘥榮衛虛腠肉不生瘡眼不合者風邪亦能外入於瘡為破傷風之候。故諸瘡不瘥時舉世皆言着灸為上是謂熟瘡而不知火熱客毒遂諸經變不可勝數微則發熱甚則生風而搐或角弓反張口噤目斜皆因瘡鬱結於榮衛不得宣通而生亦有破傷不灸而病此者瘡着白痴瘡口閉塞氣難通泄故陽熱易為鬱結而熱甚則生風也。故表脉浮而無力太陽也脉長而有力者陽明也脉浮而弦小者少陽也太陽宜汗陽明宜下少陽宜和解。若明此三法而治不中病者未之有也。

羌活防風湯 治破傷風邪初傳在表

羌活

防風

川芎

藥本

當歸

芍藥

甘草 各二兩

地榆

華細辛 各二兩

右咬咀每服五錢水一盞半同煎至七分去滓熱服不拘時候量緊慢加減用之熱則加大黃二兩大便秘則加大黃一兩緩緩令過

白木防風湯 若服前表藥過有自汗者宜服此藥

白木一兩 防風二兩 黃耆一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時候臟腑和而有自汗可用此藥破傷風臟腑秘小便赤自汗不止者因用熱藥汗出不休故知無寒也宜速下之先用芎黃湯三二服後用大芎黃湯下之

芎黃湯

川芎一兩 黃芩六錢 甘草二錢

右咬咀每服五錢水一盞半同煎至七分去滓溫服不拘時候三服即止再用下藥

大芎黃湯

川芎一錢 羌活 黃芩 大黃各一兩

右咬咀依前煎服宜和為度

發表雄黃散

雄黃一錢 防風二錢 草烏一錢

右伴為細末每服一字溫酒調下裏和至愈可服裏和不可服

蜈蚣散

蜈蚣一對 鱉五錢 左蟠龍五錢 炒煙盡為度野錢真是也

右伴為細末每服一錢清酒調下治法依前用裏和至愈可服但有裏證不可服次當下之用前

蜈蚣散四錢巴豆霜半錢燒蝕為丸如菜豆大每服一丸漸加六七丸清酒調蜈蚣散少許送下

宣利為度內外風去可常服羌活湯緩緩而治不拘時候服之羌活湯者治半在表半在裏也

羌活湯

羌活

菊花

麻黃

川芎

石膏

防風

前胡

黃芩

細辛

甘草

枳殼

白茯苓

蔓荊子

已上各一兩

薄荷半兩

吳白芷半兩

右咬咀每服五錢水一盞半入生薑五片同煎至一盞去滓稍熱服不拘時候日進二服
防風湯 治破傷風同傷寒表證未傳入裏宜急服此藥

防風

羌活

獨活

川芎

各等分

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服三二服後宜調蜈蚣散大效
蜈蚣散

蜈蚣一對

鯽三錢

右為細末用防風湯調下如前藥解表不已覺轉入裏當服左龍丸漸漸看大便硬軟加巴豆霜服之

左龍丸

左蟠龍五錢

白殭蠶五錢

鯽半兩

雄黃一錢

右同為細末燒蝕為丸如桐子大每服十五丸溫酒下如裏證不已當于左龍丸末一半內入巴豆霜半錢燒蝕為丸如桐子大每服一丸同左龍丸一處合服每服藥中加一丸如此漸加服至利為度若利後更服後藥若瘡瘻不已亦宜服後藥羌活湯也

羌活湯

羌活

獨活

防風

地榆各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服如有熱加黃芩有涎加半夏若病日久氣血漸虛邪氣入胃全養血為度

養血當歸地黃散

當歸

細辛五錢

地黃

芍藥

川芎

藁本

防風

白芷各二兩

雄黃散

治表藥

右以咀依前煎服

天南星三錢

半夏五錢

天麻五錢

雄黃二錢半

右為細末

每服一錢溫酒調下如有涎于此藥中加大黃為下藥

地榆防風散

治破傷風中風半在表半在裡頭微汗身無汗不可發汗宜表裏治之

地榆

防風

地丁香

馬齒莧各等分

右件為細末每服三錢溫米飲調下

白朮湯

治破傷風大汗不止筋攣搐搦

白朮

葛根各兩

升麻

黃芩各半兩

芍藥二兩

甘草二錢半

右以咀每服一兩水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時候

江鰮丸

治破傷風驚而發搐臟腑秘澀知病在裏可用江鰮丸下之

江鰮

野鴿糞

雄黃一錢

白殭蠶半兩

蜈蚣一對

天麻一兩

右件為細末又將藥末作三分用二分燒蝕為丸如桐子大硃砂為衣後將一分入巴豆霜一錢

同和亦以燒蝕為丸如桐子大不用硃砂衣每服硃砂為衣丸二十九入巴豆霜一丸第二服二

丸加至利為度再服硃砂為衣藥病愈止

沒藥散

刀箭藥止血住痛

定粉一兩

風化灰一兩

枯白礬三錢乳香半錢

沒藥一兩

解利傷寒論第十三

麻黃湯

麻黃五錢節

桂枝三錢

甘二錢
草

杏仁

去皮尖砂
二十箇

右

政咀都作

服水煎去滓溫服

假令得肝脉其外證喜潔面青善怒其三部脉俱弦而浮惡寒裏和謂清便麻黃湯內加羌活防風各三錢謂肝主風是膽經受病大便秘或泄下赤水無數皆裏不和也假令得心脉其外證面赤口乾善笑其尺寸脉俱浮而洪惡寒裏和謂清便麻黃湯內加黃芩石膏各三錢謂主心熱是小腸受病也假令得脾脉其外證面黃善噫善思善味尺寸脉俱浮而緩裏和惡寒麻黃湯內加白木防已各五錢謂脾主濕是胃經受病也假令得肺脉其外證面白善嚏悲愁不樂欲哭其尺寸脉俱浮而溢裏和惡寒麻黃湯內加桂枝生薑各三錢謂肺主燥是大腸受病也假令得腎脉其外證面黑善恐顯其尺寸脉俱浮而裏和惡寒麻黃湯加附子生薑謂腎主寒是膀胱受病也已上各五證皆表之表謂在皮者急汗而發之也皆腑受病表之裏者下之當緩謂隨臟表證外顯尺寸脉俱浮而復有裏證謂發熱飲水便利赤泄或泄下赤水按之內實或痛麻黃湯去麻黃杏仁

與隨臟元加藥同煎作五服每下一證初一服加大黃半錢邪盡則止未盡第二服加大黃一錢邪未盡第三服加大黃一錢半如邪未盡又加之邪盡則止此謂先緩而後急是表之裏證下之當緩也麻黃附子細辛湯

麻黃半兩去

細辛半兩去

附子一錢一分半炮

右以咀都作一服水煎去滓溫服

假令得肝脉其內證滿閉淋瀝便難轉筋其尺寸脉俱沉而弦裏和惡寒肝經受病麻黃附子細辛內加羌活防風各三錢假令得心脉其內證煩心心痛掌中熱而噦其尺寸脉俱沉裏和惡寒心經受病加黃芩石膏各二錢假令得脾脉其內證腹脹滿食不消怠墮嗜卧其尺寸脉俱沉裏和惡寒脾經受病加白朮防己各三錢假令得肺脉其內證喘咳洒淅寒熱其尺寸脉俱沉裏和惡寒肺經受病加生薑桂枝各三錢假令得腎脉其內證泄如下重足脛寒而逆其尺寸脉俱沉裏和惡寒腎經受病更加附子生薑各三錢已主五證裏之表也宜漬形以為汗皆臟受病也裏之裏者下之當急謂隨臟內證以顯尺寸脉俱沉復有裏證者謂大小便秘澀或泄下赤水或泄無數不能飲食不惡風寒發熱引飲其脉俱沉或按之內寔而痛此謂裏寔宜速下之麻黃附子細辛內麻黃與隨臟元加藥內分作三服每下一證初一服加大黃三錢邪盡則止如邪未盡其一服加大黃二錢又未盡第三服加大黃一錢此先急而後緩謂裏之裏也當速下之也通解利傷寒不問何經之受皆能混然解之謂不犯各經之受病雖不解盡亦無壞證羌活湯

羌活二兩

防風一兩

川芎一兩

黃芩一兩

細辛二錢半

甘草炒一兩

黑地黃一兩

白朮二兩如用蒼朮加一兩

右以咀每服五七錢水二盞煎至一盞無時溫服清如覺發熱引飲加黃芩甘草各一兩更隨證如頭痛惡風于白朮湯一兩內加羌活散三錢都作一服

羌活散
羌活一兩半 川芎七錢 細辛根二錢半

如身熱依前加石膏湯四錢

石膏湯

石膏二兩 知母半兩 白芷七錢

如腹中痛者加芍藥散三錢

芍藥散

芍藥二兩 桂五錢

如往來寒熱而嘔加柴胡散二錢

柴胡散

柴胡根一兩 半夏五錢洗

如生薑煎如心下痞加枳實一錢如有裏證加大黃初一服一錢次二錢又三錢邪盡則止

論曰有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝然春夏汗孔疎雖有汗不當用桂枝宜用黃耆湯和解秋

冬汗孔閉雖無汗不當用麻黃宜用川芎湯湯和解春夏有汗脉乃微而弱惡風惡寒者乃太陽證秋

冬之脉也亦宜黃耆湯無汗亦宜川芎湯秋冬有汗脉盛而浮發熱身熱者乃陽明證春夏之脉也

亦宜黃耆湯無汗亦宜川芎湯大抵有汗者皆可用黃耆湯無汗者亦可用川芎湯

黃耆湯有汗則止也

黃耆

白朮

防風各等分