

傷寒論旁訓

下卷

張仲景傷寒論原文卷下

台山趙雄駒凱初輯註

弟饒駒健初參校

胡莞鑰

厥陰病脉症篇 五十五節

本風木標陰

中見少。陽熱化上心胞下。肝木風火相擊。火能消物。

木尅土。蛻聞食臭出。

標陰

厥陰之爲病消渴氣上撞心心中疼熱飢而不欲食食則吐蛻下

在。下有陰無陽。

之利不止

陽邪。

屬陽。

病脉相合。病脉相。反。

厥陰中風脉微浮爲欲愈不浮爲未愈。

即第一節之病

陰盡陽生

厥陰病欲解時從丑至卯上。

厥陰病渴欲飲水者。少少與之愈。
為厥陰。得少陽熱化。

諸四逆厥者。不可下之。虛家亦然。
手足冷之肘膝。陰陽。

傷寒。先厥後發熱而利者。必自止。見厥復利。
標陰。少陽熱化。陰得陽。如再見標陰。

傷寒。始發熱六日。厥反九日而利。凡厥利者。當不能食。今反能食。
陰勝。胃陽竭。

者。恐為除中。食以索餅。不發熱者。知胃氣尚在。必愈。恐暴熱來出。
除中氣。求救于食。如燈將滅。肝之。穀。食餅之後。

而復去也。後三日脉之。其熱續在者。期之。旦日夜半愈。所以然者。
少陰熱化。熱厥相等。

本發熱六日。厥反九日。復發熱三日。并前六日。亦為九日。與厥相。
熱九厥九之後。

應。故期之。旦日夜半愈。後三日脉之。而脉數。其熱不罷者。此為熱。
厥少。

氣有餘。熱逆肉裏必發癰膿也。

傷寒脉遲六七日而反與黃芩湯去其陽徹其熱脉遲為寒。今與黃芩湯

復除其熱。腹中應冷。當不能食。今反能食。此名除中。必死。

傷寒先厥後發熱下利必自止而反汗出咽中痛者其喉為痺發

熱無汗而利必自止。若不止必便膿血。便膿血者其喉不痺。

傷寒一二日至四五日而厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱

亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷爛赤

傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈厥終不過

五日以熱五日故知自愈。

○與厥相等無偏輕。重。

陰陽平。

陽不與陰相。順接為寒厥。陰不與陽相順接為熱厥。手之三陰陽相。接于手十指足之三陰陽相。接于足十指。

凡厥者陰陽氣不相順接便為厥厥者手足逆冷是也。

少陰本脉

太陽陽明

○不得熱。化。

少陰。

孤陽外脫

陰不能守。

少陰

傷寒脉微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此為藏厥非

將絕

厥陰

不躁。

厥陰。

為虵厥也虵厥者其人當吐虵今病者靜而復時煩此為藏寒虵

胸。

虵下膈。

飢不能食。

氣上撞心。中熱。

食則吐虵。

厥陰風木

上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者虵聞食臭出其人當自

生虫。

○暖臟安虵

溫臟之故。

吐虵虵厥者烏梅丸主之。又主久利方。

手足

少陰

少陽厥陰不交。

少陽二焦得氣。

傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便利色白者此

熱隨水去。

胃氣和。

少陰樞轉不出。

少陽樞轉不出。

陰絡內傷。

熱除也欲得食其病為愈若厥而嘔胸脇煩滿者其後必便血。

病者手足厥冷。言我不結胸。小腹滿。按之痛者。此冷結在膀胱關。寒邪內陷。主陽。主陽邪結于下。臍下。

三寸三。陰任脉之會元也。

傷寒發熱四日。厥反三日。復熱四日。厥少熱多。其病當愈。四日至。厥三熱八。陽進陰退。

七日熱不除者。其後必便膿血。熱傷陰血。

傷寒厥四日。熱反三日。復厥五日。其病為進。寒多熱少。陽氣退。故

為進也。

傷寒六七日。脉微手足厥冷。煩躁灸厥陰。厥不還者死。厥陰太陽。陽欲絕。虛陽不。下交于陰真。陰不上交于陽太衝二。穴陽不復。

傷寒發熱下利。厥逆躁不得臥者死。厥陰。利當止。孤陽外。出陰不能為守。陰盛格陽。

傷寒發熱。利當止。五臟氣。絕于內。六腑氣絕于外。傷寒發熱下利至甚厥不止者死。

傷寒六七日不利便發熱而利其人汗出不止者死。有陰無陽故也。

也。

傷寒五六日不結胸腹濡脉虛復厥者不可下。此為亡血下之死。

發熱而厥七日下利者為難治。

傷寒脉促手足厥逆者可灸之。

傷寒脉滑而厥者裏有熱也。白虎湯主之。

手足厥寒脉細欲絕者當歸四逆湯主之。若其人內有久寒者宜

溫中氣

當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之。

表陽虛

湯外越

陰內盛

陽虛不四達

生陽下洩

表陽外脫

回陽救脫

● 大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主

之。

陽亡于外 陽亡于內

● 大汗若大下利而厥冷者四逆湯主之。

回陽救脫

痰飲結胸

● 病人手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中心下滿而煩飢不能食者。

忽

痰

火能消物

痰閉塞

高者越之

吐痰

病在胸中當須吐之宜瓜蒂散。

停水亦厥

水停心下

去心下停水

● 傷寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯却治其厥不爾

水漬入胃必作利也。

傷寒論旁訓

●傷寒六七日大下後寸脉沉而遲手足厥逆下部脉不至咽喉不

由陰出陽

誤

氣口陽虛

陽虛不與陰相接。脈貫膈上注肺循喉嚨。大下亡津液遂

成。肺痿

生陽內陷

牛陽救陰

利唾膿血洩利不止者為難治麻黃升麻湯主之。

陽入陰

屬太陰

入厥陰

順流而下

●傷寒四五日腹中痛若轉氣下趨少腹者此欲自利也。

利。

為寒所格不能吐。下下寒而火上炎

去下寒并

●傷寒本自寒下醫復吐之寒格更逆吐下若食入口即吐乾薑黃

上炎之火

連黃芩人參湯主之。

標陰任。下

火氣在中

微陽復

●下利有微熱而渴脉弱者今自愈。

陽熱。得中見之化。

厥少和合

陰寒。

●下利脉數有微熱汗出今自愈設復緊為未解。

陽陷下不行於四。肢不充于。經脉厥。陰太衝。手足

生氣上脫

戴

●下利手足厥冷無脉者灸之不溫若脉不還反微喘者死少陰負

跌陽者為順也。

厥陰。陽

熱乘心包。陰

無血。陽盛陰虛迫血下。行

下利寸脉反浮數尺中自濇者必清膿血

藏氣虛寒

下利清穀不可攻表汗出必脹滿

表陽外。虛裏陰內。結

少陽初陽之氣下。陷

太過之脉

陰中有陽

下利脉沉弦者下重也脉大者為未止脉微弱數者為欲自止雖

陽生陰去之象

發熱不死

厥陰陰。寒在下

三陽之氣上循頭而陽。格于上。少陽熱。化

悶而頭重象。邪從

下利脉沉而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒汗出

汗出

下焦虛

而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

中見熱化

未愈

三焦心包之火

下利脉數而渴者今自愈設不差必清膿血以有熱故也

●下利後脉絕手足厥冷。時脉還手足溫者生。脉不還者死。
中土虛。土虛不能灌漑四。旁環轉一週。中土之氣將復。中土敗。

●傷寒下利日十餘行。脉反實者死。
胃氣藏氣俱虛。脉症相反。

●下利清穀裏寒外熱。汗出而厥者。通脉四逆湯主之。
藏寒。陰盛格陽。啓生陽之氣而通心主之脉。

●熱利下重者。白頭翁湯主之。
痢痢。去下鬱之熱。

●下利腹脹滿。身體疼痛者。先溫其裏。乃攻其表。溫裏宜四逆湯。攻
裏寒。表寒。

表宜桂枝湯。

●下利欲飲水者。以有熱故也。白頭翁湯主之。
少陽火。清火熱下降引陰液上升。

●下利譫語者。有燥屎也。宜小承氣湯。
與陽明燥氣相合。和胃氣。

● 下利後更煩按之心下濡者為虛煩也宜梔子豉湯。
水液。下竭火。熱上盛。更。上焦君火亢盛下。焦水陰不得上濟。交。通水火。

● 嘔家有癰膿者不可治嘔膿盡自愈。
熱傷包絡血化為膿。熱隨膿去。

● 嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之。
裏氣虛。氣機下洩。陰陽氣不順接。上下脫。

● 乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之。
有聲無。物。清。冷。脈挾胃上顛。去逆氣上冲。

● 嘔而發熱者小柴胡湯主之。
厥陰主闔不能樞轉。助少陽樞轉。

● 傷寒大吐大下之極虛復極汗出者以其人外氣怫鬱復與之水。
內外皆。虛。外來之邪。表。醫者不知。

以發其汗因得嘔所以然者胃中寒冷故也。

● 傷寒嘔而腹滿視其前後知何部不利利之則愈。
實熱。陰之部位。去其實熱。

霍亂病脉症篇十一節

風寒著熱飲食生冷之邪雜。揉。邪傷中土中土為萬物所歸。邪正。交爭顛倒錯亂。

問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利名曰霍亂

此以上係傷寒太陽。太陰。

問曰病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此屬何病答曰此名霍亂自

吐下又利止復更發熱也

傷寒其脉微澁者本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入

因吐利氣虛而虛。吐利。頭項強痛發熱。太陰少陰。太少。

陰必利本嘔下利者不可治也欲似大便而反失氣仍不利者屬

陽明也便必鞭十三日愈所以然者經盡故也

霍亂。胃陽已復。再過一經至陽明。又過。

下利後當便鞭鞭則能食者愈今反不能食到後經中頗能食復

一經卽十三日。十四日陽明主氣。
過一經能食過之一日當愈。不愈者。不屬陽明也。轉屬別經。

●惡寒脈微而復利利止亡血也。四逆加人參湯主之。
陽虛不支。傷中焦之汁。補陽。滋中焦之汁。

●霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之。寒多不用水。
吐利。傷寒。得陽明燥氣。助脾土以滋水精四布。不得陽明燥氣。

者理中丸主之。
溫中焦之寒。

●吐利止而身痛不休者當消息和解其外。宜桂枝湯小和之。
內邪解。外除邪尚在。飲食。和表。

●吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之。
津亡于上。津亡于外。表虛。血亡無以榮筋。陰陽氣不相順接。助陽以生陰液。

●既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者。
陽亡上下。陽亡表裏。裏寒甚。格陽于外。生陽不升。

四逆湯主之。
回陽。

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絕者通脉四逆加猪止。止。陰陽亡之症尚在。

生陽助中焦之津液。

膽汁湯主之。

吐利發汗脉平小煩者以新虛不勝穀氣故也。幸其脉。無事。悶。病後。任胃中水穀。

陰陽易差後勞復病脉症篇七節

傷寒陰陽易之爲病其人身體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣。婦人與病新差男子交得病。名陽易男子與病新差。女子交。得病名陰易形交。形傷氣交氣傷衝任督三脉。

俱行少腹前陰受。傷三經之邪。髓海不。足。

精不灌目。清不榮筋。

陰陽感召。

熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急者燒裊散主之。

愈。因勞而復病。

大病差後勞復者枳實梔子豉湯主之。胃氣新復運化不。及。推陳出新。

子大五六枚。

傷寒差已後更發熱者餘邪留在半表半裏小柴胡主之和表裏。脉浮者熱發在表以汗解之去表邪。脉沉實者熱發在裏。

以下解之。去裏邪

大病差後愈從腰以下有水氣者太陽之氣不能運行過遍于一身止。逆於下焦。腰以下屬陰。牡蠣澤瀉散主之。

大病差後喜睡久不了了者脾虛不。能攝津液。不行津液。胃上有寒當以圓藥溫之溫胃。宜理中丸。

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者氣血虛少不能充。飢。胃中有熱。去胃熱。竹葉石膏湯主之。

病人脉已解而日暮微煩不浮不沉實。陽明所旺。以病新差人強與穀減少。脾胃氣尚弱不能

消穀故令微煩損穀則愈。

痙濕喝病脉症篇此篇王叔和從金匱採入

傷寒所致。太陽瘧濕。陽三種。宜應別論。以爲與傷寒相似。故此見之。附錄傷寒之後

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘧。風傷標。陽陽邪。傷陽陰液不通。標本俱病。強。

太陽病發熱汗出不惡寒者名曰柔瘧。陰液通。表裏虛。無本寒。氣。軟。

太陽病發熱脉沉而細者名曰瘧。太陽表。病底少陰。

太陽病發汗太多因致瘧。血傷無以榮筋。

病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤曰脉赤獨頭面搖卒口。下未受風。風傷太陽經。風傷太。陽氣。陽氣上行頭面。脉起目內眦。露風象。風邪客。

噤背反張者瘧病也。會。脈。風邪入經輸。