

婦
女
科

兒
科

辨
症
奇
聞

婦人科

帶

血崩

受妊

安胎

鬼胎

血暈

產後諸病

血枯

調經

妊娠惡阻

小產

難產

胞衣不下

下乳

辨證奇聞卷九

辨證奇聞卷九

太醫院院使鏡湖氏錢

松著

婦人科

帶門

婦人有終年累月。下流白物。如涕如唾。不能禁止。自然而下者。甚則臭穢。所謂白帶也。夫帶病俱是濕病。而以帶名者。因婦人有帶脉。不能約束。故以帶名之。帶脉通於任督之脉。任督病。而帶脉亦病。帶脉者。止婦人有之。所以束胞胎之系也。婦人無帶脉。則胞胎不堅。難以繫胎。故帶脉弱而胎易墮。損傷帶脉。則胎必不牢。然而帶脉損傷。非獨跌

閃挫氣已也。行房而故於縱送。飲酒而出於顛狂。雖無疼痛之苦。而其中暗耗。則白物自下。故帶病尼師寡女出嫁之女多。而處子在閨。未破瓜之女少也。況加之脾氣之虛。肝氣之鬱。濕氣之侵。火氣之逼。安得不成爲帶下之症哉。白帶者。濕盛而火衰。肝鬱脾虛。則脾土受傷。濕土之氣下陷。是以脾精不守。不能化爲榮血。而變成白滑之物。由陰門而直下。欲自禁止而不可得也。治之法。宜大補其脾胃之氣。而少佐之舒鬱之味。使風木不閉塞於地中。則地氣自升騰於天上。脾氣健而濕氣自消。方用完帶湯。白朮一兩。蒼朮三錢。甘草一錢。車前子三錢。山藥一兩。陳皮五

分人參二錢。白芍五錢。柴胡六分。荆芥五分。半夏一錢。水。

煎服二劑。輕四劑止。六劑全愈。此方脾肝三經同治之法。寓補於升之中。寄消於散之內。開提肝木之氣。則肝血不燥。何致下剋於脾土。補益脾土之元。脾經不濕。何難分消。夫水氣。至於補脾而兼補胃者。脾胃表裡也。脾非胃氣之強。則脾之弱不能旺。然則補胃正所以補脾耳。

婦人有帶下而色紅者。似血非血。所謂赤帶也。赤帶亦濕病。濕亦見黃白之色。乃不現黃白而現赤者。火熱之故也。火之色赤。故帶下亦現赤色耳。惟是帶脉系於腰臍之間。近於至陰之地。不宜有火。豈其路通命門而腎中之火出。

而燒之耶。不知帶脉不通。腎而通肝。婦人憂思以傷脾。又加鬱怒以傷肝。於是肝火內熾。下剋脾土。而脾土不能運化。濕熱之氣。蘊結於帶脉之間。而肝火焚燒。肝血不藏。亦滲乎帶脉之內。帶脉又因脾氣之傷。約束無力。而濕熱之氣。隨氣下陷。同血而俱下。觀其形象似血。非血。其實血與濕俱不能兩分之也。世人以赤帶屬之心火者。悞耳。治之法。清其肝中之火。而扶其脾氣。則赤淋庶幾可愈乎。方用清肝止淋湯。芍藥一兩 當歸一兩 阿膠三錢 生地五錢丹皮三錢 黃栢一錢 牛膝二錢 黑豆一兩 香附一錢 紅棗十枚 水煎服。一劑少止。二劑又少止。四劑全止。十劑不再。

發此方但去補肝之血全不去利脾之濕者以赤帶之病火重而濕輕也。夫火之所旺者由於血之衰也。補血足以制火矣。且水與血合而成赤帶。竟不能辨其是濕而非濕。則濕盡化爲血矣。所以治血可也。又何必利濕哉。此方之妙在純不治濕而少加之清火之味。故奏功獨奇。倘一利其濕反引火而下行。轉難遽效耳。或問先生前言助其脾土。今但補肝木之血。絕不補脾土之氣何也。不知用芍藥以平肝。則肝氣得舒。自不去剋脾土。是補肝正所以扶脾。又何必加人參白朮之多事哉。

婦人有帶下而色黑者。甚則下如墨汁。其氣最腥。人以下

寒之極也。誰知是火熱之極乎。夫火色宜紅。何成黑色。不知火極似水。乃假象也。其症必然腹痛。小便之時。必然如刀之觸。陰門之口。必然發腫。面色必然發紅。久則黃瘦。飲食必然兼人。口必大渴。飲之凉水。少覺寬快。此命門之火。與膀胱三焦之火合。而胃火又旺。四火同煎。安得不熬乾。而成炭色耶。此等之症。不致發狂者。以腎水與肺金之氣。涓涓不絕。足以潤心而濟胃耳。所以飲水下胃。但成帶下之症。火結於下。而不炎於上也。治之法。惟以瀉火爲主。火退而濕熱自舒也。方用利火湯。

大黃三錢 白朮五錢 茯苓三錢

蒼三錢 車前子三錢

王不留行三錢

劉寄奴三錢 黃連三錢

錢

炒梔子三錢

石膏五錢

知母二錢

水煎服。一劑而小便

大利。二劑而黑帶變爲白帶矣。三劑而白帶亦少。減去一半。再服三劑全愈。此方未免過於迅利。殊不知火盛之時。用不得依違之法。救焚而少爲迂緩。則火勢延燒。不盡不止矣。今用黃連石膏知母梔子一派寒涼瀉火之味。入於大黃之中。則迅速掃除。而又得王不留行與寄奴之味。利濕甚急。俱無停住之機。佐白朮車前茯苓。速成旣濟之功也。

婦人有帶下而色黃者。宛如黃茶濃汁。其氣帶腥。人以爲脾經之濕熱也。誰知是任脉之濕熱乎。夫任脉本不能容

水如何濕氣入於中而化爲黃帶乎。不知帶脉橫生通於任脉。任脉直上走於唇齒唇齒之間。原有不斷之泉下灌於任脉。使任脉無熱。則口中津液盡化爲精。以入於腎中矣。惟有熱以存於下焦之間。則津不化精而化濕。夫水色白而火色紅。今濕與熱合。欲變紅而不能。欲返白而不得。煎熬成汁。因變爲黃色矣。黃乃土之色也。真水真火合而成丹。邪水邪火合而帶黃。世人以黃帶爲脾之濕熱而單去治脾。此黃帶之所以難痊也。方用退黃湯治之。山藥一兩。芡實一兩。黃柏二錢。車前子一錢。白朮十枚。水煎服。連用四劑。無不全愈。此方不特治黃帶之方也。凡有白帶。

者俱可治之。而治黃帶尤奏奇功。蓋山藥芡實專補任脉之虛。而又能利水。加之白朮引入任脉之中。更爲便捷。所以奏功甚速也。至所用黃柏卽解脉之熱矣。婦人有帶下而色青者。甚則色綠如綠豆汁。稠黏不斷。其氣亦腥。人以爲小腸之濕熱也。誰知是肝經之濕熱乎。夫肝屬木而木之色屬青。帶下流如綠豆之汁。明是肝木之病。但肝最喜水。濕亦水也。似濕非肝之所惡。何以竟成青帶之症。不知水雖爲肝之所喜。而熱實爲肝之所惡。而所惡者合之所喜。必有違其性者矣。肝之性旣違。則肝之氣必逆。氣欲上升。而濕欲下降。兩相牽掣。必停住於中焦之

聞於是走於帶脉。從陰門而出。其色青綠者。正以其乘肝木之氣也。逆輕者熱必輕而色青。逆重者熱必重而色綠。似乎治青者易。而治綠者難。然而無難也。解其肝中之火。而利其膀胱之水。則帶病自愈矣。方用逍遙散加減治之。

扶苓五錢 白朮

五錢

甘草

五分

陳皮

一錢

柴胡

一錢

白

芍五錢

茵陳三錢

炒梔子

三錢

水煎服

二劑

而色淡

四劑

而青綠之帶絕。不必多劑也。夫逍遙散解鬱之方也。何以取之治青帶如是之神耶。蓋肝經濕熱留之者。因肝氣之逆也。逍遙散最解肝之逆氣。逆氣平。則濕熱難留。況益之茵陳之利濕。梔子之清熱。肝氣清涼。而青綠之帶。又何自

來乎。此方之所以奇而可用也。倘僅治青帶。惟以利濕清熱爲事。置肝氣於不問。亦安有止帶之日哉。

血枯門

婦人有年。未至七七之期。而經水先斷者。人以爲血枯。經閉也。誰知是心肝脾之氣鬱乎。凡人血枯。而安能久延於世。世醫見經水之不行。謂其血枯耳。其實非血之枯。乃血之閉也。且經水非血也。乃天一之水。出之腎經之中。至陰之精。而有至陽之氣。故其色紅赤。似血而非血也。世人以經水爲血。此千古之悞。倘果是血。何不名之曰血水。而古昔至聖。創呼經水者。以水出於腎經。故以經名之。無如世

人沿襲不深思其故而皆視之爲血也。然則經水早斷。似乎腎水之衰涸。吾以爲心脾氣之鬱者。又是何故。蓋腎水之生。不由於三經。而腎水之化。實關於三經也。腎非肝氣之相通。則腎氣不能開。腎非心氣之相交。則腎氣不能上。腎非脾氣之相養。則腎氣不能成。倘三經有一經之鬱。則氣不入於腎之中。而腎之氣卽閉塞而不宣。況三經齊鬱。而腎水真足。尙有格格難出之狀。而腎氣原虛。又何以構精盈滿。化經水而外泄耶。此經之所以閉。而有似乎血枯耳。治之法。必須散三經之鬱。而大補其腎。補腎之中。仍補其三經之氣。則精溢而經自通也。方用溢經湯。熟地一

兩白朮一兩山藥五錢生棗仁二錢白芍三錢當歸五錢

丹皮二錢沙參三錢柴胡一錢杜仲一錢人參二錢水煎

服。連服八劑而經通矣。服一月人健。不再經閉。兼易受孕。此方心肝脾腎四經同治之藥。妙在補以通之。散以開之也。倘徒補則鬱不開而生火。倘徒散則氣益衰而耗精。設或用攻堅之味。最熱之品。不特無益。而反害之也。

人有在室未嫁。月經不來。腹大如娠。面色乍赤乍白。脉乍大乍小。人以爲血枯經閉也。誰知是靈鬼憑身乎。大凡人心正則邪不能侵。人心邪則邪自來犯。或精神恍惚。而夢裡求親。或眼目昏花。而日中相狎。或假託戚屬。而暗處貪歡。

或明言仙人而靜地取樂其先未嘗不驚託爲奇遇而不肯告人其後則羞赧爲淫褻而不敢告人矣年深月久人之精血僅足以供腹中之邪邪日旺而正日衰勢必至經閉血枯而後已欲導其經邪據其腹而經難通欲生其血邪飲其精而血難長醫以爲胎而非胎醫以爲瘕而非瘕往往因循等待成爲癆瘵之症至死不悟不重可悲乎治之法似宜補正以祛邪然而邪之不去補正亦無益也必先去其邪而補正之爲得耳方用蕩邪丹

雷丸三錢桃

仁三十粒

大黃三錢

當歸五錢

丹皮五錢

生甘草二錢水

煎服一劑必下穢物半桶再用調正湯治之

白朮五錢

蒼朮五錢 茯苓二錢 陳皮一錢 甘草一錢 薏仁五錢 貝母一錢 水煎服。連用四劑。脾胃之氣轉而經血漸行矣。前方蕩邪後方補正。實有次第也。或疑身懷鬼胎。必傷其血。所以血枯而後經閉也。今既墮其胎。乃不補血而反補胃氣者何故。蓋鬼氣中人。其正氣之虛可知。且血不能驟生。補氣自易生血。二朮善補陽氣。陽旺而陰氣難犯。尤善後之妙法也。倘服補血之藥。則陰以招陰。吾恐鬼胎雖下。而陰氣未必不再種矣。故不若補其陽氣。使鬼崇之難侵。而生血愈速耳。

血崩門