




丹溪朱氏脈因證治目錄

下卷

二十八宿食留飲

附痰飲

二十九噯氣吞酸嘈雜

附噯氣

三十積聚

附痰塊

三十一消渴

三十二痞

三十三腫脹

三十四嘔吐噦

三十五噎膈

三十六瘡瘍

三十七癰疽

附癰瘤

三十八乳癰

三十九瘰

四十發廔

四十一丹疹

四十二金瘡

四十三傾僕

四十四藥中傷

四十五癲狂

附癰

四十六驚悸

四十七疝癰

四十八腳氣

四十九蟲

附狐惑

五十喉痺

五十一口

五十二舌

五十三目

五十四耳

五十五鼻

五十六齒

五十七結燥

五十八痔痛

五十九婦人產胎

六十滯下

六十一經候

六十二崩漏

六十三小兒證

六十四雜證

六十五雜治

六十六五臟證

六十七七情證

六十八雜脈

六十九察視

七十汗

丹溪朱氏脈證治卷下

二十八宿食留飲 附痰飲

脈寸口脈浮大按之反澁尺中亦微而澁故有食痰寸口脈緊如轉索左右無常者有宿食 脈滑而數者實也有宿食當下之 脈浮而滑者宿食下利不欲食者宿食 脈沈病若傷寒者宿食留飲宜下之 脈短疾而滑者酒病 脈浮細而滑者傷飲 由飲食自倍腸胃乃傷腹加之則胃化遲難故宿食留飲飲水也無形之氣也因而大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺病則為咳滿水泄重而為蓄積食者物也有形之為血也因而食飽筋脈橫解腸澀為重或嘔或吐或下利

證治千金云胃中有澀食冷物則痛不能食有熱物則欲食大腹有宿食即寒慄發熱如瘕狀小腹有宿食當暮發熱明旦復止

二因云有飲在中脘則嘈有宿食則吞酸

李論戊己大衰不能制物食則不消傷其太陰填塞悶亂凡欲吐甚則心胃大痛犯其血也治宜分寒熱輕重如初得上部有脈下部無脈其人當吐不吐即死宜瓜蒂散輕則內消宿砂炒曲等是也重則除下承氣湯是也寒則溫之半夏乾薑三稜莪朮是也熱則寒之大黃黃連枳實麥芽是也飲則下行或大飲而氣逆或寒冷而傷肺病則



喘咳痰涎水腫輕則宜取汗利小便使上下分消其濕解醒湯五苓散半夏丸散之類是也重則為蓄積為滿者三花神祐是也

張論飲食不消分貧富而治之富者乃膏粱太過以致中脘停留脹閉痞膈醉心宜未香道飲丸主之貧者乃動作勞飲食粗酒食傷之以致身腹滿悶時吐酸水宜進食丸主之又重者病症同太陰傷寒止脉沉可與導飲丸治之

又論留飲蓄水而已雖有四有五之說止一証也夫鬱憤而不伸則肝氣乘脾之氣而不流亦為留飲肝主慮久不決則氣不行脾主思久則脾結亦為留飲因飲水脾胃失衰不能布散亦為留飲飲酒過多胞經不及滲洩亦為留飲渴飲冷水乘快過多逸而不動亦為留飲夫水者陰物也但積水則生溼停酒則滿燥久而成痰左脇同肥氣右脇同息贗上入肺則嗽下入大腸則瀉入腎則涌在太陽為支飲皆內氣逆得之故濕在上者目黃面浮在下者股膝腫滿在中者支飲痞膈痰逆在陽不去久而滯氣在陰不去久而成形宜治以導水禹功調以五苓葶藶椒目逐水為全矣

有傷西瓜冷水羊乳寒濕之物宜 白朮二錢 川烏分 防風一錢 丁香一枚 甘草錢

傷羊肉麵濕熱之物宜 白朮 黃芩 黃連各七錢 大黃二錢 甘草錢 如心下痞

枳實 腹痛 白芍藥錢 腹脹 厚樸 胸中不利 枳殼 胸中寒 陳皮

渴者 白茯苓 腹中窄 蒼朮 體肢沉重 蒼朮 大抵傷冷物以巴豆為君  
傷熱物以大黃為君

檳榔丸 治傷之輕者飲食不化心腹鼓脹出劉 檳榔 二錢 陳皮 八錢 牽牛頭末 四錢

酢糊丸 梧子大薑湯下二十丸

雄黃丸 治傷之重脇肋虛脹者 雄黃 一兩 巴豆 五錢生用去油 九服 法同心痛

瓜蒂散 主吐心胸卒痛悶亂急以治之 瓜蒂 赤小豆 各三錢 細末之每服 錢一 溫酒下

枳實丸 治傷食 枳實 半兩 白朮 一兩 曲丸 木香 檳榔 青皮 此三味氣滯加

之大黃 黃芩 連 三味濕熱加之 蘿蔔子 連 澤瀉 伏濕痞悶加之

梔 病後食傷加之 半夏 豆粉 濕麴油膩加之 草豆蔻 檉莪 傷冷硬加

之 乾薑 傷水加之 宿砂 丁香 心胃痛加之 參 傷胃加之

解醒湯 治傷酒 白豆蔻 砂仁 生薑 葛花 各半兩 茯苓 壹 陳皮 壹

參 朮 各一兩半 青皮 三錢 曲 炒 澤瀉 各二錢五分 木香 壹 右為末白湯送下

秘方 治胃中有物惡食 二陳湯加 朮 山查 川芎 蒼朮 曲 炒

神祐丸 治留飲懸飲脉弦 又治脉伏其人欲自利難利心下續堅滿此為留飲欲去

故也

茯苓桂朮湯 治心下有痰飲胸脇支滿目眩 茯苓 桂 朮 甘草

大青龍湯 治溢飲體痛當發其汗 麻黃<sub>七錢</sub> 桂 朮 甘草 石膏<sub>雞子大</sub> 杏仁

半夏<sub>濕加</sub>

澤瀉湯 治心下有支飲其人苦目眩支飲不得息加葶藶

栝黃湯 治支飲胸滿 大黃 厚樸<sub>各等分</sub>

二陳湯 小半夏湯 治嘔家本渴今反不渴心下有支飲故也治先渴卻嘔水停心下

此屬飲加茯苓

五苓散 治瘦人臍下有悸者吐涎沫而顛眩水也亦治停痰宿水

破飲丸 治五飲結為癰瘕支飲胸滿吐逆心內隱痛大能散氣 華撥 胡椒 丁香

宿砂 青皮 烏梅 木香 蝎稍 巴豆<sub>去油</sub> 以青皮同巴豆浸漿水一宿漉出

同炒青皮焦去豆將浸水淹烏梅肉炊一熟飯研細為膏薑湯送下五七丸

控涎丹 治急胸背手足頸項腰膝隱痛不忍連筋骨牽釣痛坐卧不安時走易 甘遂

大戟<sub>紅牙</sub> 白芥子<sub>真</sub> 右粉丸梧子大白湯送下

痰飲証狀或咳或喘或嘔或泄眩暈嘈煩忪悸憤懣寒熱疼痛腫滿癰癧癰閉痞膈如

風如癲懸飲者水飲在脇下咳唾引痛溢飲者飲水流於四肢當汗不汗身體疼

痛重 支飲者嘔逆倚息短氣不得卧其形如腫 痰飲者其人素盛今瘦腸間漉漉有聲 留飲者背寒如手大或短氣而渴四肢歷節疼痛脇下痛引缺盆 伏飲者膈滿咳喘嘔吐發則寒熱腰背痛目淚惡寒振振然 懸飲當下 溢飲當汗 支飲隨證汗下之痰飲宜溫之從小便去之

二十九 噯氣吞酸嘈雜

附榮氣

因胃中有火有痰 三因論酢咽夫中脘有飲則嘈有宿食則酸食後噯酸吞酸者皆宿食證俗名噯酸是也 治方食鬱有痰吞酸 星 半夏五錢 黃芩一兩 陳皮

燥飲丸 治痰飲心痛 乾螺殼牆上者 蒼朮 曲為丸

曲朮丸 治吞酸中脘有飲則嘈宿食則酸 宿砂 陳皮 蒼朮 曲炒曲丸薑湯送下

又方 治酸皆濕熱鬱 黃連薑汁炒 蒼朮 茯苓 湯浸餅丸 吐清水 蒼朮陳壁土炒

茯苓一錢 滑石煨 朮一錢五分 陳皮五分 水煎

論榮氣 證夫榮飪之邪從口入者宿食也其病煩痛畏風憎寒心腹脹滿下利不欲食吞酸噯宿腐氣或腹脹泄瀉及四肢浮腫若胃實熱食反溜滯其脈滑而數宜下之 愈 若脾虛其脈浮大按之反濇尺中亦微濇宜溫消之

木香丸 木香 硃砂 蓬朮 胡椒 半夏 乾漆炒令烟盡各五錢 桂心 宿砂 青皮錢三



附子

炮去皮

三稜

醋炙

乾薑

二兩

右末蜜丸梧子大每服五十九薑湯下

感應丸

肉豆蔻

川芎

百草霜

各二兩

木香

二兩

華澄茄

丁香

各二兩

燭

四兩

杏仁

百粒去皮

三稜

一兩

右除巴豆外為末以下別研巴豆杏仁和勻先將油煎燭溶化傾出藥末肉和成劑入臼內杵十餘下丸菜豆大每服三五丸白湯下 又外有酢咽榮氣思膈皆同

三十積聚

附痰塊

脈來細而附骨乃積 寸口積在胸關上積在臍傍尺中積在氣衝左積左右積右脈而

出積在中央浮而毛按之辟易脇下氣逆背相引痛名肺積 沈而芤上下無常處胸

滿悸腹中熱名心積 弦而細兩脇下痛邪走心下足腫寒名肝積 沈而急苦脊

與腰相引痛饑見飽減名腎積 浮大而長饑減飽見腹滿泄嘔脰腫名脾積 寸口

沈而結跌而素積聚有繫痛 脈弦細微者為癥橫脇下及腹中有橫積 脈弦腹中

急痛為瘕 脈細而沈時直者身有癰腫 若腹中有伏梁 脈沈小而實者 胃有積

聚不下食食則吐脈沈而紫 若心下有寒時痛有積聚 關上脈大而尺寸細者必

心腹冷積遲而滑中寒有癥 脈弦而伏腹中有癥不可轉也死 脈緊強急者生虛

弱者死 沈者死

脈雨出

因脛寒厥死則血脈凝滯寒氣上入腸胃所以腹脹腹脹則腸外之汁沫迫聚不得散日以成積 又盛食多飲起居過度腸胃之絡傷則血溢于腸外腸外有寒汁沫與血相搏則氣聚而成積 又外中于寒內傷于憂怒氣則上逆上逆則六腑不通濕氣不行凝血蘊裏津液凝滯滲着不去而成積 又生于陰蓋憂思傷心重寒傷肺忿怒傷肝醉以入房汗出當風傷脾用力過度入房汗出入浴傷腎皆臟氣不平凝血不散汁沫相搏蘊結而成積矣 又有食積酒肉積水積涎積血積氣積皆因偏愛停留不散日久成積塊在中為痰飲在右為食積在左為血積

證蓋積聚之源則一具在臟者始終不移為積其在腑者發痛轉移隨氣結束為聚積者系于臟聚者系于腑癥者系于氣瘕者系于血

肝之積名肥氣在左脇下如覆盆發咳逆痰瘕連歲不已其中有血肝主血故也心之積名伏梁起臍下大如臂上至心下令人煩心有大膿血在于高胃之外

肺之積名息賁在右脇下大如杯洒淅寒熱喘咳肺壅者賁門也積在肺下有賁門脾之積名痞氣在胃脘大如盤四肢不收黃疸飲食不為肌痞者濕也食冷其人傷氣為濕所蓄

腎之積名奔豚發于小腹上至心下若豚狀上下喘逆骨痠

病在六腑太陽利清氣陽明泄濁氣少陽化積氣失常則壅聚不通故實而不轉虛則輸屬陽無形隨氣往來在上則格在下則脹傍攻兩脇如有泥塊易於轉變故名曰聚又有息積者乃氣息癖滯於脇下不在臟腑營衛之間積久形成氣不干胃故不妨食病者脇下滿氣逆息難頻歲不已名曰息積

治法寒者熱之結者散之客者除之留者行之堅者削之消者摩之鹹以乘之苦以瀉之全真氣以補之隨所利而行之酒肉食等積以所惡者攻之以所喜者誘之

五積丸

治積塊

連

肝腎五錢心脾一兩半脾七錢

樸肝心脾五錢肺胃八錢

已豆霜五分

川烏肝肺一錢心腎脾五錢

乾薑心肝五分腎一

錢五分

茯苓一錢五分

參肝肺腎二錢心五錢

另研巴豆旋入和勻

煉蜜丸梧子大微溲為度

柴胡二兩皂角二錢五分

川椒四錢昆布二錢

肝積加

柴胡二兩

皂角二錢五分

川椒四錢

昆布二錢

義朮三錢五分

心積加

苓三錢

桂一錢

茯神一錢

丹參一錢

菖蒲五錢

肺積加

桔梗一錢

紫苑一錢五分

天門冬一錢

三稜一錢

青皮一錢

陳皮一錢

川椒二錢五分

白豆蔻一錢

腎積加

玄胡

苦練肉各三錢

蝎

附子各一錢

澤瀉二錢

獨活

桂各三錢

菖蒲二錢

丁香五錢

脾積加

吳茱萸二錢

瀉一錢

茵陳

宿砂二錢

椒五錢

秋冬加制樸一倍減苓連服人覺

熱加連覺悶亂加桂氣短減樸

又有虛人不可直攻以蠟置其藥又且久留磨積

肉積

硃砂

水銀

阿魏

酒積

神曲

麥芽

血積

蜜虫

水蛭

桃仁

大黃 氣積 檳榔 木香 水積 甘遂 牽牛 芫花 涎積 雄黃 膩粉

食積 礞石 巴豆 癖積 三棱 莪朮 魚鮮積 陳皮 紫蘇 草果 丁香

桂心 寒冷成積 附 樸 硫磺

化氣湯 治息積癖於腹脇之下脹滿瘀痛嘔吐酸水 宿砂 桂 木香各一錢 甘草炙

茴香炒 丁香 青皮炒 陳皮 生薑炮各五錢 沉香 胡椒各一錢

右為末薑紫蘇湯鹽酒調二錢一分

散聚湯 治久氣六聚狀如聚癥瘕隨氣上下發作有時心腹絞痛攻刺脇腰喘咳滿悶

腹脹 半夏 歸各三錢 陳皮 杏仁 桂各二錢 芩 甘草 炮附 川芎 枳殼

吳茱 樸制各一錢 大黃便使秘加之

三聖膏 貼塊以石灰未化者半斤瓦器炒令淡紅出候熱稍減研之 大黃一兩末之就爐微炒候涼入桂 桂心半兩末薑炒醋熱成膏厚攤貼患處

又方 大黃 樸各一兩 大蒜搗膏貼之亦佳

張法無憂散 治諸積不化 桂苓 白朮散調之茶調散 治沈積水氣 木香 檳榔

丸調之

千金硝石丸 止可磨塊不令困人須量虛實 硝石六兩 大黃半斤 甘草 參各三兩

右為末以三年苦酒即好酢也 三升置筒中以竹片作三片刻先納大黃攪使微沸



盡一刻乃下餘藥又盡一刻微火熬膏丸梧子大每服三十九

消塊丸 此必審而可用 三稜 義朮削堅 青皮 陳皮破氣 香附製 桃仁 紅花

益 靈脂破血 甘草 牛膝死血 石減破瘰癧 二陳湯皮裏膜外多痰加之 山查食塊加

連 茶炒一錢五分 益智炒一錢五分 葵根 白朮等分

減石湯下

茶癖散 石膏 芩 升麻 砂糖調服 治痰塊 苦參 夏 瓜蒂 薑蜜丸

破塊驗丸 吳茱萸 連 木香 檳榔 桃仁 郁李仁 又承氣加連芍川芎乾薑

葛湯下 又瓜蒌半夏黃連貝母丸果效

三十一消渴

脈心脈滑為渴滑者陽氣勝 心脈微小為消痺 脈軟散氣血虛 脈洪大陽餘陰虧

寸口脈浮而遲浮為虛衛氣虧遲為勞營氣竭 跌陽脈浮而數浮為風數消穀

消痺脈實大病久可治懸小堅急病久不可治脈數大者生實堅大者死細浮短者死

因證膏梁甘肥之變則陽脈盛矣陽脈太盛則陰氣不得營也津液不足結而不潤皆燥

熱為病也

經云二陽結謂之消二陽者陽明也手陽明主津病消則目黃口乾是津不足也是陽明

主血熱則消穀善飢血中伏火乃血不足也此皆津血不足而熱也

夫因則火一也病則有上中下三也蓋心火盛於上為膈膜之消病則古上赤裂大渴引飲論云心移熱於肺傳為膈消是也以白虎加參湯主之

火盛於中為腸胃之消病則善食自瘦自汗大便硬小便數論云瘵成為消中者是也以調胃承氣三黃等治之

火盛於下為腎消病則煩燥小便濁淋如膏油之狀論云焦煩水易虧者是也六味地黃丸主之 治法熱淫所勝治以甘苦甘以瀉之熱則傷氣氣傷無潤則折熱補氣非

甘寒不治 李以補肺降火生血為主 秘丹生血為主總治三消

連 花粉 人乳 地黃汁 藕汁 右蜜為膏徐徐留舌上以白湯下

麥膏湯 治膈消上焦渴不欲多飲 人參五錢 石膏一兩 知母六錢 甘草三錢五分

水煎或方加寒水石砂

順氣散 治消中能食小便赤 川樸二兩 大黃四兩 枳殼二錢 赤芍藥

茴香散 治腎消小便如油 茴香 苦練炒 五味 右為末酒下二錢食前服

珍珠丸 治白淫滑泄思想無窮所急不得之証 黃柏一片燒 真蛤粉一片 水九空心

酒下栝降火蛤蜊補腎 又方 薑根 瓜薑根 麥門冬 知母 竹葉 牛乳

生津甘露飲 已下出李 石膏 甘草 滋水之源 連 梔柏 知母 瀉熱補水

杏仁 麥冬 全蝎 翹 白葵 白芷 歸身 蘭香 和血潤燥 升麻 柴胡 行

經 木香 藿香 反佐取之 桔梗 為末 舂之

酒煮黃連丸 治中暑熱渴 太陽渴 脈浮無汗 五苓滑石類 陽明渴 脈長有汗 白虎

涼膈等 少陽渴 脈弦而嘔 小柴胡加瓜薑 太陰渴 脈細不欲飲 不思水 少陰渴

脈沈而自利者 猪苓三黃湯 厥陰渴 脈微引水少與之

神芎丸 已下出張 連入心 牽牛逐火 滑石入腎 大黃逐火 苓入肺 薄荷散熱

三黃治消渴 大黃 春秋二兩 夏一兩 冬五兩 苓 春四兩 秋夏六兩 冬三兩 連 春四

兩 秋夏七兩 冬三兩 桂苓甘露飲調之 白虎湯調之 生藕節汁 淡竹瀝汁 生

地黃汁 相間服之 潤之 寒水石 甘草 蛤粉等分 濃煎 麥門冬 苗下二錢

神白散 治真陰虛損

豬肚丸 治消中 豬肚一箇 連五錢 麥冬志 知母 瓜薑

石四件 末入肚縫之 蒸爛熟於砂盆內 杵而丸之 如堅少加蜜 丸 梧子大 每服五十九

葛根丸 治腎消 葛根三兩 瓜薑三兩 鉛丹二兩 附一兩 炮

蜜丸 如梧子大 一日三服 春夏去附

胡粉散 治大渴又治腎消 胡粉五錢 瓜蒌根二兩 鉛丹五錢 澤瀉 石膏 白石脂

赤石脂各五錢 甘草五錢 右杵為末任意服痛者減服

人參白朮湯 參 朮 歸 芍 梔 瀉 大黃各五錢 翹 瓜蒌根 苓各一兩 桂

藿香 木香一錢 寒水石二兩 滑石 硝各半斤 甘草三兩 石膏四兩 薑煎入蜜少許

口燥口乾口渴咽乾須詳之

### 三十二痞

因誤下陰虛 食積痰滯 濕土虛痞 論曰太陰濕土為積欲痞膈乃土來心下痞滿

也 證治誤下多則亡陰胸中之氣因虛而下陷於心之分野宜升胃氣以血藥治之

亡陰謂脾胃水穀之陰亡也 痰積痞膈胸中窄塞宜消導之謂之實痞 濕土虛痞

有二大便秘飲食者厚樸枳實主之 大便利者芍藥陳皮主之 治法以瀉心湯黃連

為君瀉心下之土邪厚樸降氣 三因論狀心下堅滿痞急痛如刺不得俛仰其胸前

皮皆痛短氣咳唾引痛咽塞不利習習如痒喉中乾燥嘔吐煩悶自汗時出痛引徹背

外有心熱而痞之痞則滿硬 結胃則痛屬胸痺

大消痞丸 治濕土痞虛氣痞 連炒 苓三錢 薑黃一錢 白朮 半夏各一兩 甘草一錢

宿砂一錢 枳實炒 生薑五錢 陳皮二錢 曲炒一錢 樸三錢 澤瀉一錢五分 豬苓一錢五分

九梧子大 白湯送下 木香有憂氣結中脘心下痞滿肚皮底微痛加之否則不用

利膈丸 除痰利膈

芩生一兩 炒一兩

連

星

夏各五錢

枳殼

陳皮各三錢

木二錢

白礬五分

澤瀉五錢 曲炒

瓜蒌丸 治胸痞或脇下逆搶心 瓜蒌子 枳實 陳皮 取瓜蒌皮穰末熬丸

胸痞切痛加梔子燒存性 附子炮各二兩

### 三十三腫脹

脈遲而滑者脹 盛而緊曰脹陽中有陰也故下之跌陽緊而浮緊為痛而堅滿浮為虛

則脹鳴 弦而遲者必心下堅 又云肝木克脾土鬱結凝閉於臟氣腑氣不舒胸則

脹閉 脈浮而數浮則虛實則數 脈浮風水皮水皆浮 虛緊滿者脹憂思結連脾

肺氣凝大腸與胃不平而服 脈石水黃汗皆沈 脈浮而滑名風水 浮而遲浮熱

遲濕濕熱相搏石水必矣 弦而緊弦而衛氣不行水走腸間 水滿腹大如鼓脈實

者生虛者死洪大者生微者死 腹脹便血脈不大時絕極脈小疾者死 中惡腹大

四肢滿脈大而緩者生緊大而浮者死緊細而微者亦生

因證蓋腫脹之因其始則一其變則二皆脾胃之土生焉

水腫之因蓋脾虛不能制水腎為胃關則不利水漬妄行參透經絡其始起也因窠上

脈沉石黃  
汗皆沉