

東醫寶鑑雜病篇卷之五上

東醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君許浚奉教撰

霍亂

之由

內經曰三鬱之發民病嘔吐霍亂注下又曰太陰所致爲中滿霍亂吐下又曰歲土不及

風乃大行民病飧泄霍亂體重腰痛筋脈痛病○

霍亂之病皆因飲食非關鬼邪錯○內有積外

有所感陽不升陰不降垂隔而成非因鬼邪皆飲

食所致此先哲確論也○霍亂者揮霍變亂也

凡人內素有鬱熱外又感寒一時陰陽錯亂然病

本因飲食失節生冷過度以致濕熱內甚中焦失

運不能升降是以上吐下瀉○霍亂或因飲冷

或冒寒或失飢或大怒或乘舟車傷動胃氣令人

吐瀉併作用藥遲緩須臾不救○霍亂多責於熱故夏秋為盛。風者肝木也濕者脾土也。渴者心火也肝○霍亂之病由風濕渴三氣之合成也。風急甚則轉筋也吐者腸也心火炎上故主筋故風急甚則轉筋也吐者腸也心火炎上故嘔吐也瀉者脾土也脾熱下流故泄瀉也

霍亂

形證

霍亂證心腹卒痛嘔吐下利增寒壯熱頭痛眩暈先心痛則先吐先腹痛則先瀉心腹俱

痛吐利並作甚則轉筋入腹即死。三焦為水穀之道路邪在上焦則吐而不利邪在下焦則利而不吐邪在中焦則吐利並作病因飲食不節清濁相干陰陽乘隔輕者則日吐利重者揮霍變亂乃曰霍亂因邪入脾胃故發為吐利。霍亂一證夏秋為多冬月亦有之蓋有伏暑而作。人失宜露臥當風使風冷之氣歸于三焦傳于脾胃

脈法

脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干飲食變
亂於脾胃之間心腹疼痛發作吐利有心痛而先
吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有發熱頭
痛體疼而復吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛者
或轉筋拘急疼痛者或但嘔而無物出者或因
肢逆冷煩悶昏塞而欲死者隨證治之
霍亂脈浮洪可救脈微遲而不語氣少則難差
○脈多伏或絕○脈代者霍亂代而亂者亦霍
亂又關脈滑為霍亂吐瀉又滑而不勻必是霍亂
吐瀉之候脈代勿謂○滑數而嘔代者霍亂微
滑者生溫數凶斷○脈微而澀或代而散或隱
而伏或大而虛或結或促或代皆不可斷以死脈
亂故也○脈浮大而洪
可救微弱而遲難救

霍亂有乾有濕

此病有乾霍亂有濕霍亂乾霍亂死者
多濕霍亂死者少蓋吐利則所傷之物

得以泄出雖甚重胃中水穀泄盡則正矣所以死者少也乾霍亂死者多以其上不得吐下不得利則所傷之物不得出泄壅閉正氣隔絕陰陽煩擾悶躁喘脹而死矣

理明

乾霍亂治法

吐利不得謂之乾霍亂○乾霍亂者忽然心腹脹滿刺痛狀若神靈所附吐利不得

頃刻之間便致悶絕急用鹽湯吐之續以理中湯
麝香倍加橘紅與之或藿香正氣散麝香加官桂
赤茯苓木瓜枳殼煎服或吞下蘇合香元尤佳
○乾霍亂最難治死在須臾升降不通故也當先
吐以提其氣之橫格不可用涼藥宜二陳湯方
加解散藥川芎蒼朮防風白芷之類兼用姜鹽湯
心○絞腸沙者乃乾霍亂一名也腹痛不可忍或
手足厥冷乃腸胃絞縮在腹也急用鹽湯吐之
○乾霍亂者氣痞於中吐利不得所傷之物壅閉
正氣關格陰陽煩躁喘脹者必死急用吐法錢委

中欲出血兼服治中湯助
或藿香正氣散必效

薑鹽湯

治乾霍亂欲死鹽一兩生薑切半兩右同炒
色變以童尿二盞同煎至一盞分二次服

濕霍亂治法

上吐下瀉謂之濕霍亂。凡霍亂吐瀉渴
為熱不渴為寒。熱多欲飲水宜五苓

散寒多不飲水宜理中湯。吐瀉不止。霍亂乃

濕熱兼風水為害。治宜散風寒。利瀉降火。四時通

用霍香正氣散。勦寒月虛冷用理中湯。勦暑

月煩渴宜黃連香薷散。勦俱宜合五苓散。勦

以分消上下更合益元散。勦降火尤佳。霍

亂吐瀉宜用木萸散。二香黃連散。加味姜附湯。回

生散。加減正氣散。中暑霍亂宜香薷散。桂苓白

朮散。吐瀉過多。四肢逆冷。不省人

事。南星末三錢。棗三枚。姜五片。煎極熱服。一服可

效。或半夏末。姜汁點服。或白礬末。一大錢。沸湯點

服亦效

術莢散

治霍亂吐瀉肢體轉筋逆冷木瓜吳茱萸食鹽各五錢右同炒令焦研盛百沸水三升入

藥同煎至二升冷煖任意服卽效。如無前藥枯白礬末一錢沸湯調服如無白礬只用鹽一捻醋一盞同煎服或鹽梅醃酸等物皆可煮服

二香黃連散

治伏暑霍亂腹痛躁悶脈沉手足冷藿香厚朴半夏赤茯苓陳皮白扁豆香薷

各一錢黃連淨瀉各八分甘草三分右剉作一貼水煎入姜汁一匙溫服

加味薑附湯

治霍亂吐瀉過多手足逆冷氣少不語六脈沉伏附子炮乾姜炮人參各一錢

半甘草炙七分右剉作一貼水煎服

煎服○一名四順附子湯

回生散 治霍亂吐瀉過多但一點胃氣存者服之
生薑香陳皮各五錢右剉作一貼水煎溫服

加減正氣散 異鄉人初到他地不伏水土遂成霍亂
或吐或瀉蒼朮二錢藿香厚朴陳皮縮

砂研香附半夏甘草各一錢右剉作一貼
入姜三片棗二枚燈心一團水煎服

香薷散 治中暑霍亂吐瀉腹痛轉筋四肢逆冷
急煎此藥沉冷服之他藥不能救

益元散 一名六一散治霍亂吐瀉取此
藥生薑湯調下妙方

霍亂後轉筋 陽明屬胃與大腸以養宗筋暴吐暴瀉津
液驟亡宗筋失其所養故輕者面腳轉筋

而已重者遍體轉筋入腹手足厥冷危甚風燭矣
倉卒之際以鹽填臍中灼艾不計其數雖已死而

胃中有煖氣者立甦更用木萸散坊見加茴香甘

草紫蘇葉煎服再研大蒜塗兩脚掌心則雖昏危

人服者亦效臥○霍亂吐瀉過多遍體轉筋手足

厥冷氣欲絕者急灸臍中又取蓼一把煎湯泡洗

次投附子理中湯勑服即效○霍亂後轉筋理

中湯勑服加石膏一兩煎服○一法理中湯去

白朮加生附子一箇○轉筋屬血熱因物湯助

加酒芩酒生蒼朮南星煎服○吐瀉脇痛轉

筋脈弦者木剋土也平胃散勑服加木瓜五錢

煎服○吐瀉後轉筋不止宜用木瓜湯

木瓜湯治霍亂轉筋木瓜四錢吳茱萸二錢茴香炒

一錢甘草炙四分右剉作一貼入薑三片紫

葉十葉塩一撮烏

梅一箇同煎服

一法治轉筋不止欲死男子以手挽其陰牽之女子

則挽其乳近兩傍牽之此千金方妙法也

一法則挽其乳近兩傍牽之此千金方妙法也

霍亂後煩渴

吐瀉既多津液暴亡以至煩渴引飲不止宜桂苓白朮散五苓散勸服椒豆散麥門

冬湯加減薤苓湯止渴湯

桂苓白朮散

治中暑霍亂吐瀉煩渴滑石一兩寒水石石膏澤瀉甘草各五錢白朮白茯苓

人參桂枝各二錢半右為末每三錢白湯或新汲水調下生薑湯亦可

麥門冬湯

治霍亂後煩渴麥門冬二錢陳皮半夏白朮白茯苓各一錢小麥半台人參甘草各

五分右剉作一貼入薑三片烏梅一箇水煎服

椒豆湯

治霍亂吐瀉後煩渴不能服藥或水藥不入口者胡椒葉豆各四十九粒右研為末新汲

水調下或水煎服○一名胡椒湯胡椒七粒菜豆二十一粒為末木瓜湯調下

加減薑苓湯

治霍亂熱渴 天花粉二錢 赤茯苓一錢 猪苓澤瀉香薷乾葛各七分 黃連白朮

甘草各五分 石剉作一貼 入姜三片 水煎服

蠶

止渴湯

治同上 人參麥門冬 赤茯苓 桔梗 瓜蒌根 澤瀉 葛根 甘草各五錢 右爲末 蜜水調二錢服

痢

霍亂後虛煩

霍亂後虛煩不得眠或熱渴宜竹葉石膏湯 寒熱參胡三白湯 既濟湯 燐

參胡三白湯

治霍亂後煩熱口乾脈數或頭身痛 柴胡白朮白茯苓白芍藥當歸陳皮麥門

冬梔子仁甘草各八分 人參五分 五味子十粒

右剉作一貼 入棗二枚 加燈心一團 煎服 翻

既濟湯

治霍亂後虛煩不得眠 麥門冬二錢 人參竹葉半夏附子炮甘草炙各一錢 右剉作一貼

入薑五片梗米百粒水煎服

霍亂吐法

治乾霍亂心腹刺痛煩渴吐利不得氣微絕者極鹹鹽湯熱飲一升刺口令吐不吐則再

飲一升須三吐使宿食盡乃止此法大勝諸治吐訖以理中湯藿香正氣散軟緩調治
○又法急以鹽湯一盞入童便薑汁頓服探吐
○又法急令透未透再服吐後續用熨法

霍亂熨法

霍亂吐瀉心腹痛不可忍炒鹽二碗紙包紗護頸其胃前並腹肚上以熨升火熨之氣透

則甦續以炒鹽熨其背則十分無事
○又法鹽炒吳茱萸熨臍下亦效

霍亂鍼法

乾霍亂刺委中出血或十指頭齧出血皆是其法
○絞腸痧證手足厥冷腹痛不可忍

者以手蘸溫水于病者膝腕上拍打有紫黑點處以針刺去惡血即愈
○又法用麻弦小竹

弓蘇香油或熱水刮手足胷背額百卽愈驗○乾
霍亂者乃寒濕太甚脾被絀而不能動氣被鬱而
不能行所以卒痛而手足厥冷俗名絞腸沙者蓋
言痛之甚也北方刺青筋以出氣血南方刮胷背
手足以行氣血俱能散病然出氣血不如行氣血
之爲愈也○又治絞腸沙刺血法詳見救急門

霍亂灸法

霍亂轉筋入腹手足厥冷氣欲絕以鹽填臍
中大艾炷灸之不計壯數立效○霍亂已

死而腹中有煖氣者依上法灸之亦甦○又法
灸氣海二七壯妙○霍亂吐瀉不止垂死灸天
樞氣海中腕立愈○霍亂諸法不效灸大椎卽
效○霍亂已死但有煖氣者灸承筋七壯立甦

目綱

禁忌法

霍亂吐瀉之時切勿與穀食雖米湯一呷下咽立死必待吐瀉止過半日飢甚方可以稀粥以

漸而將息

○霍亂吐瀉時慎勿以粟米粥湯入

胃必死矣

○霍亂不可遽以米飲粥飯以助邪

氣必所傷

物盡然後稀粥漸養之

大忌飲食入腹則死

只食米飲不妨不可食熱湯

切不飲熱

酒燒酒

不治證

霍亂轉筋腹痛四肢厥冷氣欲絕其脈洪大可治如脈微而囊縮舌卷者不治

煩躁者不治

○乾霍亂吐瀉不得胃腹脹硬而

唇青黑手足冷過腕膝六脈伏絕氣喘急舌短囊

縮者死

○脈微遲氣少不語為難治

渴大躁大汗遺尿者死

○回生散救之

水疾吐瀉

乘船大吐瀉渴飲水者即死童便最好自己

尿亦可

○又枯白礬末一錢百沸湯點服

亦好臥○船暈嘔吐大
半夏湯方
眼煎服效驗

單方

凡二十
一種

鹽治乾霍亂鹽一大匙熬黃取童
尿一升溫和攪服吐下即愈乾

鍋底墨治霍亂取二錢百沸湯一盞
投其中急攪服吐瀉立止乾

甘爛水治霍亂入藥煎
用甚妙

生熟湯一名陰陽湯治乾霍亂能吐宿食惡毒之物
和鹽服之尤妙即百沸湯合新汲水也乾

生薑治霍亂欲死生薑五兩切取半
尿一升同煎取汁服即效乾

天南星治吐瀉不止四肢逆冷不省人事南星為末
每三錢入大棗三枚同煎服四肢漸煖神識

便省神
妙乾

蘆花

一名蓬蘆治霍亂氣息危急者
取一把濃煎取汁頓服即差乾

皂角

乾霍亂鹽湯一椀入皂角
末少許調服探吐即效乾

木瓜

治霍亂吐瀉轉筋不止煮汁飲之
枝葉功同模樨與木瓜同功乾

烏梅

治霍亂煩渴水漬
和蜜飲之妙乾

林擒

青色者治霍亂吐瀉甚妙
煮取汁飲或嚼食之乾

秣藟葉

治霍亂轉筋筋大如桃李
搖不可忍取葉濃煎湯飲之
種

粟米泔

治霍亂煩渴飲數升立差
○又研米
清水和攪取汁服之主轉筋入腹乾

糯米

治霍亂煩渴水研取汁任意飲之

蓼

治霍亂轉筋濃煎乘熱熏洗因取飲一二盞即愈

香薷

治霍亂吐瀉轉筋濃煎飲之即止○治霍亂不可闕也

小蒜

治霍亂吐瀉煮汁飲之

牛糞

治霍亂吐瀉四肢逆冷黃牛糞以水煮濾取清汁頓服一升即止

烟鹿皮

或烟麋皮熏烟最多黃色者水浸搽取汁頓服治乾霍亂即吐神效

醋

治霍亂未得吐下飲一二升良○治轉筋取衣絮漬醋煮合溫裏患處冷則易即愈

牛涎

小兒霍亂牛涎合灌下立效