

卷六

傅氏眼科審視瑤函卷之六

數集目錄

迎風冷淚症

河間當歸湯

阿膠散

枸杞酒

迎風熱淚症

羚羊角散

白殭蠶散

眞珠散

無時冷淚症

菊睛丸

麝香散

無時熱淚症

當歸飲子

椒芋丸

背帷爛症

疏風通聖散

東垣碧天丸

紫金膏

迎風赤爛症

柴胡散

疏風散濕湯

治爛弦眼生蟲方

敷爛弦眼方

因風症

正容湯

半夏茯苓天麻湯

夜光柳紅散

加減地黃丸

豆淋酒法

蟬花無比散

槐子丸

川芎石膏散

摩風膏

因毒症

內疎黃連湯

選陰解毒湯

因他症

前胡犀角飲

羌蔚子丸

明目大補湯

東垣清神益氣湯

順經湯

磁石丸

羊肝丸

物損真睛症

加味四物湯

局方黑神散

經効散

一線散

颰腫飛揚症

平瀉四法

飛絲目症

經効三法

時復症

洗肝散

洗心湯

瀉肺湯

六味地黃湯

通明散

東垣羌活除翳湯

明目流氣飲

神仙退雲丸

天王補心丹

加味六味地黃丸

附前賢治目醫案補遺諸方

十全大補湯

七宣丸

神功丸

小柴胡湯

二陳湯

溫白丸

川芎茶調散

四物湯

涼膈散

三黃丸

四季三黃瀉心丸

青州白丸子

瓜蒂散

茶調散

導痰湯

保命集當歸湯

保命集羚羊用散

濟陰地黃丸

秘製點眼丹藥諸方

靈飛散

五膽膏

宋真宗皇帝勅封瓊液膏

紫金錠子

丹陽藥品法製

陰丹藥品法製

配合陰陽法式

用丹頭大要

不換金撥雲丹

秘授製蘆甘石法

審視
煮薑甘石三黃湯藥

取永粉法

製礪砂法

眼科取靈砒法

爛翳方

點翳膜老障翳方

收淚散

敷眼諸藥方

玉龍丹

散血膏

清涼膏

搜風散

洗眼諸藥方

神仙碧霞丹

洗爛弦風赤眼

洗眼紅血兒

治眼吹藥諸方

立應散

碧玉散

青火金鍼

赤火金鍼

通頂散

止痛藥方

乳香丸

神仙拈痛散

傅氏眼科審視瑤函卷之六目錄終

醫見錄

卷之六目錄

四

傅氏眼科審視瑤函卷之六

株陵傅仁宇九科纂輯

婿張文凱廷獻泰閣

廣陵林長生聲震較補

男傳維藩國棟編集

甥張秀微珩訂正

公猷

掄

大梁周靖公亮節較梓

體仁

顓

全次

運氣原證

按內經運氣淚出皆從風熱經云厥陰司天之政三之氣天政

布風乃時舉民病泣出是也

目淚

靈樞黃帝曰人之哀而泣涕者何氣使然岐伯曰心者五臟六腑之主也目者宗脈之所聚也上液之道也目

鼻者氣之門戶也故悲哀愁憂則心動心動則五臟六

腑皆搖搖則宗脈感宗脈感則液道開液道開故涕泣

出焉液者所以灌精濡空竅者也故上液之道開則泣

泣不止則液竭液竭則精不灌精不灌則目無所見矣

故命曰奪精補天柱經俠頸俠頭中分也又曰五臟

六腑心為之主耳為之聽目為之視肺為之相肝為之

迎風冷淚症

榮脾爲之衛腎爲之主故五臟六腑之津液上滲於目
心悲氣并則心系急心系急則肺舉肺舉則津液上溢
夫心系與肺不能常舉乍上乍下故欬而泣出矣○素
問解精微論曰厥則目無所見夫人厥則陽氣并於上
陰氣并於下陽并於上則火獨光也陰氣并於下則足
寒足寒則脹夫一水不勝五火故目昏盲是以氣衝風
泣下而不正夫風之中目也陽氣內守於精是火氣燭
目故風見則泣下有喻比之夫火疾風生乃能由此之
類也○東垣云水附木熱上爲眼澀爲眵爲
冷淚此皆由肺金之虛而用木寡於畏也

迎風冷淚水木但虛血液不足寒藥勿施失治則重宜早補之

此症謂見風則冷淚流若赤爛有障翳者非也水木二經血
液不足陰邪之患久而失治則有內障視眇等症生焉與無
時冷淚不同此爲竅虛因邪引邪之患若無時冷淚則內虛

膽腎自傷之患也此宜服

河間當歸湯

治風邪所傷寒中目
淚自出肌瘦汗不止

白米炒

白茯苓

乾薑炮

細辛

川芎

白芍藥

甘草炙各五分

官桂

陳皮各一錢

當歸身酒製

人參各二錢

右為劑水二鐘薑一片輝棗三枚煎八分去滓熱服不計時

併三服

阿膠散

治目有冷淚流而不結者肝經受風冷故也

阿膠

馬兜鈴各兩半

紫苑

款冬花

糯米各一兩

白蒺藜炒二錢半

甘草五分

右為細末每服二錢水一鐘煎不拘時服

枸杞酒

治目視不明迎風冷淚

枸杞子

揀肥者一觔杵爛右用絹袋盛貯須浸酒訖蜜封勿令泄炙候三七日取飲

陳無灰酒十觔

仍用猪肝煮熟切片蘸花椒鹽同食每飲酒一二盃勿官過飲不但効反佐濕熱爲害不淺矣

按肝氣通於目肝和則能辨五色矣今肝爲勞傷致目視不明多出冷淚經曰味爲陰味厚爲陰中之陰枸杞子味厚故足以養厥陰之陰煮以純酒取其挾治氣血而已

迎風熱淚症

迎風熱淚出肝虛夾火來水中起隱伏久則或因災但此症不論何時何風見之則流熱淚若有刑症及風氣者非也乃肝瞻腎水之津液不足故因虛竅不容而風邪引出其淚也中有隱伏之火發故淚流而熱入而不治及有觸花則有變矣宜服

羚羊角散

治肝臟受熱眼目昏花時多熱淚

羚羊角

細差活

玄參

車前子

山梔仁

黃芩

瓜蒌

各五錢

胡黃連

家菊花

各三錢

細辛

一錢

右為細末每服二錢食後竹葉煎湯調下

白礬蠶散

治衝風淚出

白礬蠶

炒

粉草

旋覆花

細辛

木賊草

各五錢

嫩芥

二錢半

嫩桑葉

二兩

右為細末每服二錢白水煎食後溫服

珍珠散

治肝虛目風淚出

珍珠

另研

丹砂

研各二分

乾薑

研二分

貝齒

火煨水卒乾研一兩

右共研極細令勻以熟絹帛籠三遍每仰臥以少許點眼中

閑少時為妙

無時冷淚症

無時冷淚水不俱傷此幽陰之深患其為病也非常然斯疾各出不意非毒疔則內障為殃

此症為目無赤病也只是時常流出冷淚久則視瞻昏渺非比迎風冷淚因虛引邪之輕者此蓋精液耗傷肝氣漸弱精膏澀枯腎水不足幽陰已甚久而失治則有內障青盲之患精血衰敗之人及悲傷哭泣久鬱婦人產後悲泣太過者每多此症且為禍又緩人不為慮往往罹其害而禍成也悔已遲矣宜服

菊睛丸

治肝腎不足眼目昏暗瞻視不明茫茫漠漠
常見黑花多有冷淚久服補不足強肝腎

甘菊花

去梗葉
四兩炒

巴戟

去心
一兩

肉蓯蓉

酒洗去皮炒
切焙乾一兩

枸杞子

搗焙
三兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三錢溫酒或青鹽湯空

心食前送下

麝香散 治眼治淚
不此喘鼻

香附子

川椒目 各等

蒼木

麝香 各少

右爲細末令病者噙水一口將藥吹於鼻內

無時熱淚症

無時熱淚其禍幽微此損耗中之伏隱乃不足中之有餘服寒
涼則傷汁損血服熱藥則血壅難舒當以意中求趣補益當而
消除

此症謂曰無別病止是熱淚無時而常流也若有別病而熱
淚出者乃火激動其水非此病之比蓋肝膽腎水耗而陰精
虧澀及勞心竭力過慮深思動其火而傷其汁也故膏液不
足又哭泣太傷者每每患此久而失泊觸犯者變爲內障因

其為患微緩羅其禍也多矣宜服

當歸飲子

當歸身

人參

柴胡

黃芩

甘草

白芍藥

大黃

錢各一

滑石

五分

右剉劑水二鐘生姜三片煎至八分去滓溫服

椒芋丸

治目昏多淚

熟地黃

切焙乾

川椒

去目及閉口者微炒

生地黃

切焙乾

右三味各等分為細末煉蜜為丸如桐子大每服五十九粒

米飲空心送下

江陵傅氏家貧鬻紙為業好接待遊士一日有客方中布袍邀傳飲傳目昏多淚客叫以此方服不一日目能夜視

物年八九

十聰明不衰

風沿

月谿云風沿眼系此膈有積熱自飲食中挾怒氣而成

頰痰痞寒濁氣不下降清氣不上升由是火益熾而水

諸降積而人也。眼沿四臆瀆而腫於中生細小虫。滋
年人不愈而多癢者是也。用紫金膏以銀釵助搯去。法
膩點之試問若果癢者又當去更以絕根本。蓋紫金膏
只去濕與去風涼血而已。若前所謂飲食挾怒成痰又
須更與防風通聖散去硝黃為綱。末以酒拌勻曬
乾依法服之。禁諸厚味及大料物。方盡諸法之要。

皆唯赤爛症

皆唯赤爛人皆有之。火土燥濕病有重輕。重則皆唯裂而血出
輕則弦赤爛而難舒。以清潤而為治。何病患之不陰。

此症專言皆之赤爛。曰無別病也。若目有別病而赤爛者及
因別火致傷其皆。又非此比。赤勝爛者多於勞心憂鬱。分悖
無形之火所傷。爛勝赤者多於恣燥者。酒哭泣過多。冒火冲
烟風熱蒸薰有形之火所傷。病屬心絡甚則火盛而生瘡於
皆邊也。要分大小。二皆相火君火虛實之症。宜服點洗。

防風通聖散

并治中風一切風熱。大便秘結。小便赤澀。眼目赤
痛。或熱急生風。舌強口噤。或鼻生紫赤。風刺癢疹。