

R289.349

2

時方歌括目錄

補可扶弱

四君子湯

一

六君子湯

二

香砂六君子湯

三

五味異功散

四

補中益氣湯

五

當歸補血湯

六

保元湯

七

獨參湯

八

四物湯

九

八珍湯

十

十全大補湯

十一

人參養榮湯

十二

天王補心丹

十三

六味地黃丸

十四

桂附地黃丸

十五

還少丹

十六

龜鹿二仙膠

十七

聖愈湯

十八

十味地黃丸

十九

正元丹

二十

歸脾湯

二十

大補陰丸

二十

虎潛丸

二十

加味虎潛丸

二十

全鹿丸

二十

重可鎮怯

磁砂丸

二十六

蘇子降氣湯

三十

硃砂安神丸

二十

四磨湯

二十

黑錫丹

三十

全真益氣湯

三十

二加龍骨湯

三十

輕可去實

九味羌活湯

三十

人參敗毒散

三十

香蘇飲

三十

升麻葛根湯

三十

小續命湯

三十

地黃飲子

三十

資壽解語湯三十

藿香正氣散四十

香薷飲四十

五積散四十

小柴胡去參加青皮湯四十

三

小柴胡加常山湯四十

四

宣可決壅

稀涎湯

四十

通關散

四十

越鞠丸

四十

逍遙散

四十

通可行滯

導赤散

五十

五淋散

五十

通關丸

五十

又名滋

六一散

五十

泄可去閉

備急丸

五十

三一承氣湯

五十

溫脾湯

五十

防風通聖散

五十

涼膈散

五十

失笑散

五十

獨聖散

五十

滑可去着

芍藥湯

六十

脾約丸

六十

更衣丸

六十

礞石滾痰丸

六十

指迷茯苓丸

六十

濬可固脫

當歸六黃

六十

耆附湯

六十

玉屏風散

六十

威喜丸

六十

濟生烏梅丸

六十

斗門秘傳方

七十

聖濟附子丸

七

四神丸

七十

金鎖固精丸

七十  
三

封髓丹

七十  
四

真人養臟湯

七十  
五

濕可潤燥

清燥救肺湯

七十  
六

瓊玉膏

七十  
七

生脈散

七十  
八

燥可去濕

神尤湯

七十  
九

平胃散

八十  
一

五皮散

八十  
一

二陳湯

八十  
二

草薢分清飲

八十

腎着湯

八十  
四

一味白朮酒

八十

五

寒能勝熱

瀉白散

八十  
六

甘露飲

八十

左金丸

八十  
八

香連丸

八十  
九

溫膽湯

九十

金鉢子散

九十  
一

丹參飲

九十  
二

百合湯

九十  
三

滋腎丸

九十  
四

地骨皮散

九十

清暑益氣湯

九  
十

龍膽漣肝湯

九  
十

當歸蘆薈丸

九  
十

犀角地黃湯

九  
十

四生丸

一  
百

熱可制寒

回陽急救湯

一  
百

益元湯

一  
百

濟生腎氣丸

一  
百

三生飲

一  
百

參附湯

一  
百

近救白朮湯

一  
百

附子理中湯

一  
百

雞鳴散

一  
八

時方妙用卷之三

閩長樂陳念祖修園著

江右泰和蕭敷政蒲郵甫校刊

教敬五

血證吐血  
舌衄咯血  
大便血鼻衄  
小便血齒衄  
血淋血崩

經曰中焦受氣取汁變化而赤。是謂血。血之流溢半隨衝任而行於經絡。半散於脈外而充肌腠皮毛。若外有所感內有所傷。則血不循經。從上而湧。則爲吐血。咳血。咯血。鼻衄。齒衄。舌衄。從

下而走。則爲大便血。溺血。婦人血崩。其源則一。  
或問諸書皆分別五臟六腑之血。而施治。茲何  
以籠統言之。余曰。五臟有血。六腑無血。觀剖諸  
獸腹。心下夾脊。包絡中多血。肝內多血。心脾肺  
腎中各有血。六腑無血。近時以吐血多者。謂吐  
胃血。皆耳食前醫之誤。凡吐五臟血必死。若吐  
衄崩下。皆是經絡散行之血也。或問既無分別。  
何金匱以瀉心湯治心氣不足爲吐衄乎。曰百

病不離於五臟六腑。臟腑病以致血不循經而爲吐衄崩下。非吐衄崩下之血從臟腑中脫出也。循經之經字作常字解時醫誤解謂歸脾湯引血歸脾。脾能統血。即是歸經。害人無算。奈再爲之喝醒一語曰。隨者仍其隨之常行者。仍其行之常散者。仍其散之常充者。仍其充之常血循經常之道路。則無吐衄崩下之病矣。千古無一人談及。余於高士宗引而不發處。細繹斯論。

大爲快事。

身熱脈大者難治。身涼脈靜者易治。若喘咳急而上氣逆。脈見弦緊細數。有熱不得臥者死。

一外感吐血。先見頭痛惡寒發熱等證。必取微汗則愈。宜

香蘇飲。加荆芥穗一錢。丹皮白芍各一錢五

分五

三十

一夏令秋令感暑氣燥氣而吐血。方治見咳嗽。  
門不贅。

一內經云。不遠熱。則熱至。血溢血泄之病生矣。  
凡人不避暑熱。及過食燙炙之物。以致血熱。  
妄行。宜

四生丸。

百一

一瘀血而吐。必先胸痛。血色必紫。或黑而成塊。  
脈必滯澀。宜

四物湯加醋炒大黃桃仁丹皮香附各一錢  
五分。如紫血盡鮮血見卽用六君子湯加

當歸調之。

九鼓峯心法。出高

一傷寒及溫病應發汗而不汗之內熱蓄血及  
鼻衄吐血不盡內餘瘀血大便黑面黃宜

犀角地黃湯。

九十

一高鼓峯心法於血證獨精其云除瘀血與傷  
寒外其餘俱屬七情饑飽勞力等因必見惡

心。驗證。一味固元湯主之。方用人參、炙芪、歸身、甘草、煨薑、大棗、白芍。水煎服。血證最繁。以一方統治。胡念齋深服之。○胡念齋云。補藥可用。溫藥亦須急加。附桂炮薑隨宜。

一齋直指。謂陽虛陰必走。大吐大衄外。有寒冷之狀。可用理中湯。加南木香。或甘草乾薑湯。其效更著。又有飲食傷胃。胃虛不能傳化。其氣上逆。亦能吐衄。亦宜上二方。余用甘