

增補
註釋
洗冤錄集證



R89

1

重刊補註洗冤錄集證目錄

卷一

檢驗總論

驗屍時未埋 已瘞

辨四時屍變

已爛屍

滴血

卷二

毆死

殺傷辨生前死後

溺水辨生前死後

卷三

疑難雜說

屍傷雜說

病屍

胃時氣

鹹死屍

鐵釘傷死

驗傷及保辜總論

洗瘞

辨傷真偽

驗骨

檢地

手足他物傷

自殘

溺井

屍格

初檢

驗婦女屍附胎孕 孩屍

檢骨辨生前死後傷

屍圖

覆檢

白僵

論沿身骨脈

木鐵等器鞭石傷

自縊

焚死辨生前死後

踢傷致死

被毆勒死假作自縊

湯潑死

碎中屍

中暑

醉飽死

雷震擊死

傷寒

凍死屍

燒酒醉死

受杖死

硬物應店

虎咬

路死屍

車輪壓死

蛇蟲傷

爆竹插入真門點致死

論中毒

服毒辨生前死後

諸毒

中蠱
既備
食果實金石藥毒
鹽油
草烏頭毒

意外諸毒

荒饑並食
河魀風藥並食
三足驚
黃蠟毒
空屋邪毒

卷四

急救方

救絕死
救中喝
救驚斃
治癰狗傷

救服毒中毒方

解砒毒
解斑點
解毒草
救服酒
解煤毒

治蠱毒及金蠱蠱

金蠱蠱
鈎吻毒
中酒毒
幹灰汁
鴉鳥

驢肉荆芥毒
食物變改及食禁
毒草
蟬毒
蛇虺涎

救溺死
救凍死
救撲打碎死

解巴豆毒
解鼠莽毒
解草烏頭毒
解射罔毒
解飲饌毒

辟穢方

鼠莽毒
冰片毒
茵草
茺蓉

漏滴內
蛇遺水
食魚投荆花毒
守宮毒
煤炭毒

治刀傷
救壓傷
救跌壓傷

治吞金
治菌毒
解胡蔓草
解藥蠱金石毒

巴豆毒
水銀
銀鋤
苦杏仁

蜜酢並食
瓶花水
雞毒
曬衣暑
服宮粉身死

救湯火傷
救中惡
治蛇蟲傷

解蓂若毒
解苦杏仁毒
解輕粉冰片毒
解水銀入耳

卷五

洗冤錄補遺三則

勒死分自勒人勒並檢咽喉腐化骨法
投水水內受傷檢骨法

溺死辨自投入搥並檢搥元骨法

洗冤錄備考十一則

檢腰肋虛候致傷骨法
檢殿後用爆竹插入龔門點
馬驢踏傷痕
奔跑忿激氣逆血湧死
用蛇入腹致死驗屍檢骨法
致致死骨法
自縊檢驗法

僅存零星碎骨數塊檢地法
三次檢自縊骨法
檢烟燠致死骨法
辨紅赤色
潤布自縊耳根八字痕不現

檢驗雜說

檢驗雜說歌訣

附刊寶鑑編目錄

仰面致命傷十六穴

合面致命傷六穴

致命傷亦分輕重

傷輕却當致命處

傷重不當致命處

未死驗傷

保辜限期

已死驗傷

驗傷真偽

初檢

覆驗

洗卷

檢已爛屍

四時屍變

檢骨

骨節數目

滴血

檢地

毆傷屍訣

手足傷

他物傷

殺傷訣

殺傷辨生前死後

自刎訣

自縊訣

勒死訣

溺水訣

焚死訣

湯潑訣

服毒訣

婦女訣

孩屍訣

附刊石香秘錄目錄

檢驗

驗生傷

命案驗傷總論

無名屍

覆檢

檢漫地枯骨

驗傷機要

賢子傷辨驗

此將君石香之藏本也所論驗傷諸條甚為詳數真可補洗冤無冤錄之遺缺梓以公諸世
未知所從來即以石香秘錄名之仲振履識

重刊補註洗冤錄集證卷四

急救方

〔救縊死〕

凡縊從早至夜。雖冷亦可救。從夜至早。稍難。若心下溫。一日作。猶可救。不得救。繩任縊。續抱解。放卧。令一人踏其兩肩。以手提其髮。常令緊。不可使頭垂下。一人微微撚整喉。嚙以手擦胸上。散動之。一人磨擦臂足。屈伸之。若已僵。但漸漸強屈之。又按其腹。如此一飯久。即氣從口出。得呼吸。眼開。甦醒後。又以官桂湯及粥飲與之。令潤咽喉。更令二人以筆管吹其耳內。若依此救。無不活者。

官桂湯

廣陳皮 八分

厚朴 一錢

肉桂 五分

製半夏 一錢

乾薑 三分

甘草 三分

又法。緊用手卷其口。勿令通氣。兩時許。氣急。即活。

又法。用皂角細辛等分。為末。如大豆許。吹兩鼻孔。

又法。用真野山羊血二三分。研極細。以好酒灌下。立活。

又法。凡男女縊死。身雖僵定。尚可救活。不可割斷繩索。抱起解下。安放平坦處。所仰面朝上。頭要扶正。先將手足慢慢曲彎。然後將大小便用器軟之物裹緊。不令泄氣。用一人坐於頭前。兩脚踏其肩。

揪住頭髮。將縊人之手拉直。令喉項通順。再用二人將細筆筒或葦筒。耳內不住口吹氣。不住手。

撫摸其胸前。用活雞冠血滴入喉鼻之中。男左女右。男用公雞。女用母雞。刻下即能甦活。如氣絕時。

久照前救法。務要多吹多摸。勿謂已冷。忽略不救。

又方。取活鵝嘴入口內。鵝鳴。應聲即活。見洗冤錄表。

山羊血救

法

原本二三

分作二三

厘下有不可

可過多四

字

僵定救法

原本手拉

直作首拉

直

洗冤錄表

云救得一

人不死便

全得內人

性命此急

救之方所

由錄也

踏肩提髮

擦胸按腹

潤喉吹耳

救法

眼開甦醒

後宋本作

眼開勿苦

勞動

緊用手卷

救法

皂角細辛

救法

附攷○乾隆四十八年五月二十九日浙江富陽縣民何盛榮妻蔣氏自縊解救因不如法捏咽
喉上氣管仍是閉塞不通又不磨擦屈伸手足仍然血脈凝滯延至六月初二日身死

〔救溺死〕

皂角納下
部活人背
擔各救法
壁泥覆救
之法

水溺一宿者尚可救。搗皂角以絲裹納下部內。須更出水即活。或屈死人兩足著人肩。以死人背貼生人背。擔走。吐出水即活。

又法。先打泥壁三堵。置地上。却以死者仰卧其上。更以壁土覆之。止露口眼。自然水氣喻入泥間。其人遂甦。雖身僵氣絕。用此法亦可救。

熱字疑即熱字之說

又法。炒熟砂覆死人面。上下著砂。只留出口。鼻砂冷濕。又換數易即甦。宋本口字下有耳字

又醋半盞灌鼻中。

又絲裹石灰納下部中。水出即活。

又倒懸。以好酒灌鼻中。及下部。

又倒懸。解去衣。去臍中垢。令兩人以筆管吹其耳。

又急解死人衣服。於臍上火百壯。

又撈起時。急急將口撬音開。橫筋一隻。使可出水。以竹管吹其兩耳。碾生半夏末吹其鼻。凡皂角未置管中。吹其穀道。如係夏月。將溺人肚皮橫覆牛背之上。兩邊使人扶住。牽牛緩緩行走。腹中之水自然從口中并大小便流出。再用生薑湯化蘇合丸灌之。或生薑汁灌之。若無牛。以活人覆臥躬腰。今溺人如前肚腹橫覆於活人身上。令活人微微動搖。水亦可出。若一時無牛。兼活人不肯拯救。或鍋一口。將溺人覆於鍋上亦可。如係冬月。急將濕衣解去。為之更換。一面炒鹽用布包臍臍。一面厚鋪被褥。取竈內不著草灰。多多補於被褥之上。令溺人覆臥於上。臍下墊以絲枕一個。仍以草灰

火臍救法
分別冬夏
救法

熱砂覆救
之法
以醋灌鼻
之法
絲裹石灰
倒懸灌鼻
救法

冬月溺水救法又見救凍死條當參看

燒壇覆臍
救法
薰鼻吹竅
救法

傷不透膜
治法
半溫服宋
本作通溫
服

血出不止
治法

將渾身厚蓋之。灰上再加被褥。不可使灰暍於眼內。其撬口啣筋。灌蘇合丸生薑湯。吹耳鼻竅道等事。俟照夏天法。冬天甦醒後。宜少飲溫酒。夏天宜少飲粥湯。按灰性煖而能拔水。凡蠅溺水死者。以灰埋之。少頃即活。此明驗也。

又以酒罈一個。紙片一把。燒放罈內。急以罈口覆臍上。冷即再燒紙片放罈內。覆臍去水即活。又初救起之時。尚有微氣。或胸前尚煖。速令生人脫貼身裏衣。為之更換。抱擔身上。將屍微微倒側之。令其腹內水流出。若水往外流。即有生機。一面用粗紙燈灼。取煙薰其鼻竅。稍薰片時。即用皂角研細吹入鼻竅。但得微有一嚏噴。即可得生。

〔治刀傷〕

凡殺傷不透膜者。乳香沒藥各一皂角子。大研爛。以小便半盞好酒半盞。同煎半溫服。然後用花蕊石散。或烏賊魚骨。或龍骨為末。敷瘡口上即止。昔推官宋瑒定。驗兩處殺傷。氣尚未絕。亟令保甲取葱白熱鍋炒熱。遍敷傷處。繼而呻吟。再易葱白。傷者無痛矣。

花蕊石散

乳香

沒藥

羌活

紫蘇

草烏

蛇含石

童便煨
三次

厚朴

白芷

細辛

降香

當歸

南星

輕粉

蘇木

檀香

龍骨

各二錢

麝香

三分

花蕊石

五錢童便
煨七次

右共研極細。罐收聽用。葱湯洗淨。用此糝之。軟綿紙蓋緊。一日一換。神效。

洗冤錄表云必用
甕瓦刮下必用石

痛不可止
治法

金瘡腸出
治法

箭鏃傷治
法

時漿救法

原本邊沿
下有隨乾
隨加四字
原本已退
下有由白
轉紅由紅

血流不止用千年
石灰或生半夏研
末敷上或用乾麝
和白糖微傷處皆
效

治箭鏃木竹器傷
用艾絨攤成餅子
將火硝細末鋪上
再用大蚌蟬搗成
末鋪火硝上包傷
處一日夜即出

如一時藥不便先
飲童便一碗再將
生大黃細末用香
油或桐油調敷爛
至肌肉者用山野
人家百草霜三錢
輕粉錢半研末調
香油敷之
常門齋即香樟子

又被刀傷血出不止用紫藤香即降香 麝瓦鏢刮下石碾碾細敷之血即止又無癰痕
又刀刀傷痛不可止用雞骨炭擲地上鏢然有聲者與松香明透者等分搗成一塊再多用老韭
菜搗汁拌入陰乾如此拌搗三四遍後為細末收貯上已端午七夕等日製之敷患處痛立止完好
如常

金瘡腸出者用小麥五升水九升煮四升露濾淨汁待極冷令病人臥席上一人含汁嚥其背則腸
漸入嚥時勿令病人知之及多人在旁言語如木入檀席四角輕搖則自入既入者須用麻油潤線
縫繫仍以潤帛繫束慎勿驚動使瘡口復進

被箭鏃傷者用陳醃肉去皮取紅活美好者用其肥細切剉濃將象牙末及人所退爪甲為末共研
極細拌入所剉醃肉內再為勻剉令其合一厚敷箭鏃週圍一飯頃其鏃即自為迸脫

續輯 馬前子一觔枳殼一觔於屋下雨水不及常有人溺之溺缸將前二物放入浸至四十九
日取起長流水淘淨將馬前子用磁鋒刮去面上薄皮將枳殼破開挖去瓢各曬乾切片
用黃土拌炒微焦黑去黃土研極細末用磁瓶裝貯無論跌打手足木石金刀各傷以及湯火
傷並火藥毒箭傷均立效傷愈勿去其灰令其自落並無疤痕凡傷痕已破損見血或已潰爛者
將乾藥敷若傷痕但腫未破者用黃酒調敷若湯火傷泡起未破用麻油調敷已
破仍乾敷傷重者一面急用一錢半沖熱黃酒一梳服之不能飲者作二三次服

救湯火傷

湯瀆受傷急煮水中大蚌置磁盤中將其口向上置無人處候其口自開時豫將冰片三分直當
門齋二三分同研細末以匙挑一二分傾入蚌口內其口即合而蚌內之肉即化為漿然後再入冰
屑少許用雞翎粘掃傷處先從四面邊沿層層掃入痛楚自減如無大蚌小者亦可此急救最驗之
第一方也及其火氣已退將用下蚌殼燒灰存性碾細末入冰屑少許從邊圍掃如無蚌處用冰片
從四面厚起漸及於中亦可漸瘳用水冰片向原本作如其地有藏
水即取水一小塊從四面厚起

漸法塗上
不即乾則
防其腐處
潰害二十
字

禁用水
救法
油粉調塗
救法
陳醫寬塗
救法
劉寄奴救
法
大黃救法

又方用大麥以淨
砂鍋炒之漆黑為
度取出隔紙攤土
上出火氣研末爛
者乾擦未破者以
香油或生桐油調
擦

腎內小子如菜豆
大

又方用大麥以淨
砂鍋炒之漆黑為
度取出隔紙攤土
上出火氣研末爛
者乾擦未破者以
香油或生桐油調
擦

又方用大麥以淨
砂鍋炒之漆黑為
度取出隔紙攤土
上出火氣研末爛
者乾擦未破者以
香油或生桐油調
擦

又方用大麥以淨
砂鍋炒之漆黑為
度取出隔紙攤土
上出火氣研末爛
者乾擦未破者以
香油或生桐油調
擦

又方用大麥以淨
砂鍋炒之漆黑為
度取出隔紙攤土
上出火氣研末爛
者乾擦未破者以
香油或生桐油調
擦

又方用大麥以淨
砂鍋炒之漆黑為
度取出隔紙攤土
上出火氣研末爛
者乾擦未破者以
香油或生桐油調
擦

又方用大麥以淨
砂鍋炒之漆黑為
度取出隔紙攤土
上出火氣研末爛
者乾擦未破者以
香油或生桐油調
擦

又方用大麥以淨
砂鍋炒之漆黑為
度取出隔紙攤土
上出火氣研末爛
者乾擦未破者以
香油或生桐油調
擦

又方用大麥以淨
砂鍋炒之漆黑為
度取出隔紙攤土
上出火氣研末爛
者乾擦未破者以
香油或生桐油調
擦

又方用大麥以淨
砂鍋炒之漆黑為
度取出隔紙攤土
上出火氣研末爛
者乾擦未破者以
香油或生桐油調
擦

又方用大麥以淨
砂鍋炒之漆黑為
度取出隔紙攤土
上出火氣研末爛
者乾擦未破者以
香油或生桐油調
擦

又方用大麥以淨
砂鍋炒之漆黑為
度取出隔紙攤土
上出火氣研末爛
者乾擦未破者以
香油或生桐油調
擦

又方用大麥以淨
砂鍋炒之漆黑為
度取出隔紙攤土
上出火氣研末爛
者乾擦未破者以
香油或生桐油調
擦

凡被湯火切勿以冷水冷物及井下泥尿泥激之其熱氣遇冷則入之愈深輕者變縮重則直逼火毒攻心而速之死矣

一法用上好杭粉為細末同婦女所用好頭油調塗之如無或柏子油亦可

又法用多年陳醬寬塗之但愈後有黑瘡

又用劉寄奴為末先以糯米漿雞翎掃傷處後糝藥末並不痛亦並無痕大約湯火者急以鹽末

糝之護內不壞然後用藥敷之至妙

又用生大黃以米醋調敷二日即愈

原本湯瀝受傷條從邊圍端下尚有蟻蚌漿未乾時用油絹袋勻節傷處或竟將蚌漿調勻雞翎敷上外以舊絹護之更加揉攘粗細數層繫束令緊沁去傷中毒水如覺稍痛仍用蚌漿陰入內煩無不立愈七十六字

救中喝

喝死於行路上旋以刀器掘開一穴入水搗之取爛漿以灌死者即活

中喝不省人事者與冷水喫即死但且急取甕間微熱灰壅之復以稍熱湯蘸手巾尉腹脇間良久甦醒不宜便與冷物喫

暑月熱倒急扶在陰涼處切不可與冷水飲當以布巾衣服等蘸熱湯覆臍下及氣海間續以湯淋

布帛上令徹臍腹但煖則漸甦也如倉卒無湯處掘道上熱土於臍端以多為佳冷則頻換後與解

暑毒藥或道塗無湯處即掬熱土於臍上仍攤開作窩子令眾人旋溺於其中以代熱湯亦可取效

凡中暑如已迷悶嚼大蒜一大瓣冷水送下如不能嚼即用水研濯之立醒路中倉卒無水渴甚急

嚼生葱二十許和津同嚥可抵飲水二升

早年暑天人多喝死

中暑暴死以胡麻一升炒黑攤冷為末新汲水調下

〔救凍死〕

凍死四肢直口噤有微氣者用大鍋炒灰令煖袋盛熨心上冷即換之候目開以溫酒及清粥稍稍與之若不先溫其心便以水炙則冷氣與火爭必死

又用氈或臺薦捲之以索繫定放在平穩處令二人相對踏令滾轉往來如扞氈法候四肢溫即活

并宋本作行下注
古早切摩展衣也

冬月溺水之人及被凍極之人雖纖毫人事不知但胸前有微溫皆可救倘或微笑必為急掩其口鼻如不掩則笑而不止不可救矣切不可驟令近火但一見火則必大笑不可救藥

凡凍死已經救活者宜用生薑

帶皮搗碎

陳皮

搗碎

用水三碗煎一碗溫服

原本生薑陳皮各一

兩一椀作一椀半

〔救魔〕

魔死不得用燈火照并不得近前急喚但痛咬其足跟及足大拇趾頻頻呼其名及唾其面再灌以薑湯必活

魔不醒者移動此下臥處徐徐喚之即醒夜間魔者原有燈即存燈無燈者不可用燈照

又用筆管吹兩耳及取病人頭髮二十七莖撚繩刺入鼻中又鹽湯灌之

又研韭菜汁半盞灌鼻中冬月根亦可得嚏

又火兩足大拇趾懸毛中三七壯

懸毛乃腳趾向上生毛處

又方皂角末如豆許吹兩鼻內得嚏則氣通三四日者尚可救

如豆許宋本作如豆大許

魔死者倘身未冷急以酒調蘇合丸灌之即活

殺卒死者亦用見角法

此與覺死均不可
火照但惟痛咬脚
跟即甦

此與中藥毒及河
純毒均須急取熱
鴨血灌救下喉即
活

凡猝中惡死用馬
糞一枚絞汁灌之
乾者水者亦可

〔救中惡〕

凡中惡客忤猝死者。或先病及睡卧間忽然而絕。皆是中惡也。用韭黃心於男左女右鼻內刺入六寸。令自開。血出即活。

視上唇內沿有如粟米粒。以針挑破。

又用兒角。或生半夏末。如大豆許。吹入兩鼻。

又用羊屎燒煙薰鼻中。

又緣浸好醋半盞。手按令汁入鼻中。及捉其兩手。勿令驚。須臾即活。

又灸臍中百壯。鼻內吹兒角末。或研韭汁灌耳中。

又用生薑蒲搗取汁一盞。灌之立效。

〔救藥斃〕

驚怖死者。以溫酒一兩盃灌之。即活。

〔救撲打碎死〕

五絕及撲打碎死等。但須心頭溫煖。雖經日亦可救。先將死人盤屈在地上。如僧打坐狀。令一人將死人頭髮控放低。用生半夏末。以竹筒或紙筒筆管。吹在鼻內。如活。即以生薑自然汁灌之。可解半

夏毒。五絕者謂產魅。盛魔溺治法。單用半夏一味。生薑自然汁。用生薑搗爛取汁。不用水者是。

卒暴墮墮。及鬼魔死。若肉未冷。急以酒調蘇合香丸灌入口。若下喉去。可活。

〔救跌毆傷〕

即活
凡跌損傷者。用男
女尿桶入中白凍

凡跌毆傷重之人。口耳出血。一時昏暈。但視面色尚有生氣。身體尚為鬆軟。則皆可救。但不可多人

紅投好醋七次研
末已死者勿移動
將藥末二錢好酒
送下吐出惡血即
可殺矣但移動者
不治
又方用活蟹搗爛
熱酒沖服極醉一
夜即安

原書急令
親人下有
或密及三
字 先奉
其兩手兩
足作先奉
其兩足束
少頃二字
作俟有微
氣洩氣下
有扶坐少
頃然後緩
呼之九字
原書孟上
有奉字無
下得去喉
便好之句
原書洩氣
下有推額
備淨補同
之七字
原書令睡
下作如前
齋飲之即
服至三四
齋亦不妨
至所下盡
為真即停
止

環繞嘈雜驚慌致令驚魂不復急令親人呼而扶之坐於地上先奉其兩手兩足緊為抱定少頃再
輕移於相呼之人懷中以膝抵其穀道不令洩氣若稍有知覺即移於素所寢處將室內窗櫺遮閉
令暗仍奉手足緊抱不可令卧急取童便乘熱灌之馬溺更妙如一時不可得即入溺亦可要其
頭尾但須未食葱蒜而清利者強灌一二盃下得喉去便好一面用四物湯照原方加三四倍再入
桃仁去皮尖及好紅花各一兩全當歸及南山植搗碎各二兩生大黃二兩童便一大鍾如係夏
加黃連四五分多用急流水即在旁用急火煎半熱傾入碗內承於傷者鼻下使藥氣透入腹內則
不致入口惡逆乘熱用小鍾強令頓服如其不受則姑緩少刻又進只要陸續灌盡不可使卧服藥
之後其穀道尤須用力抵緊不可令其洩氣如藥已行動非至眩暈不可即解恐其氣從下洩以致不
救也必候腹中動而有聲上下往來數遍急不能待方可翼之以解所下盡屬淤塞毒已解半方可
令睡至所下盡為真即停止前藥否則再用一二劑亦不得然後次第調理不可輕用補藥

四物湯

當歸一錢

川芎七分

熟地黃三錢

炒白芍一錢

〔治蛇蠱傷〕

毒蛇能斃人惟急以利刃割去所嚙之死肉可以漸解

蛇傷蟲咬倉卒無藥以太藍汁一椀雄黃末二錢調勻點在所傷處併令細細服其汁如無藍以靛
花青黛代之

蝨蝨傷人其毒內攻即死立將傷處用繩絹紮定勿使毒入心腹令人口含米醋或燒酒吮傷以吸

拔其毒隨吮隨吐隨換酒醋再吮俟紅淡腫消為度吮者不可誤嚥中毒又急飲麻油一二盞護心

解毒以薑末敷之

之則以水代

被螫咬死用香白芷一味以參冬湯調服急以水代之飲之即活

又方用五靈脂一兩雄黃五錢以酒調灌每服二錢再以滓塗咬處

續輯○蛇咬白芷末一兩煎服外用白芷末加膽礬少許日搽之蓋白芷能辟

土虺蛇咬急拔去頭心紅髮一根用何首烏搗汁沖酒服其渣敷咬處疼立止○解毒蛋方雞

蛋三個敲破頭合在蛇咬之處聽蛋內咯咯有聲變黑色再換一個合之俟變黃白色不甚黑

再換一個合之自愈凡蛇

蜈蚣咬傷俱治極妙仙方

蜈蚣咬用銀硃雞蛋清調敷又方

蜈蚣咬用銀硃雞蛋清調敷又方

蜈蚣咬用銀硃雞蛋清調敷又方

蜈蚣咬用銀硃雞蛋清調敷又方

蜈蚣咬用銀硃雞蛋清調敷又方

蜈蚣咬用銀硃雞蛋清調敷又方

蜈蚣咬用銀硃雞蛋清調敷又方

蜈蚣咬用銀硃雞蛋清調敷又方

蜈蚣咬用銀硃雞蛋清調敷又方

蜈蚣咬用銀硃雞蛋清調敷又方

蜈蚣咬用銀硃雞蛋清調敷又方

蜈蚣咬用銀硃雞蛋清調敷又方

治癩狗傷

飛毒未發用斑貓七個去頭足翅淨用雞蛋一枚同蒸去斑貓淡食雞蛋於小便內取下血塊痛脹

不解則血塊未淨仍再食血塊盡乃止

又方用斑貓同米炒俟米老黃去斑貓將米研末蒸雞蛋食如前法血塊下盡為度

又法受咬後立至溪河將傷處洗擠血淨盡多飲生薑汁則毒可解仍封紮瘡口勿使受風

殺服毒中毒方

解砒毒

砒霜服下未久者取雞蛋二十個打入碗內攪勻入明礬末三錢灌之吐則再灌吐盡便愈但服

久砒已入腹則不能吐出急用黑鉛四兩重一塊用井水於石上磨出黑汁旋磨旋灌盡則愈即先

吐出之後亦宜再用鉛水服之以盡餘毒方無後患

中砒霜毒急取熱鴨血灌之立解又薑青灌之亦解

又方以豆豉濃煎湯飲之可解

又方用防風四兩涼水泡淫橘汁一大碗灌下即解愈

凡中砒毒心腹絞痛欲吐不吐面青肢冷用防風四兩煎湯飲之即解又方桐樹葉爛搗沖生白酒飲之即愈又方楊梅樹皮煎湯二三碗飲之即愈又方用紫蝴蝶花

原書飲之
下有豇豆
亦可四字

根搗汁一椀灌下
立愈

又方用生桐油灌
之得吐即解洗冤
錄表云甘草汁藍
汁解良管毒亦用
之
解
冷粥一椀喫下即

莽草以黑豆汁洗
其根即毒

又用甘草汁同藍汁飲之即愈

又用熟豆腐漿灌之亦愈

〔解巴豆毒〕

中巴豆毒痢不止以大豆一升煮汁飲之

又巴豆畏大黃黃連蘆薈孤獨黎蘆各煎冷服皆能止泄

又用巴蕉葉搗自然汁服之即止

〔解鼠莽毒〕

黑豆汁可解○又方用枯蓮房殼帶薈梗陰乾咬咀煎水二三椀灌之如無用何葉中心蒂或用藕
節煎湯一椀溫冷灌之毒即散

〔解良岩毒〕

用甘草汁或藍青汁飲之即愈若服藥即劇

〔解苦杏仁毒〕

用杏樹皮煎湯飲之雖迷亂將死者亦可救

〔解斑貓元青毒〕

用豬膏大豆汁或鹽藍汁服之或用鹽湯煮豬膏巴豆飲之又或用大小黑豆汁服之並瘡用肥皂
水灌下再以鵝翎絞喉數次令吐即活

又方用生雞鴨卵開孔灌入口中連灌五六枚得吐即活儻閉以箸挾開灌入

〔治菌毒〕

宋本可救
下有少遲
無可救者
六字

服酒垂危
用白洋糖
四兩湯調
灌下即解

凡菌草如夜中有
光者欲爛無蟲者
煮不熟者煮汁照
人無影者上有毛
下無紋者仰老亦
色者俱毒殺人飲
以地漿及真汁可
解
中笑菌毒飲冬瓜
蔓汁解之或苦菜
白礬勺新汲水併
解釣吻毒亦用此
法
治菌毒亦用此法

解服酒方用黃豆
入水搗汁灌之或
生羊血灌之立愈
或用生豆腐漿灌

四明溫台間山谷多摩固然種類不一食之間有中毒往往至殺人蓋蛇虺毒氣所薰蒸也有僧教掘地以冷水攪之令濁少頃取飲皆得全活其方見自本草楓樹菌食之笑不山俗言笑菌居山間不可不知此法也

〔解胡蔓草毒〕

中胡蔓草毒將真汁灌之可解或飲浸草毒水百數潰血急取抱卵不出之雞蛋研細和麻油開口灌之吐出可救宋本將字下有火字或飲句作或以嫩葉心浸水涓滴入口

〔解毒草〕

誤食毒草至吐即採生金銀花嚼之可解

〔解草烏頭毒〕

用飴糖黑豆冷水解之

〔解射罔毒〕

用甘草汁或小白豆葉浮萍齊尼汁冷水解之齊尼又名甜桔梗河南人呼為舌葉沙參能解百藥毒

〔解輕粉毒〕

用黑鉛五觔打壺一把盛燒酒十五觔納土伏苓半觔乳香三錢封固重湯煮一日夜埋土中出火毒每日早晚任飲數杯潮時以及盆接之當有粉出服至筋骨不痛乃已冰片毒飲以新汲冷水

可解

〔救服酒〕

服鹽酒將常用擦桌布洗水灌之使吐即解

又食金銀
器者用陳
大麥去芒
刺炒研作
粉黃糖少
許日食三
次每服一
蓋四日即
解下

斷腸草即
野葛一名
鉤吻江西
謂之黃藤
廣人呼為
胡蔓草亦
呼大茶葉
中其毒者
用薤菜汁
灌之即解

之或再生大黃一
兩搗碎再用生豆
腐漿一椀同搗數
十下服後瀉數遍
俱效

本草載荷葉松葉
松脂穀精脂萱草
瓦松夏枯草水浸
姑雁來紅馬蹄香
煎湯服皆解

薺兒又名甜桔梗
河南人呼為香葉
沙參
飲酒中毒經日不
醒者用黑豆一升
煮取汁溫服一卜
杯不過三次即愈

〔治吞金〕

中黃金毒者食鴈鵝肉中白銀毒者以黃連甘草解之又洗金以鹽駱駝驢馬脂餘甘子皆能柔金
羊脂穫子皆能柔銀吞金銀入腹中當服食前品柔則易出
又服金者用真輕粉細研水調下能令金從大便出

〔解藥盡金石毒〕

治一切藥毒盡金石毒用石蟹以熱水磨服

〔治水銀入耳〕

以黃金枕耳邊自出若水銀入肉令人筋攣以金物磨之水銀乃出蝕金其病即瘥

〔解煤毒〕

飲冷水可解或蘿蔔搗汁灌口鼻移向風吹便能醒

〔解飲饌毒〕

凡中飲饌毒不知何物即煎甘草薺兒湯飲之便治

〔附解斷腸草方〕

先用鴨蛋三個將服毒人扶正撬開牙關剝開蛋殼成個灌下三個待蛋入胃
裏住毒草次用猪骨溶化溫和灌下一飯碗後又用黃豆一小升爭雞一隻不
論雌雄連毛帶腸同豆搗爛用清水一飯碗泡入雞內布袋濾去渣取汁灌下其毒即吐如不
吐即用羊齒探喉或用女人頭髮髮子探喉搗銅錫亦可毒吐即愈其毒在胃者可治入腸者難
治

增救吞鴉片煙法

凡服鴉片煙者輕則心中發躁坐用活鴉血飲日見救活多人或鴉血或
糞汁或醬油或涼水多多灌之吐出鴉片煙即愈或用白礬雄黃研末清水
調灌亦效又廣東有草名鮮崩草者又名為塊莖草搗絞自然汁灌之尤妙若服多毒重則
身冷氣絕似乎已死若肢體柔軟則臟腑筋絡之氣尚在流通寒未死也乃鴉片烈性醉迷之
故耳將其人放在潮濕陰地用篋撬開牙齒又以竹篴一枝橫放口內令口常開以冷水頻頻
灌之有金汁灌之更妙外以冷水在胸前摩盪每日夜十餘次又用冷水一盆將頭髮散放水