

2017

执业药师资格考试

押题秘笈

中药学综合知识与技能

免费赠送

习题精讲班网络课程

阿虎医考命题研究中心 组编

三套卷子 题题解析



上海科学技术出版社
Shanghai Scientific & Technical Publishers

全国百佳图书出版单位
Top 100 Publishing Houses in China



阿虎医考
AHUyikao.com

执业药师资格考试 押题秘笈

中药学综合知识与技能

模 拟 试 卷 一

阿虎医考命题研究中心 组编

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

2017 执业药师资格考试押题秘笈. 中药学综合知识与技能/阿虎医考命题研究中心组编. —上海:上海科学技术出版社,2017. 1

ISBN 978 - 7 - 5478 - 3381 - 0

I. ①2… II. ①阿… III. ①中药学—资格考试—习题集 IV. ①R192.8 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 292506 号

授权码粘贴处

2017 执业药师资格考试押题秘笈·中药学综合知识与技能
阿虎医考命题研究中心 组编

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海科学技术出版社

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行
200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co
印刷

开本 787×1092 1/16 印张 6.75

字数: 106 千字

2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5478 - 3381 - 0/R · 1285

定价: 25.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,
请向工厂联系调换

执业药师资格考试

中药学综合知识与技能

姓 名：_____

准考证号：_____

一、最佳选择题（共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 人体内外环境的统一性，中医学称为
 - A. 辨证论治
 - B. 整体观念
 - C. 恒动观念
 - D. 阴阳互化
 - E. 中和思想
2. 一日一夜中，属于“阴中之阳”的时间是
 - A. 上午
 - B. 下午
 - C. 前半夜
 - D. 中午
 - E. 后半夜
3. 与气的生成无密切关系的脏腑是
 - A. 心
 - B. 肺
 - C. 胃
 - D. 脾
 - E. 肾
4. 具有“溢奇邪”“通荣卫”作用的是
 - A. 浮络
 - B. 孙络
 - C. 别络
 - D. 经筋
 - E. 奇经
5. 根据中医体质学说偏阴质多见
 - A. 畏寒
 - B. 舌红
 - C. 畏热
 - D. 喜动
 - E. 急躁
6. 下面哪项不是引起疾病的常见病因
 - A. 七情内伤
 - B. 疠气
 - C. 六淫
 - D. 六气
 - E. 饮食不节
7. 诊断表证的重要依据是
 - A. 寒热往来
 - B. 但热不寒
 - C. 恶寒发热
 - D. 畏寒喜暖
 - E. 但寒不热
8. 某男，57 岁，近日出现发热，恶寒较甚，无汗，头痛鼻塞，身楚倦怠，咳嗽，咳痰无力，舌淡，苔

- E. 龙胆泻肝丸
15. 经期延后,经量偏少,经色黯红,或有血块,小腹胀痛,精神抑郁,胸闷不舒,舌苔正常,脉弦。治宜选用的方剂是
- A. 固阴煎
B. 逍遥散
C. 丹栀逍遥散
D. 膈下逐瘀汤
E. 归肾丸合四物汤
16. 咽部疼痛,逐渐加重,吞咽或咳嗽时疼痛加重,并伴见发热恶寒,头痛,体倦,关节疼痛,咳嗽,痰涎多,舌红苔黄,脉浮数。治宜选用的中成药是
- A. 藿胆片
B. 清咽丸
C. 珠黄散
D. 复方鱼腥草片
E. 铁笛丸
17. 能清热解毒,理气通淋,用于前列腺炎的藏药方剂是
- A. 六味安消丸
B. 五味岩精丸
C. 大月晶丸
D. 十一味金色丸
E. 十三味冥丸
18. 三根中属于阳性的是
- A. 赫依
B. 希日
C. 巴达干
D. 血
E. 黄水
19. 尿比重正常参考值为
- A. 1.003~1.030
B. 1.002
C. 1.015~1.025
D. >1.025
E. 1.002~1.004
20. 患者大便呈米泔水样,最有可能是
- A. 急性胃肠炎
B. 小肠炎症
C. 消化不良
D. 霍乱
E. 慢性菌痢
21. 我国第一本证候学专著是
- A. 《黄帝内经》
B. 《伤寒论》
C. 《金匮要略方论》
D. 《巢氏诸病源候论》

- E. 疏肝丸
29. 中成药和西药联合用药,应相隔服用
- A. 半小时 B. 一小时
- C. 两小时 D. 三小时
- E. 四小时
30. 液体制剂常见的变质现象是
- A. 潮解 B. 沉淀
- C. 虫蛀 D. 风化
- E. 霉变
31. 中药贮存环境的相对湿度应控制在
- A. 15%~45% B. 25%~55%
- C. 30%~60% D. 35%~75%
- E. 45%~85%
32. 下列不属于合理用药基本原则的是
- A. 安全 B. 有效
- C. 无毒 D. 简便
- E. 经济
33. 治疗高血压病证属肝肾阴虚、风阳上扰者,脑立清片宜与下列药物同用的是
- A. 人参汤 B. 六君子汤
- C. 小青龙汤 D. 六味地黄丸
- E. 小柴胡汤
34. 磺胺类药物不宜联用的中药有
- A. 鞣质类 B. 淀粉类
- C. 色素类 D. 黏液类
- E. 油脂类
35. 下列中成药含咖啡因的是
- A. 金羚感冒片 B. 维C银翘片
- C. 感冒灵胶囊 D. 强力感冒片
- E. 感冒清片
36. 下列不属于含吡啶美辛中成药常见不良反应的是

[43-44]

- | | |
|--------|--------|
| A. 实寒证 | B. 实热证 |
| C. 虚寒证 | D. 虚热证 |
| E. 亡阳证 | |

43. 阴偏盛病机表现的临床症候是

44. 阴偏衰病机表现的临床症候是

[45-47]

- | | |
|-------|-------|
| A. 得神 | B. 少神 |
| C. 失神 | D. 假神 |
| E. 神乱 | |

45. 表情淡漠,寡言少语,闷闷不乐,继则精神发呆,哭笑无常属于

46. 目光晦暗,精神萎靡,反应迟钝,甚则循衣摸床属于

47. 面色原本十分晦暗,忽然两颧发红如妆属于

[48-49]

- | | |
|---------|---------|
| A. 心脾有热 | B. 脾肾阳虚 |
| C. 热极生风 | D. 气血虚极 |
| E. 寒凝筋脉 | |

48. 吐弄舌多属

49. 痿软舌多属

[50-52]

- | | |
|--------------|--------------|
| A. 语无伦次,笑骂不定 | B. 言语粗鲁,狂妄叫骂 |
| C. 语言重复,时断时续 | D. 语言错乱,错后自知 |
| E. 喃喃自语,见人便止 | |

50. 患者狂证时,可表现为

51. 患者癫证时,可表现为

52. 患者郑声时,可表现为

[53-55]

- | | |
|----------|------------|
| A. 通心络胶囊 | B. 血府逐瘀口服液 |
| C. 麝香保心丸 | D. 丹菱片 |
| E. 金匱肾气丸 | |

53. 治疗胸痹气滞血瘀证,宜选用的中成药是

54. 治疗胸痹痰瘀闭阻证,宜选用的中成药是

55. 治疗胸痹寒凝心脉证,宜选用的中成药是

[56-58]

- A. 面红身热,口臭,小便短赤,苔黄腻,脉滑数
- B. 暖气频作,胸胁痞满,腹胀,苔薄腻,脉弦
- C. 神疲气短,临厕努挣乏力,大便不燥,脉虚
- D. 面色无华,头晕目眩,心悸,口干,舌淡,脉细涩
- E. 面色㿔白,畏寒喜暖,小便清长,舌苔白,脉沉迟

56. 热结肠胃便秘的症状特点是

57. 津亏肠燥便秘的症状特点是

58. 阳虚寒凝便秘的症状特点是

[59-61]

- | | |
|--------------|---------|
| A. 防风汤 | B. 乌头汤 |
| C. 桃红饮合独活寄生汤 | D. 薏苡仁汤 |
| E. 金匱肾气丸 | |

59. 治疗痛痹,宜选用的方剂是

60. 治疗着痹,宜选用的方剂是

61. 治疗尪痹,宜选用的方剂是

[62-63]

- | | |
|-------------|----------|
| A. 内补丸 | B. 固冲汤 |
| C. 调肝汤 | D. 逐瘀止崩汤 |
| E. 圣愈汤合血安胶囊 | |

62. 治疗崩漏脾不统血证,宜选用的方剂是

63. 治疗崩漏气血两虚证,宜选用的方剂是

[64-65]

A. 知母、贝母

B. 三棱、白术

C. 生地、熟地

D. 三棱、莪术

E. 蒲公英、紫花地丁

64. 处方写“棱术”调剂应付

65. 处方写“二地丁”调剂应付

[66-67]

A. 甘草

B. 附子

C. 硫黄

D. 牵牛子

E. 五灵脂

66. 与天花粉相反的是

67. 与巴豆相反的是

[68-70]

A. 蜂蜜

B. 三七

C. 阿胶

D. 鳖甲

E. 灶心土

68. 烊化的中药是

69. 煎汤代水的中药是

70. 兑服的中药是

[71-73]

A. 0.015~0.03 g

B. 0.03~0.06 g

C. 0.05~0.1 g

D. 3~6 g

E. 3~15 g

71. 斑蝥的内服用量是

72. 生附子的内服用量是

73. 蟾酥的内服用量是

[74-75]

A. 大黄

B. 艾叶

C. 商陆

D. 附子

E. 巴豆

74. 小毒中药是

75. 大毒中药是

[76-77]

A. 泽泻

B. 当归

C. 硼砂

D. 芒硝

E. 白矾

76. 应贮于通风干燥处的是

77. 应贮于阴凉干燥处的是

[78-79]

A. 20%~25%

B. 25%~30%

C. 30%~50%

D. 50%~100%

E. 100%~120%

78. 生石灰的吸潮率可达

79. 无水氯化钙的吸潮率可达

[80-81]

A. 洋金花与强心苷类

B. 甘草与呋喃唑酮

C. 甘草与氢化可的松

D. 石膏与四环素

E. 山楂与磺胺类药物

80. 中西药合用协同增效的药组是

81. 中西药合用降低西药毒副反应的药组是

[82-84]

- | | |
|------------|-------------|
| A. 陈皮与利福平 | B. 乌贝散与头孢拉定 |
| C. 乙醇与二甲双胍 | D. 麻黄与异烟肼 |
| E. 大黄与红霉素 | |

82. 能减少药物排泄的中西药联用药组是

83. 能发生酶抑反应的中西药联用药组是

84. 影响药物透过生物膜吸收的中西药联用药组是

[85-87]

- | | |
|--------|--------|
| A. 大枣 | B. 黄芪 |
| C. 黄精 | D. 菟丝子 |
| E. 白扁豆 | |

85. 儿童平时易感冒,多汗可服

86. 儿童消瘦、厌食、大便稀溏可服

87. 儿童发育迟缓、尿频可服

[88-90]

- A. 面部肌肉紧张、痉挛、角弓反张、惊厥
- B. 四肢抽搐、牙关紧闭、心律失常、肠鸣音亢进
- C. 大汗、头晕目眩、口唇黏膜糜烂、脱发
- D. 吐血、咯血、便血、尿血、黄疸
- E. 口中有金属味、口腔黏膜充血、牙龈肿胀、溃疡、少尿

88. 过量服用含朱砂的中成药会引起

89. 过量服用含雄黄的中成药会引起

90. 过量服用含乌头的中成药会引起

三、综合分析选择题(共20题,每题1分。题目分为若干组,每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

[91-92]

某男,35岁。眩晕耳鸣,胁痛目涩,面部烘热,五心烦热,潮热盗汗,口咽干燥,手足蠕动,

舌红少津,脉弦细数。

91. 该患者五心烦热,潮热盗汗提示属于

- | | |
|--------|--------|
| A. 虚寒证 | B. 实热证 |
| C. 虚热证 | D. 瘀血证 |
| E. 痰湿证 | |

92. 该患者胁痛目涩提示病位相关之脏是

- | | |
|------|------|
| A. 肝 | B. 心 |
| C. 脾 | D. 肺 |
| E. 肾 | |

[93-95]

某男,65岁。平素久咳不已,气短心悸,面色㿔白,甚者可见口唇青紫。舌淡,脉细弱。

93. 中医辨证是

- | | |
|---------|---------|
| A. 肾不纳气 | B. 肾肺两虚 |
| C. 心肾不交 | D. 心肺两虚 |
| E. 肺脾两虚 | |

94. 辨证要点是既有心悸咳喘,又兼见

- | | |
|-------|-------|
| A. 气虚 | B. 气滞 |
| C. 血虚 | D. 阴虚 |
| E. 阳虚 | |

95. 根据八纲辨证,该证属于

- | | |
|-------|-------|
| A. 表证 | B. 阴证 |
| C. 热证 | D. 虚证 |
| E. 阳证 | |

[96-99]

某女,40岁。今日头痛且胀,甚则头痛如裂,发热或恶风,口渴欲饮,面红目赤,或便秘溲黄。舌红,苔黄,脉浮数,经诊断为头痛。

96. 中医辨证是

- | | |
|---------|---------|
| A. 风寒头痛 | B. 风热头痛 |
|---------|---------|

- C. 肝阳上亢
D. 瘀血阻络
E. 气血亏虚
97. 应采用的中医治法是
A. 祛瘀通络
B. 平肝潜阳
C. 疏散风热
D. 祛风散寒
E. 益气养血
98. 治疗宜选用的方剂是
A. 桑菊饮
B. 羚角钩藤汤
C. 通窍活血汤
D. 川芎茶调散
E. 八珍汤
99. 治疗应选用的中成药是
A. 都梁丸
B. 脑立清丸
C. 正天丸
D. 归脾丸
E. 清眩丸

[100-103]

某男,56岁。肛内肿物脱出,甚至嵌顿,肛管紧缩,坠胀疼痛,肛缘有血栓,水肿,触痛明显。舌质暗红,苔白,脉弦细涩。

100. 中医诊断是
A. 痹症
B. 虚劳
C. 内痔
D. 外痔
E. 郁证
101. 中医辨证是
A. 肠风下血
B. 湿热下注
C. 气滞血瘀
D. 脾虚气陷
E. 脾不统血
102. 治疗宜选用的方剂是
A. 凉血地黄汤
B. 止痛如神汤
C. 脏连丸
D. 补中益气汤
E. 归脾丸