

易经简注編

9

醫方易簡新編卷四目錄

症瘕癰中寒中暑等症急救解毒附

黑痧

烏痧脹
陰陽絞腸痧

痧症垂危尿屎已出

中暑

中風試生死

又方

痧脹諸忌

一切傷暑

伏暑發熱

太陽中暎

陽黃痧症

陰黃痧症

膽黃疸痧

穀疽

黃疸

酒疽

血症黃腫

食痧黃病

熱毒便結

婦女黃疽

喘滿黃疽

腹脹黃腫

黑疽危症

卒暴諸病

傷寒瘟疫

食茶葉面黃

黃疽變黑

瘟病食勞

陽毒發狂

瘧病頭痛

時氣欲死

天行時疫

時氣煩悶

天行發斑

避疫癘法

天行熱病

邪惡不染

時行熱毒

蝦蟆瘧

大頭瘧

黃胖病

瘟疫傷寒時症

狂走傷寒瘧症

霧露瘴氣

預辟瘴癘

山嵐瘴氣

辟瘧丹

除瘟救苦丹

痧症起生丸

痧疫瘴癘苦提丸

烏痧脹又方

陰陽痧症

痧張

弔筋弔腳痧

避弔痧預服可免

絞腸痧痛難忍

呂祖治疫方

大頭蝦蟆瘧

辟禳瘧疫

除疫救苦丹

辟瘧燒丹

又方

辟疫傳染

時行不染

時疫大行

入病家不染疫

解瘧丹

六合定中丸

痧脹第一方

白痧藥秘方

頭目痧脹點藥

又痧藥方

中暑不省

暑風入臟

解酷暑

消暑止渴

盛夏熱症

熱死

絞腸痧心腹痛

冬月中暑

中暑悶幾欲絕

霍亂

霍亂吐瀉垂危

暑月脹滿欲作霍亂

霍亂吐瀉轉筋

乾霍亂

羊毛痧

霍亂轉筋

霍亂吐瀉

轉筋垂危

乾霍亂又方

霍亂神效方

反筋腹瀉

絞腸霍亂

斑痧

風寒痧症

陰暑

瘡疾仙方

斷瘡第一良方

止瘡方

斷瘡神方

一兩金

熱瘡不寒

瘡疾渴甚

老瘡勞瘍

治瘡奇方

三陰瘡

中風尸厥

中風不省人事

中風口喎

中風口噤

急中風口閉涎壅

中風失音

中風仆地

七味無價仙方

省風湯

導痰湯

癇症

癇病神方

風痰癇病

羊兒瘋

傷寒諸症

發散傷寒

傷寒結胸停食

陰症傷寒
傷寒狂走

時疫傷寒狂癲

喉管傷寒

吐法

吐除痰積

發汗方

罨傷寒結胸法

薑熨法

傷寒

感冒

神白散

天中藥茶

解毒辟瘟丹

菩提萬應丸

寸金丹

太乙紫金錠

時行瘟疫瘴氣

疫病初起

天行時氣

時行瘧疾後怪症

休瘧飲

寒熱怪症

瘧後怪症

截瘧

陰毒傷寒

傷寒後怪症

一切傷寒

瘧疾不已

天行發斑

夾色傷暑

傷寒夾色

夾色傷寒

傷寒妙方

傷寒漏底

夾色傷寒

夾食傷寒

傷寒發狂

傷寒發黃

風寒溼痛

急救解毒附

救縊死法

又方

官桂湯方

通關散方

救溺死法

又方

又方

又法

又方

又法

又方

救驚癥

又法

又法

又方

救服鹽滷

又方

救煤毒暈倒

救煙火薰死

救客忤中惡

救蠱毒及金蠶毒

救服砒毒

救男婦尸厥

又方

救中水銀毒

救中鉛粉毒

救誤吞鐵釘

救中一切藥毒及飲毒 救誤吞金銀

又方

救誤食銀硝

救誤吞銅器

救誤吞鐵物

又方

救誤吞竹木屑及芒刺 救鐵針入喉

救中巴豆毒

救中雄黃毒

救誤服一切草毒

救誤服諸草藥毒閉口椒毒斷腸草毒

救誤吞鐵骨等物

救誤吞<sub>一
切
鐵
器</sub>皆治歌方 救中悶香蒙汗毒

救中麵毒

救中鈎吻毒 救中藥毒鳩毒

救中諸藥毒

救中飲食毒 救中野草靈芝毒

又方

救中六畜肉毒

救中各肉自死毒

救中牛馬肉毒

救中瘧牛肉毒

救中瘧馬肉毒

救中鱠魚肉毒

救中河鮑魚毒

又方

救中蟹毒

救中諸魚毒

救中仙鶴血毒

救蝎蟹毒

救中園魚毒

救食鷄蛋悶絕

救食鴨蛋不消

救服斑蝥毒

救自服諸毒

救中酒毒

救中燒酒醉死

又方

救中生鴉片毒

救中白藥毒

劣馬咬傷方

狗咬傷

壁鏡毒人方

蜈蚣咬毒

蝎刺螫人

活蟻入腹

蜈吞銅釵

諸物刺喉

雜物入肉

解中百毒

解中蠱毒

中蠭吐血

中蠭下血

中百藥毒

中丹藥毒

中諸菜毒

誤中瓜毒

中野菌毒

中柑毒

中梨毒

中馬肉毒

中馬肝毒

中狗肉毒

中豬肉毒

中鴨肉毒

解砒石毒

誤食桐油

中瘴氣

中邪氣

中飛絲毒

生漆惹人

尸疰中惡

惡症腹痛

暗風猝倒

水溺猝死

人落水死

墮水凍死

中挑生毒

飲酒醉死

解硫磺毒

解煤炭毒

解瘡癟毒

解百蟲毒

治虎咬傷

過食雞蛋傷

拔蛇牙方

鐵針入肉

獸蛇咬傷

狼虎熊傷

壁虎咬

鼠咬

銃子傷肉

毒蛇咬傷

人口咬傷

諸蛇咬傷

野芋頭毒

蛇入人口

蜈蚣咬又方

多腳蟲傷

飲鹹水毒

蛇入七孔

誤吞水蛭

蛇纏人足

烟管傷喉

射工傷人

救湯火

從高墮死

狗咬傷

誤吞田螺

誤吞蜈蚣

烏黃蜂咬

誤吞水蛭

山嵐瘴氣

解諸爪毒

誤吞蜈蚣

泡哥魚毒

四

誤吞螞蝗生子

蚯蚓毒

蜘蛛毒

誤食碗絲

治各種痧症疫

大凡痧症各有不同而脉之細軟沉遲與虛證脉象相同庸醫不察痧脉誤認爲氣血兩虧大用補劑無益垂死殊堪痛憤特列痧症瘟疫時氣一門以示誤認爲虛損者又二助云爾

黑痧
凡立時昏倒微覺肚痛面色黑脹不呼不叫過兩三時不救又曰滿痧急用蕎麥焙乾研碎去皮爲末溫酒調服三錢重者再服自愈忌茶

陰陽絞腸痧
凡腹痛手足冷身有紅點名曰陰絞腸痧以燈草蘸油點火淬其紅點用明礬末三錢開水調服

凡腸腹俱痛手足俱暖名曰陽絞腸痧宜針刺其手指爪甲一分半處出血亦服明礬取吐卽愈切不可進穀食若吃粥與米湯卽死難救矣

烏痧脹
真麻油一鍾溫服取吐卽安

痧症垂危尿
尿已出
頂髮數十根燒灰白礬研二錢陰陽水一碗調服取吐或用生芋艿二個搗爛放病人口內咽下卽醒醒後再喫數片又將鹽

置刀頭燒紅淬入水中乘熱灌下死者亦活或用生芋艿二

個搗爛灌下置病人於地以熱尿澆肚臍眼亦可

中暑

凡盛暑之時忽然昏暈跌倒氣欲絕者名曰中暑急取道路熱土一塊大蒜五個剝淨衣皮共搗爛以新汲井水和勻去渣灌之卽愈或用皂莢一兩燒存性甘草一兩微炒爲末溫水調一錢灌之

中寒

凡感冒寒邪頭疼身痛強硬拘急惡寒嘔吐或腹痛及傷寒發熱頭疼惡風無論內傷生冷胸膈脹滿外感風寒濕氣行於經絡腰腳酸痛及婦人難產經水不調氣壅不通等症均治

白芷

七分川芎七分薑製仙半夏七分官桂心七分白茯苓八

分桔梗八分當歸三錢白芍

紹酒炒一錢五分

枳壳五分川厚朴

薑汁製三

五分乾薑八分陳皮六分麻黃三分

甘草

清炙五分

茅山蒼朮

米泔水炒

二錢葱白頭三個生薑三片

清水煎熱服之如調經前方加陳斷

艾

醋炒一錢

中風試生死

凡昏倒不語不省人事牙關緊閉湯水不入者生天南星一錢生半夏一錢北細辛研極細一錢猪牙皂一錢好麝香一分共研極

又方

細末以此藥用少許吹入鼻中有嘔者可治無嘔者不治

癱腰痺

凡中風痰厥昏迷卒倒不省人事氣欲絕者用巴荳去殼紙包搗油出盡去荳用紙作撲或加牙皂末燃燒薰入鼻內卽醒可治

凡一時昏倒腹痛眩暈腰間如有繩纏急者

以眞麻油一盞灌下得吐卽愈

痧脹諸忌

凡痧脹忌食薑茶烟酒及熱粥用藥忌甘草紫蘇半夏總以提利極透爲要用香草嫩頭七個食鹽少許沖湯涼服氣通自愈如寒

薑湯
痧宜服

一切傷暑

凡暑月貪涼臥濕或生冷不節真邪相犯以致吐利或發熱頭疼體痛或心腹痛或轉筋或乾嘔或四肢逆冷或煩悶欲死均可

治之

用香薷一斤

厚朴薑汁製半斤

白扁豆

微炒

半斤剉

散體虛者

每日服一錢體實者

每日服二錢

四錢

體實者

每日服五錢

用水二盞紹

酒半杯煎至半盞

以前散藥入碗中調和俟水冷連進二服立

效

暑月暍死

凡中暍猝死者

急取地漿水一升飲之甚妙或以熟土圍臍傍

過

令人尿臍中仍用熱土一大塊 大蒜五個搗爛去滓熱水
調灌卽活當以熱湯徐徐灌之少舉其頭令湯入腹卽醒

伏暑發熱

凡作渴嘔惡及赤白痢消渴腸風酒毒泄瀉諸病 黃連一斤切
片以好紹酒二升半煮乾焙研糊丸如梧子大每服二三錢熟
水調下每日三服

太陽中暎

凡身熱頭痛而脉微細弱極此夏月傷冷水水行皮中所致 爪
蒂七個水一升煮至五合頓服取吐卽愈

黃疸症

黃疸症一證古人多言爲濕熱及有五疸之分者曰黃疸曰穀
疸曰酒疸曰勞疸曰黃汗皆未足以盡之而不知黃之大要有
四曰陽黃曰陰黃曰表邪發黃曰膽黃此四黃症人往往忽之
其害匪淺惟景岳論之甚詳 余特將各種疸症羅致之明辨
之對症服藥自無不治

陽黃症

凡因濕多成熟熱則生黃此卽所謂濕熱證也然其証身熱煩渴
或躁擾不寧或消穀善飢或小水熱痛赤澁或大便秘結其脈
必洪滑有力此証不拘表裏或風濕外感或酒食內傷皆能致

之但察其元氣尙強脾胃無損而濕熱果盛者宜清火邪利小便濕熱去而黃自退

凡積熱閉結小水不利或致腰腹下部極痛或濕熱下利黃疸溺血邪熱蓄血腹痛淋閉等証宜用大分清飲 茯苓二錢澤瀉二錢木通二錢猪苓一錢梔子一錢枳壳一錢車前子一錢水

一鍾半煎八分食遠溫服 如內熱甚者加黃芩黃柏龍膽草之屬只須加一味如大便堅硬脹滿者加大黃二錢如小水不利熱甚者加茵陳三錢如邪熱蓄血腹痛者加紅花五錢

青皮一錢

凡挾熱泄瀉熱痢口渴喜冷小水不利濕熱閉澁痘症

茵陳三錢焦梔子三錢澤瀉三錢青皮三錢甘草一錢

二錢水三

四鍾煎兩鍾不時陸續飲之治熱瀉者一二服可愈

凡陰黃症多由內傷不足不可以黃爲意專用清利此症宜調補心脾腎之虛以培血氣血氣充足則黃必盡退

人參二錢加黑棗七個煨生

潞黨參七錢代之白朮二錢茯苓二錢炙甘草一錢加黑棗七個煨生

八錢

薑三片水煎服。若元氣虛不至甚而兼多寒濕者。茵陳五苓散方加減用之亦可。

傷寒表邪黃

凡表邪未清而濕熱又甚者。其証必表裏兼見。身面悉黃者俱是。用茵陳蒿末一錢。焦栀子三錢。澤瀉三錢。青皮二錢。甘草一錢。

甘菊花二錢

白茯苓二錢

水煎溫服。

若內熱甚而表邪仍在

者。前方加柴胡五分。

白朮一錢。

猪苓一錢。山楂一錢。煨荔枝核七個。

去甘菊花。水煎溫服。若但有濕熱內實脹閉等症。而外無表邪者。及穀疸發熱不食。大小便閉。或食卽頭暈。宜用茵陳九錢。大黃四錢。山梔五分。分作二服。水二鍾。煎八分。食遠溫服。

若因內傷勞倦。致染傷寒者。亦多有發黃之症。但察其本無濕熱實邪等症。卽當以治陰黃疸之法。調補治之。若祇知攻邪。則未有不敗。故孫真人曰。黃膽脉浮者。當以汗解之。方用桂枝。加炙黃芪湯煎服。此卽補虛散邪之法也。

膽黃疸

凡膽黃疸。皆因傷膽而然。膽既受傷。則臟氣之損敗可知。使非修緝培補。則必至決裂。故凡遇此等証。務宜大用甘溫。速救元氣。

然必察其所因之本·或兼酸以收其散亡·或兼澁以因其虛脫·或兼斂以鎮其失守之神魂·或開導以釋其不解之疑畏·凡用諸藥大都宜同陰黃証治法·當必有得生者·若治此証而再加刺伐清濕利水·則真如壓卵矣·

治黃疸痧之法·本宜清濕利小便·然亦有不宜利者·當細察其病症脉象·可照各方治之·

金匱要略曰·趺陽脈緊而數數·則爲熱·熱則消·穀緊則爲寒·寒卽食滿·尺脉浮爲傷腎·趺陽脈緊爲傷脾·風寒相搏·食穀卽眩·穀氣不消·胃中苦濁·濁氣下流·小便不通·陰被其寒·熱流膀胱·身體盡黃·名曰穀疸·此症寒熱不食·食卽頭眩·心胸不安·因飲食傷脾·久久發黃者是·宜用茵陳九錢·製大黃四錢·山梔一十五分·分作二服·每服水二錘煎八分·食遠溫服·

凡額黑微汙·手心足心熱·薄暮卽發·膀胱急·大便溏黑·名曰勞疸·又名女勞疸·此症因大熱大勞·男女交接所致·身目俱黃·日晡發熱·惡寒·小腹滿·小便難·用猪油熬膏半斤·亂髮如雞子大

勞疸