

楊醫大全

瘍醫大全卷二十四

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

將錢之招東陽  
男三 攝要冊和同校

前陰部

自外腎起至前陰腎囊止一切癰疽疔瘡疳等證皆彙於此部中以便檢閱參治

龜頭腫痛門主論

澄曰龜頭腫痛有因肝經濕熱下注其腫紅脹宜龍胆瀉肝湯主之外搽介靈丹有因塗搽春藥交接違理其腫滲痛宜用松蘿茶洗外搽玉紅膏有因嫖妓變童沾染穢毒其腫紫黯上有黃衣溺管必痛小便淋瀝否則莖皮收緊包住龜頭即成袖口疳瘡亦有龜頭之下紅胞如瘤堅硬亦有所患之胞如水光亮即為雞嗉疳瘡治之大法以大黄下之撤毒為主亦有新婚損傷龜頭腫者以濃甘草湯洗之搽玉紅膏

龜頭腫痛門主方

龜頭腫大硬痛

沈員

用雞蛋三個去黃留蛋清將龜頭插入一炷禪香時拔出再以捫青布燒灰

存性碾末一錢加冰片一分搽上過夜其腫即消

龜頭腫痛

蝦蟆二隻炭火炙去皮肉將骨炙酥為極細末每一分加冰片一分碾勻細細搽上

又方 鬼饅頭嫩枝

即木蓮蓬

三四兩煎湯薰洗止痛消腫

又方

蝸牛

焙乾

枯礬

各等分

碾細濕

則乾搽乾則香油調搽

陰頭癰門主論

王肯堂曰陰頭癰生於陰頭

車繩

前陰部

龜頭腫

陰頭癰

魚口

陰頭癰門主方

驗方 鰲甲為末雞蛋清調敷

魚口

便毒

橫痃

魚口便毒橫痃門主論

陳實功曰左為魚口右為便毒兩腿合縫之上名曰橫痃

正宗



王肯堂曰便毒生於小腹下兩腿合縫之間其毒初發寒熱交作腿間腫起疼痛是也夫腎為作強之官所藏者精與智耳男女大慾不能直遂其志故敗精搏血留聚經隧乃結為便毒矣蓋腿與小腹合縫之間精氣所出之道路也或觸景而動心或夢寐而不洩既不得偶合陰陽又不能忘情息念故精與血交滯而成腫結也初起切不可用寒涼之藥恐氣血愈滯不得宣通反成大患惟當開鬱散氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣

準繩

孫曰商賈中野合不潔淫妓便搆此證或疳瘡或楊梅者皆由慾火淫熾一旦交合不潔為淫火冲動膚腠開通是以受毒初發之時慎不宜以敗毒之藥瀉之何也毒邪非虛不入若復虛胃氣與毒

邪下陷治之非彌年累月不愈也捷法只宜發汗其次利小便膚腠所感之邪汗易散也陰莖腿縫皆肝經絡肝腎主下焦又肝主小便使毒邪從小便中出所治皆順也故治之不拘日便可奏功若曾發汗利小便體厚邪固而不得宣通者乃以破毒活血調氣之劑攻之俟毒氣宣通隨以補劑托之亦不失先後著也

陳實功曰左為魚口右為便毒總由精血交錯生於兩胯合縫之間結腫是也

魚口生於左腿兩胯合縫之間便毒生於

右腿兩胯合縫之間

生於小腹之下近之陰毛之傍結腫名曰橫痃又名外疝是也此三症得之於奔走勞役

濕熱下注者少得之於入房忍精強固不泄或慾念已萌停而不遂以致精血交錯凝滯結而為腫淫毒內攻者多然其毒從便而入亦當從便而出治當散滯行瘀通利大小二便初起宜通水丹逐之不應用九龍丹山甲內消散七日已後根本堅固恐其作膿宜用火針法刺之亦妙已出膿者十全大補湯服之廢易收斂遲則恐生別症難愈謹戒房事

正宗

又曰因奔走勞役而得者即用四妙

湯補而消之甚驗

馮魯瞻曰便毒生於小腹下兩腿合縫之間小兒是肝火肝疳總屬肝經熱毒治宜瀉肝再視血分毒氣為之斟酌若大人犯此者多因慾火不能直遂其志故敗精搏血留聚經隧乃結為毒治宜散鬱散氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣間有因交合不潔為淫火衝動是以受毒所致者治宜先為發汗次利小便可也

錦囊

又曰婦人橫痃或肝經濕熱下注或鬱怒傷損肝脾其候兩腿小腹腫痛或玉門焮腫作痛憎寒壯熱小便澀滯腹內急痛或小腹痞悶上攻兩脇者肝經濕熱鬱滯也龍膽瀉肝湯玉門腫脹者肝火血虛也加味逍遙散若概投散血攻毒之劑則誤矣

周文采曰便毒初發寒熱交作兩腿合縫之間腫起疼痛是也夫腎為作強之官所藏者精與智也男女大慾不能直遂其志故敗精搏血留聚中途而結為便毒矣夫人脚腿與小腹合縫之間乃精血所出之道路或觸景而生情或夢寐而不泄既不得偶合陰陽又不能忘情急念故精與血交滯而成腫結也初起慎不可用寒涼之藥恐氣血愈結不得宣散反成大患惟當發散寒氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣

集驗

申斗垣曰勇疽即俗名魚口生衝門穴

啟玄

薛立齋曰魚口者言其形如魚口張而不合也潰後慎勿行動伸縮恐難斂口此症有公有母之分公者小而形長易治母者大而形圓公則只一箇母則三四個若母魚口只用艾炷灸初起者則餘者自消

心法曰橫痃疽在左腿夾縫摺紋中形長如蛤陰疽在右腿夾縫摺紋中形長如蛤屬三陰經由七情鬱滯凝結而成漫腫堅硬時痛甚則痛牽羣丸上及少腹形長如蛤一兩月方能潰破其膿深可知破後膿稠可愈敗漿最難斂口久必成漏又曰若膿水淋漓日久有生蟲形類虬蟲亦係膿深鬱久之所化也屬逆

心法曰便毒又名血疳又名便癰無論男女皆可以生發於少腹之下腿根之上摺紋縫中屬肝腎二經由強力房勞忍精不洩或慾念不遂以致精搏血留聚於中途壅遏而成或因暴怒傷肝氣滯血凝而發魚口因生於摺紋縫中其瘡口潰大身立則口必合身曲則口必張形如魚口開合之狀故名之也

魚口便毒橫痃門主方

九龍丹 魚口便毒騎馬癰橫痃初起未成膿者 穿山甲炒沒藥 青木香 血竭 滴乳香

兒茶錢各一 共為末用當歸尾三兩紅花二兩酒煎膏丸如桐子大每服二錢熱酒送下數服自消

魚口 不見水猪腰子一個剖開入雄黃三錢貼於患上

山甲內消散 魚口便毒騎馬癰橫痃初起未成膿者 歸尾 甘草節 大黃錢各三 白殭蠶一錢

穿山甲片炒三 黑丑打碎一錢 土木鱉去殼三個 酒水同煎渣再煎服大便行三四次喫淡粥補佳避風

為妙

魚口便毒初起 生明礬三錢或五錢碾粗末用生酒吞下欲吐忍之出汗即愈一半次日全消

胡桃散 大胡桃一個剖開去肉將全蝎二枚裝入燒存性研末熱酒調服

綠鳳散 魚口便毒瘰癧痰核初起 雞蛋一個入瓦罐煮三四滾取起用銀簪打三四十孔再入

罐內加芫花末一錢全煮一二十滾去藥食蛋

通水丹 治下部諸瘡魚口便毒橫痃腹癰初起人壯氣實小便淋瀝者 芫花不拘多少揀淨晒

極乾研為極細末磁瓶收貯每用五分將大棗二三枚去核夾藥在內空心嚙下冷茶過口

便毒 白殭蠶炒當歸 生大黃錢各三 甘草 穿山甲各一錢五分 研細空心酒調服三四錢

魚口 穿山甲炙白殭蠶 左顧牡蠣各五分 大黃一錢五分 研細酒調服

魚口便毒 芙蓉葉 大黃 金銀花 桔梗 天花粉 陳皮 皂角刺 穿山甲各等 研細

為丸如桐子大每服三十九白湯送下

又方 魚膠切碎蛤粉拌炒研細每服五錢空心酒調下蓋被出汗連服十次外用胡椒一兩研碎

燒酒調敷患處即消 又方 大蝦蟆一個剝去皮入葱五錢連腸搗爛敷患處再以皮覆其上

半日消散且無留毒之患如毒盛未消再如法敷一次 又方 肥兒一枚去核鹽一合醋半觔煮如泥搗敷患處

婦人魚口 川貝母 三錢 甘草 一錢 無灰酒煎服孕婦忌服

消魚口便毒橫痃奇方 范令聞 九頭獅子草 錢一 貝母 錢三 白水煎服瀉一二次自消重者不過

三劑必消

橫痃 長興莫氏 青殼雞蛋 一個 刺蒺藜 一合 好酒同煮蛋熟剝去殼再煎連蛋服立消

立消便毒 陳古公 廣膠 穿山甲 炒連翹各二當歸兩 荊芥 防風 紅花 各二斑蝥頭七個去金

銀花 八錢 車前 大黃 各五錢若窮人 葱三根好酒二三觔煎好空心服之儘量飲醉出汗或

下即消

便毒 油核桃 淨肉七個 瓜兒血竭 兩一 二味搗勻丸如蛋大以鹽泥固濟火煨烟盡安泥地中上以碗

蓋煨去泥研為細末無灰酒調下儘量飲醉即消

便毒 槐花 兩 防風 穿山甲 炙連翹 僵蠶 荊芥 各三錢 金銀花 五錢 甘草節 八分 酒水同煎不

效加乳香沒藥 各一錢 立消

魚口 獨子肥皂泥封煨赤去泥將肥皂研細每服二錢酒調服取汗立消

魚口便毒橫痃將成膿者 小粉漿同小活鮑魚搗爛敷上即消

便毒魚口已潰不能長肉收口 狗肉二三觔煨爛取湯洗瘡口淨將狗肉漸漸推入瘡口內令滿

外用綢紮定不可行走安息數日瘡肉漸生狗肉漸出瘡口盡瘡口長平

魚口初起三五日 五倍子炒黃研末百草霜和勻醋調敷一日夜全消

魚口便毒一日至七日未潰紅腫寒熱 黑丑研白丑研殭蠶炒去絲當歸尾 甘草節 金銀花各

錢土木鼈五個去殼切片

大黃錢五穿山甲二片炙

猪牙皂條朴硝錢

右作一劑酒水各一碗煎空心服行三

四次溫粥補之輕者一服重者兩服消孕婦忌服虛人減半

便毒初起

李岳

皂角子二十一粒洗淨空心好酒吞下儘量飲醉一覺即消

便毒

生大黃六錢

全蝎去頭足炒去毒

穿山甲錢三

白芷錢四

水煎服外用千年石灰一兩明礬三錢鹽少

許米湯調敷即消

魚口便毒橫痃初起立消

用雞蛋煮熟劈開去黃將蛋連殼合在腫上以艾圓如荳大灸三五壯

如未能全消隔日再灸之

魚口 白魚膠五錢剉銅鍋炒黑色略帶黃些研細末用老酒調成團空心時以匙挑放舌上須多

用酒吞下其藥直達患處如瘡大可再製五錢服之即消如已潰亦效

陰腫如斗門主方

男子陰腫如斗其色紅赤不能治者

馬鞭草搗爛敷之或煎洗之亦效

陰腫大如斗核痛

白礬二兩

雄黃一兩

甘草五錢

水煎先薰後洗神效

囊腫秘方 錦囊

川椒

麥芽炒焦

地膚子各一兩

葱白頭連鬚者二十一根

去土淨不必洗

煎湯淋洗囊上良久

次日再洗以消為度

小兒風熱外腎嫩赤腫痛日夜啼哭不數日退皮如雞卵殼狀

同春

老杉木燒灰入膩粉清油調

敷之神效

陰瘡腫大不消

硼砂水研塗之大有效

小兒坐地多時或風邪或蟲蟻吹呵陰囊腫硬 蟬蛻五錢水一大碗煎洗不過三次腫消痛止更

服五苓散加燈心煎服 又方 葱園中蚯蚓尿研細以甘草湯調敷

小兒外腎赤腫 老杉木煨存性 宮粉各等分 研細清油調搽並治大人繡毬風

腎囊罌丸腫大 棉花子仁一兩煎湯常洗自消

氣卵胞 老絲瓜皮 老生薑皮 共入鍋中炒沖生白酒熱服得汗即消

## 下疳



### 下疳門主論

王肯堂曰下疳瘡生數口津 又曰小腹至陰之下玉莖之根癢極沸湯沃之稍止而復作有三四

竅黃水淋漓若幼時曾患惡瘡後來亦有此症作結毒以治之

陳實功曰下疳者乃淫慾邪火鬱滯而成其來有三一由男子慾念萌動陽物興舉淫火猖狂而未

經發泄以致敗精濁血流滯中途結而為腫初起必先小便淋瀝溺痛次流黃濁敗精陽物漸漸破

損甚則腫痛腐爛治當疎利肝腎邪火為主用清肝導滯湯主之一由婦人陰器瘡精濁氣未淨接

與交媾以致淫水毒精傳襲而成初起必先皮腫光亮甚如水晶皮破流水腫痛日生麻癢時發治

當解毒消風為主如龍膽瀉肝湯合平胃散主之一由房術熱藥塗抹玉莖洗擦陰器與助陽火煽動陰精僥倖不衰久戰不泄多致精阻火鬱未發而成皆由蘊毒所致初起陽物癢痛堅硬紫脹疙瘡漸生腐爛漸作膿水淋漓不時興舉治當瀉火解毒為主如黃連解毒湯蘆薈丸主之 正宗

蔣示吉曰又有先發時瘡誤用薰條擦藥收斂結毒於此者最重必成蠟燭卸矣 說 又曰如肝經

濕熱下注者不過澀淋黃濁莖中作痛不紅不腫者輕 又曰濕熱下注者輕淫火毒發者重 又

曰下疳又名曰鬪精瘡其潰爛日甚者名蠟燭卸 又曰若小便淋瀝漸爛漸開色紫無膿疼如針

刺者難治

馮魯瞻曰下疳者玉莖生瘡甚至蝕透而久不愈宜內服燥濕解毒外用薰搽可也多係肝經濕熱

故尤宜清肝除濕 錦囊

李東垣曰妬精瘡因壯年人精氣盈滿久曠房室陰上生瘡亦腫作害妨悶癢痛者是也 精義

申斗垣曰龜頭及莖上有瘡腫焮於內而外則皮裏不見其瘡如袖口之包手故名曰袖口疳最為

難治何也蓋藥不能搓至疳上治法用眼藥加冰片膏子入雞蛋殼內套龜頭上浸之內服清肝腎

濕熱藥 啟 又曰玉莖有瘡癢而痛亦窠窠中有水此乃交妬不洗肝經濕熱所致肝性主臊故瘡

亦臊名曰臊疳宜用肥皂敷之又曰妬精瘡用地骨皮泔水洗過取室女首經布燒灰搓之立效

竇漢卿曰玉莖內生瘡名內蛙猥玉莖外生瘡名外蛙猥

胡公弼曰妬精瘡乃陰頭潰爛成膿或癢或痛蓋緣後生未娶精氣溢盛陽物興起當泄不泄強泄

脹裂龜頭嫩皮日久潰爛腐肉成膿間有害其生命者治之當戒房事外以黃柏皮散煎洗拭乾再

搽訶子灰散或銀粉神丹 青囊

下疳

陳遠公曰龜頭生疳瘡服敗毒藥毒盡從二便而出倘大腸燥結則敗毒藥不能走大腸勢必趨小便而出小便口細毒難盡泄於是毒不留於腸中而單結於外勢毒盛必發安得不腐爛哉往往連通身爛盡人多以藥外敷雖外藥亦不可少然不先消火毒遽用外過不啻如石之壓草也故必先內治之用散毒神丹茯苓一兩黃柏生甘草黑梔仁各三錢肉桂一錢水煎服四劑火毒盡從小便而出疼亦少止後用生勢丹敷之炒黃柏三兩兕茶生甘草各一兩大黃三錢丹砂勿見乳香沒藥各一錢冰片麝香各三分為末搽之疼即止數日膿血乾筋肉再長一月全愈但不能長龜頭也愈後服十全大補湯一二月則外勢仍能伸縮尚可種子若多服敗毒泄火之劑無論命門寒冷而外勢亦且冰冷安得陽和之驟復哉此治法之次序也

冰鑑

心法曰下疳統名疳瘡又名妬精瘡生於前陰經云前陰者宗筋之所主督經脈絡循陰器合纂間又云腎開竅於二陰是瘡生於此屬肝督腎三經也其名異而形殊生於馬口者名下疳生五莖上者名蛙疳莖上生瘡外皮腫脹包裹者名袖口疳龜頭外腫如瘤者名雞喙疳疳久而偏潰者名蠟燭疳痛引睪丸陰囊腫墜者名雞肫疳痛而多瘡潰而不深形如剝皮爛者名瘙疳生馬口傍有孔如棕眼眼內作癢捻之有微膿出者名鏹根疳生楊梅瘡時或誤用薰搭等藥以致腐爛如白者名楊梅疳又生楊梅時服輕粉水銀打成刮藥以致便溺尿管內刺痛者名楊梅內疳

澄曰凡治下疳第一戒患者喫鹹若肯飲食喫淡一月收功只消半月

### 下疳門主方

九味蘆薈丸 當歸

胡黃連

川芎

蕪荑

白芍

各一兩

龍膽草

酒浸炒 焦七錢

真蘆薈

五錢

廣木香

甘草各三

右為末米粥搗丸麻子大每服一錢或一錢五分白湯送下若虛者佐以加味歸脾

湯加味道遙散治之

珍珠散

下疳皮損腐爛痛極難忍及諸瘡新肉已滿不能生皮又治新婚玉莖損傷新娶陰戶傷

痛搽之極效並治湯發火傷皮損肉爛疼痛不止

新白珍珠一錢入豆腐內煮數滾研極細以研至無聲為度

上好

花青

即青黛五分

真輕粉兩

三味共研千轉細如飛麵磁瓶收貯初起搽之即愈若腐爛疼痛甘草

湯洗淨猪脊髓調搽又治婦人陰蝕瘡極效湯發火傷痛者以玉紅膏調搽

滑石

沒藥去油龍

骨各等分

右研極細乘瘡膿汁未乾搽之不可見水自結痂矣

又方張化

紅棗去核將銅絲整塊者包在棗內放炭火上煨存性研極細末加大呢冰片再研磁

瓶密貯

先將瘡上用陳松蘿茶洗淨軟絹拭乾將藥搽上雖龜頭爛半者無不奇效 又方 螳

螂子煨

白殭蠶煨

兒茶

輕粉各等分

研極細用甘草湯洗淨搽之 又方 玉莖瘡或漸至蝕

透有爛去一半者服此而愈

扁蓄

四兩黃連二甘草兩

水煎內服外洗 又方 甘蔗頭煨一錢兒

茶三分冰片一分

疳瘡簡便方

用戴舊油透羅緞帽沿燒灰抗粉瓦上煨黃色各等分共研極細磁瓶中收貯先用

紅棗十五個甘草三錢煎湯溫洗患上挹乾搽之

又方

蟾蜍窩拭淨貼之

又方安慶

白螺

要叮在岸上的四十九枚陰陽瓦煨枯如叮在水底者無用

研細用生酒調

服益被取汗外用大田螺二個將蟹挑開入冰片三分同螺化水雞翎攪上如未痊可如法再製

服

又方 蟹殼煨研加冰片少許搽之

又方

鉛粉錢冰片分

研細外以銀花蘄艾花椒

煎湯洗淨乾搽

又方

血竭

兒茶

乳香

去油各

研細

沒藥去油各

研細搽之 又方 旱

田螺反麝香 輕粉

冰片各等

研細香油調搽

又方

燈草灰入輕粉麝香少許乾搽

又方 防風煎湯洗

下疳妬精瘡 七月七日採鳳眼草燒灰淋水洗之

金螺散 大田螺數枚水養吐盡泥沙俟靨開入研細冰片末同螺化水以鉛粉填滿仍用靨合上

放新瓦上煨令紅赤去殼研細又填入第二螺內又煨如此三次研細密貯任用

二靈丹 下疳初起流膿 兒茶一錢 冰片三分 研勻將瘡先用冷茶或甘草湯洗淨搥乾以雞

翎將藥掃上

龜頭爛半 竹蛙蟲糞 銀粉 臘肉骨髓 松香各等

研細和勻用燒酒將瘡洗淨以搽之內

單服土茯苓湯當茶

七寶橫榔散 玉莖疳瘡或漸至蝕透久不愈者 橫榔 密陀僧 牛黃 輕粉 黃連 黃

柏 朴硝各等

研末先將葱白漿水洗淨軟帛拭乾如瘡濕乾搽瘡乾油調搽

聖粉散 下疳疳蝕臭腐爛痛不可忍 密陀僧 黃丹 黃柏蜜炙 孩兒茶 乳香各三錢 輕粉一錢

分五 研極細用葱湯洗瘡濕則乾搽乾則用香油調搽兼治小兒疳瘡

玉莖生疳爛去大半 吧嗒杏二錢研細紙包壓去油取淨白霜一錢加冰片三分再乳絕細聽用

先以甘草煎湯洗淨搥乾搽上

下疳疼不可忍 寶氏 黑羊角煨 穿山甲二錢 乳香去油 沒藥去油 各一錢 研細酒調服

下疳大爛 黃蠟八錢 白蠟 面粉各一 冰片一錢 麻油三兩 先將油與二蠟熬化隨下面粉次

下冰片和勻作隔紙膏貼之五日後痛自止肉即生矣

銀粉散 胡公獨

治下疳母論新久腐爛作痛及楊梅瘡薰後結毒玉莖腐爛或陽物爛半者 好

錫六錢化開入硃砂末二錢攪炒枯去硃砂留錫再化開入水銀一兩和勻傾出聽用又將杭粉一兩鋪夾紙上捲成一條以一頭點火燃至紙盡吹去紙灰單用粉同前錫末加輕粉一兩共

研極細末收貯凡遇前症先用甘草煎湯淋洗拭乾以此藥搽上即能止痛生肌收斂

妬精瘡玉莖爛一二寸者兼用柯子灰散神方 周鶴仙

黃柏荆芥甘草馬鞭草葱全煎洗取膿

柯子灰散 黃柏炒存性 柯子灰 錢各二 麝香 少

共研極細搽患處令睡睡醒服冷水兩三口切勿令

陽道興起脹斷瘡 二七即愈 黃柏一方無

銀粉神丹 曹振

專治玉莖蟲蝕生長如初止少元頭者或舌頭被人咬去抹上此丹亦能長全大

有神功 黑鉛 五錢 寒水石 三錢 輕粉 二錢 水銀 二錢 礪砂 珍珠 各一錢 先將黑鉛化開投水銀

研不見星共為細末收貯遇前症先用葱艾花椒煎湯洗淨若怕洗畏痛須先薰止了痛再洗拭

乾上藥若舌頭咬去先用乳香沒藥煎水口噙之止痛後上藥自然生長全愈

兒茶散 下疳蛙得 銅綠不拘多少煨紅放地上冷定又煨又冷定乳細加兒茶等分和勻後將

下疳洗淨搽之

下疳久不愈 海藏

橡斗子二枚合盛黃丹令滿以亂髮厚纏定燒烟盡為度同研為細末先以葱

白熱漿水洗瘡膿淨再上藥甚者不過三次如神

陰頭生瘡 孫真人

蜜煎甘草末頻頻塗之

竹節霜 百效

龜頭因熱毒馬口結蕪或粗衣擦損 取新竹節上霜刮下一搽即愈

下疳蝕爛 白菓樹葉包裹

下疳本抄 蘆甘石 乳香 血竭 川黃連各一錢 輕粉五冰片一分 研末用米泔水洗淨搽上立見

效 又方 蝸牛焙乾 枯礬各一錢 研末濕則乾搽乾則以香油調塗

疳瘡蛙得 靈秘丹藥 二蠶出過蟻者燒存性 輕粉二錢 枯礬五錢 紅絹二方 燒灰三錢 兒茶一錢 五倍子一個 研為

末酸漿水葱白川椒煎湯洗淨搽之奇效無比

疳瘡蛙得 銀硃飛水 兒茶各一錢 輕粉五錢 黃柏灰 老茶葉各二錢 研末用黃蠟二錢熔化為丸却作

二十粒每服一九好酒空心送下神效無敵

下疳陰瘡即真人 蘆甘石一兩火煨醋淬五次加兒茶三錢研末麻油調敷

蠟燭卸周鶴仙 紅梔子燒灰每一錢加梅花冰片五厘麻油調搽

下疳 圓厚五倍子一個去頂以砂仁三顆搗碎入於內仍以頂合好用濕紙包裹火內煨極黑取

出為末搽患處即愈 又方 五倍子燒灰 真冰片少 研極細末搽上立效

疳瘡周小庵 鳳凰衣焙 橄欖仁油 人參各五錢 兒茶二錢 珍珠分金箔張 共乳細末搽上立刻定

痛生肌 此方加南北鉛製白霜一錢紅升丹三分乳勻搽上更妙

疳瘡舌爛鼻爛龜頭爛 黑鉛一兩裝入黑狗腦內以鹽泥封固入 每用法製鉛末一錢五分加

乳香油沒藥油鉛霜各三厘 硼砂五厘 雄黃一分 金箔十張 寒水石四分 輕粉二分 共乳細末磁瓶密貯

舌斷者用米泔水葱茶煎湯溫漱拭乾上藥待長時洗去藥又漸漸搽之 龜頭爛者又以葱湯

薰洗過搽藥

疳瘡常立庚 龍膽草 山梔生用 當歸尾 木通 黃芩 柴胡 澤瀉 生甘草 白水煎加

荊芥防風 白芷梢 紅腫加 川連大黃

蛙捍疳爛去半段者 先用苦茶洗淨用黃連末搽三四日待腐肉去盡取雄犬陽莖連肉在火上

炙黃煨乾存性為末每用少許加入黃連末內搽之犬莖末只可逐日漸加不可驟用太多則收

口速而反裂破矣至多亦不過與黃連末等分為率

下疳 輕粉 黃柏錢各一 共研細末先用麥門冬煎湯澆洗搽之

下疳紅腫熱痛 鯉魚膽汁敷

大荳甘草湯 黑荳一合 生甘草一兩 赤皮葱三根 槐條六十 煎洗一切疳瘡

一子消毒散 肥皂子 杏仁炒 蟬蛻 殭蠶 皂角子焙 土茯苓八兩 猪牙皂一條 荊芥 防

風 牛膝錢各一 金銀花三錢 猪板油二兩 水八碗煎三碗早午晚分三次服如結毒服二十一日全

愈 袖口疳加黃柏一錢 楊梅瘡加薤白仁皂角刺各二錢 內疳加海金沙白丑五分

鳳衣散 抱雞卵淨殼 黃丹錢各一 冰片二分 輕粉四分 研極細乾搽或鴨蛋清調搽

早螺散 冰片 麝香各三錢 白田螺殼錢三 輕粉一錢 研極細以香油調搽之

白玉膏 貼疳瘡一切瘡 白芷 蘆甘石煨 甘松 當歸尾 乳香油去 五靈脂 三柰 北細辛

樟冰錢各五 沒藥油去 象皮 白蠟錢各三 松香 冰片 麝香錢各一 鉛粉十三兩 先將麻油二觔熬成

至烟起離火入白蠟松香又熬不住手攪看有大泡便將鉛粉陸續下但滾即取起稍停又入火

如此數次見有菊花紋小泡便入前諸藥末仍取起滴水成珠入冰麝攪勻待凝定時傾水兩三

盞入罐收貯聽攤貼

鳳凰散 治男女下疳腫爛疼痛難堪並一切皮破腫爛諸瘡即時消腫定痛拔毒生肌 抱雞蛋

殼連衣 乳細末每一錢加冰片二分密貯用時或乾搽或猪膽汁或麻油調搽

黑香散 治男女下疳瘻不可當者並一切極瘻諸瘡 橄欖核燒灰存性 研極細末每一錢加冰片

二分密貯或乾搯或麻油猪膽汁俱可調搽

蠟燭卸下疳 抱過雞蛋殼煨存性 黃連 輕粉 各等分乳細香油調搽立時止痛結靨

下疳 陳鈴灰 橄欖核煨灰 兒茶 輕粉各三錢 冰片一錢 研極細末搽上用雞蛋軟皮黃連湯煮過 貼之

初婚玉莖傷損門主論

陳實功曰凡初婚玉莖擠夾傷損出血疼痛者先以葱湯洗淨隨用珍珠散加冰片搽之腐皮漸乾痛自漸止矣正宗

傷寒瘥後內外瘡門主論

馮魯瞻曰傷寒瘥後若小便澀有血者亦是餘熱毒也名曰內外瘡亦皆有靨若不出膿者死宜用黃連解毒湯加生地當歸尾連翹木通滑石牛膝扁蓄琥珀甘草稍之類錦囊

囊癰門主論

王肯堂曰囊癰乃足厥陰肝經所主乃濕熱流入肝經而成治當清肝家濕熱佐以養陰固腎又曰腎陰毒即陰囊疽乃坐卧濕地久著汗濕衣袴寒濕下攻陰注經絡久而不散遂生此症初起陰囊紅腫疼痛者是也

朱丹溪曰囊癰即外腎癰也此癰生陰囊之上其症最酷陰道多虧濕熱相聚致生此毒若不速治則囊裂舉丸外懸可用青荷葉包之或紫蘇葉洗去毛 包之或單油紙煮過包之

陳遠公曰有陰囊左右生癰者名曰便毒生於囊之下糞門之前名曰囊癰三處相較便毒易治囊癰最難治以囊之下為懸癰其皮肉與他處不同在他處皮肉或橫生直生俱易合口而囊下橫中