

三因方論

上

13. 14.

三因方論卷十三目錄

痰飲叙論

痰飲證論

痰飲治法

十棗湯

大青龍湯

小青龍湯

防己桂枝湯

小承氣湯

茯苓五味子湯

大半夏湯

小半夏湯

葶藶大棗湯

五苓散

茯苓湯

參苓飲

八味丸

參蘇飲

破飲丸

控涎丹

強中丸

喘脉證治

杏參散

神祕散

真應散

芩冬湯

清肺湯

神祕湯

皺肺湯

理氣丸

黑錫丹

白散子

肺痿肺癰叙論

肺痿證治

人參甘草湯

甘草乾姜湯

在人參甘草湯之上

溫液湯

肺癰證治

葶藶瀉肺湯

見痰飲門

小青龍湯

見痰飲門

如聖湯

葦葉湯

腰痛叙論

外因腰痛論

內因腰痛論

不內外因腰痛論

腰痛治法

獨活寄生湯

小續命湯

牛膝酒

杜仲酒

腎着湯

鹿角丸

安腎丸

青娥丸

神應丸

立安丸

五積散

熟大黃湯

橘子酒

桃仁酒

虛損證治

正元散

麝香鹿茸丸

大山芋丸

羊肉丸

大補丸

兔絲子丸

妙應丸

增損樂全湯

人參養榮湯

十補丸

遠志丸

秘真丹

蓮子丸

威喜丸

鎖陽丹

十四反丸

宣和賜著絲丸

參香散

三因極一病證方論卷十四目錄

水腫叙論

水腫證治

復元丹

當歸散

正陽丹

消腫丸

消腫散

枣仁散

禹餘糧丸

退水丸

退水餅

大腹子散

桃紅散

大安丸

千金散

葶藶薺菜丸

料簡

大豆湯

五皮散

澤漆湯

黃芪苦酒湯

附子薺豆湯

無礬丸

茯苓分氣湯

麻黃甘草湯

茯苓蘇子湯丸

氣分證治

桂附湯

枳朮湯

陰癩叙論

陰癩證治

茱萸內消丸

大戟丸

煉陰丸

抵聖丸

兼金丸

麝痛丸

蒺藜丸

三白散

蜘蛛散

牡丹散

香附散

雄黃散

癰疽叙論

癰疽證治

遠志酒

單煮大黃湯

獨聖湯

獨聖雙行湯

五香連翹湯

忍冬酒

靈寶膏

白玉膏

替針丸

萬金湯

漏蘆湯

轉毒散

托裡散

檳連散

生肌散

瞿麥散

內寒散

內補散

善應膏

猪蹄湯

外食散

瘡漏脉例

陷脈散

桂附丸

癰疽灸法

三因極一病證方論卷十三

宋青田鶴溪陳言無擇編

痰飲叙論

人之有痰飲病者由榮衛不清氣血敗濁凝結而成也內則七情擾亂歲氣不仁鬱而生涎，結為飲為內所因外則六淫侵冒玄府不適當汗不泄蓄而為飲為外所因或飲食過多嗜欲無度呼呌疲極運度失宜津液不行聚為痰飲屬不內外因三因所成證

狀非一或為喘為欬為嘔為泄暈眩嘈雜忪悸愼懣
寒熱疼痛腫滿攣痺癢閉痞隔如風如癩未有不由
痰飲之所致也

痰飲證治

古方唯分四飲六證不說三因不知其因病源自何
而得觀夫治飲之法既用大小青龍桂枝防己五苓
承氣得非外因葭苓、朮八味參蘇得非內因十棗
葶藶大小半夏控涎破飲則屬不內外因理固明矣
以此類推頗得其要今叙列諸證以為治門須原本
因施用湯藥學者自宜詳審所謂四飲者即懸飲溢

仍用二字衍
文

飲支飲痰飲也懸飲者飲水流入脇下欬唾引痛溢
飲者水流於四肢當汗出而不汗出身體疼重支飲
者欬逆倚息短氣不得卧其形如腫痰飲者其人素
盛今瘦水走腸間漉漉有聲又有留飲者背寒冷如
手掌大或短氣而渴四支歷節疼脇下痛引趺盆欬
嗽則轉甚又有伏飲者膈滿喘欬嘔吐發則寒熱腰
背痛目淚出其人振振惡寒身暈動惕故曰四飲生
六證或云五飲者即留飲伏飲合為一證是也其脈
皆仍用弦微沉滑治之之法懸飲當下之溢飲當發
其汗支飲則隨證汗下痰飲則用溫葶葶後小便去之

其間或隨氣上厥伏留腸胃使人嘔吐眩暈背寒或一臂不隨有類風狀不可不知

痰飲治法

十棗湯 治懸飲欬唾引脇下痛又治支飲欬煩胸

中痛至百日其脉弦者

芫花炒

甘遂

大戟

炒等

右為末另以棗十个水二盞煎八分去棗調藥壯人一錢瘦人半錢平旦溫服不下者次日更加半錢下後糜粥自養若已下不可再服

大青龍湯 治溢飲身體痛而重汗不出拘急痛

麻黃七錢五分

桂枝

炙草各二錢五分

石膏

杏仁四十粒去皮共炒

右為剉散每服四錢水盞半姜五片棗二枚煎

七分溫服一服汗者勿再服復服汗多亡陽虛

逆惡風煩躁不得眠也

小青龍湯 治溢飲支飲倚息不得卧及喘滿者

麻黃 桂枝 炙草 芍藥 細辛 炮姜各三錢

五味二錢 半夏三錢

右為剉散每服四錢水一盞半煎七分服渴者

去半夏加花粉三錢微利去麻黃加炒芫花噎

者去麻黃加附子小便不利者去麻黃加茯苓
 五錢喘者去麻黃加杏仁三錢欬而上氣肺脹
 其脈浮心下有水氣者胸中痛引缺盆加石羔
 二錢

防已桂枝湯

治膈間支飲其人喘滿心下痞堅面

色黧其脈沉緊得之數十日醫吐下

之不愈

防已

三兩

桂枝

二兩

人參

四兩

石羔

六兩

右為剉散每服四錢水一盞半煎七分溫服虛

者即愈實者復發再服不愈宜去石羔加茯苓