

外科圖說

圖說卷四

華亭 高文晉梅溪氏撰

痔漏總論

痔漏一證方書以肛邊腫核者爲牡痔有孔者爲牝痔癢而痛者爲脈痔有寒熱者爲腸痔出血者爲血痔東垣立濕熱風燥四治以秦艽蒼朮湯治腸頭結之濕爛也當歸郁李仁湯理癢而兼痛之風也涼血湯治大便閉結之燥與火也丹溪專以補陰涼血爲主其意甘寒可以息風滋陰必能除燥也葉叅先哲

似無餘蘊。但病有兼。因法無一定。不得不稍加蛇足。以完全璧。至若氣血留滯者。通補可投。膏粱蘊熱者。清疎爲貴。有核燥潤兼投。痛久須加攻絡。成漏者無分虛實。年多法用。培元黑地黃。治脾濕腎燥之要藥。天真丸補真虧精乏之靈丹。補中能升氣陷。歸脾善止血流。班龍丸功擅溫煦奇督。逍遙散藥力善調肝。強六君培脾胃。左歸救腎傷。至於濕熱下流。致害腸胃者。方法詳後。宜變通施治可也。

一十五類圖註

蓮子痔



狀如蓮子

通腸痔



其根生於
下臟出糞卽

氣痔



感氣卽下

漏痔



氣血衰敗
久勞淹臍
不曾燒淨

勾腸痔



其形遠
腸頭者

蓮花痔



形如蓮花

雞心痔



其形如
雞心

垂珠痔



其形垂
下如珠

貫煉痔



穿而貫
膿血

栗子痔



其形如
栗子

菱角痔



形如菱角

盤腸痔



盤腸而生

子母痔



一大一小

翻花痔



形如翻花
登廁卽出

鼠竅痔



形如鼠竅

雙頭痔



有兩頭

泊腸痔



緊泊肛
門者

血收痔



卽血出

夫妻痔



一圓一長
即雌雄也

珊瑚痔



形如珊瑚

脫肛痔



肛門脫
下痔漏

瘡腸痔



其痔橫
在肛門

三迷痔



有三珠財
迷色迷酒
迷故多之

櫻桃痔



形如櫻桃

雌雄痔



酒色食毒
不慎此間
黑色

右諸痔名類不同其種則一何也皆由大腸傳道

以成風熱深而腎虛爲冷氣相攻飽食猪雞魚膾
燒酒醢酒生酒辛辣等味或登廁臟虛爲風邪所
襲六氣七情所感人生素不能飲酒亦患痔者臟
虛故也亦有父子相傳者母血父精而成腸風者
血痔之漸也速服涼血補劑少勞戒怒遠色忌口
斯能愈矣

法製枯藥法

信 一兩

白凡 二兩
爲末

飛丹 五錢

硃砂

五錢
臨時生用

巴豆

五粒
去殼

先將凡一兩半安於瓦盆中隨將信摻在凡上再

將凡覆上火熬枯取出爲末加硃砂末五錢和勻
碾細末如塵先用魚腥草煎湯洗淨每用少許點
上少頃黃水漸出一日夜三四次如無魚腥草或
茶藤花或野薔薇花紅白槿樹花代之或甘草湯
亦可

今用藥開於後

護肉藥

鬱金 五錢

黃連 五錢

白芨 三錢

右爲末用蜜水調稀先將此藥塗在痔四邊好肉
上却用薄紙貼定固濟了好肉方用痔藥點之

痔漏千金秘方

用牡蠣二兩煨過入地窰坑埋之去火氣為細末
痔漏瘡若濕乾摻若乾以津調搽痔上

又秘方

砒霜

白色明淨者五錢

白礬

一兩二錢明淨者

黃丹

六錢水飛過二次焙乾

草烏頭

二錢為末骨去皮生用

蝎稍

八个瓦上焙乾

黃連

白

升

之

草

右件用舊鐵杓或熟鐵銚先將炭燒鐵銚透紅放
冷揩拭淨將砒打碎如豆大將白礬燒令滾沸將
碎砒投礬內拌勻以文武火煨旋旋攪入草烏蝎

黃丹同研末此藥小

將痔漏以

甘草湯或葱湯洗淨將生肌調藥少許以鷺翎
掃藥在痔漏上日三次第一日第二日瘡內必出
黃水如膠其痔漸消看漏深淺就將薄綿紙裹猪
鬃三根先入在漏內試漏深淺就將藥紙撚之藥
插入漏內其藥紙撚久不取出如換藥紙撚方取
出再換新藥紙撚入漏內日上三次蚤午晚用藥
俱要洗淨漏用藥三五日痔漏頭併瘡口俱黑色
然後不用紙撚藥其瘡口自落如漏不深入內
上用藥點搽如瘡紅活平復不收口方用生肌散

藥敷之立愈其瘡根永不再發矣

生肌長肉藥

血竭 五錢

龍骨 五錢

光粉 二兩

白芷 五錢

黃丹 三錢 飛炒水

軟石膏 一錢

黃連 五錢

海螵蛸 一錢

黃柏 一兩

五倍子 一兩

右爲細末如瘡孔深用蘆管吹入裏面如瘡口淺止乾摻入內生肌平復不用

點痔藥

冰片

乳香

沒藥

龍膽

俱爲末用蝸牛一枚碎其底入前四末放盞內化

水以銀簪滴汁痔上甚効

田螺代之亦可

痔漏藥

用銅杓內制牛黃末一分先炒微煙卽下礞末二錢候煙起再下白礞末九錢待滾乾取起仍入火微炒煨安地上出火毒爲末後入乳香辰砂沒藥冰片各一錢共爲極細末每用一錢許以稠糊調和隨漏孔大條子量深淺長短用之如瘡孔爛大止用津唾調之填入孔內待痔已潰動毒水自流如好肉生瘡卽以五黃膏護外如入錠時仍用唾調前藥末付在痔根上如痔根脫落搽生肌散并

多服蠟礬丸

生肌散

龍骨煨

海螵蛸

赤石脂各錢

乳香

沒藥

血竭

輕粉

雄黃各五分

未出毛小鼠

二枚炙乾

各爲末如塵臨用加水片少許

又生肌散

寒水石

煨一錢

龍骨

煨五分

乾胭脂

三分

輕粉

爲細末乾摻新瘡加薄荷一分老瘡依此

辰砂錠子

久寄成漏

信一錢

白凡二錢

蜜陀僧五分

辰砂五分

先研信細入磁盆中次用凡銀信上煙盡爲度再將蜜陀僧辰砂研細白麵一些和作尖錠子頑漏納瘡口腐去敗肉方可生肌

盤腸通腸痔散

痔在內用此敷之痔頭頂自出以前藥枯之

磁石一錢

枯凡五分

白乾薑五分

草烏尖三枚

右爲末葱汁調敷

痔腫者

用殼木鱉五倍爲末蜜水調敷

諸痔

用螻蛄五枚搗碎水銀一錢射香三厘冰片五厘
用銀簪蘸汁滴患上

痔漏

用團魚一枚扯出頭殺之取血卽將團魚頭燒灰
爲末皿爲丸如棗核大諒痔之大小爲之入內

漏孔不合

用石楠葉煎湯放在桶內薰洗待湯過手就將漏
洗淨後將黃牛面前牙齒四枚裝在小瓶內用木
屑燃之待白煙出爲度取出研末用津液蘸牙末

煎入酒

其方不詳
預製備

用

益氣清臟湯

人參

當歸

條芩

涼大

黃連

生地

赤芍藥

槐角

川芎

升麻

枳殼

寬大

秦艽

白朮

茯苓

甘草

水

煎服

水二鍾

薑一片

燈心

甘根

煎服

秦艽蒼朮湯

秦艽

一錢二分

當歸

一錢

澤瀉

防風

各三分

蒼朮 五分

桃仁 一錢 研為泥

栝榔末 五分

大黃 一錢 雖大便燥亦不宜多

皂莢 燒存性 去皮一錢

黃栢 五分 若大腸頭沉重者濕勝也更加之 天氣大熱或燥熱喜冷者以意加之

右用桃仁栝榔皂三末另外餘作一服水煎去渣加

三味末調勻再上火煎一二沸空心服之再食美

膳壓之不犯胃氣忌生冷硬物桃李梅杏菓品油

麵大料生薑胡椒之類第二服如前加木香末三

分

秦艽防風湯

痔漏每日大便時發疼痛如不疼痛非痔漏也