

中西醫粹

上海千頃堂書局發行

後附
春溫
痢症
三字訣

春溫痢症三字訣合璧序

黃炎已邈仲景又不復作醫學晦盲。至唐宋元明而極。吾友唐君容川固已辭而闢之矣。唯所著方書淹貫中西。或頗深邃。以訓醫家。不求便俗計。唐宋以來方藥譌謬殺人最甚者。莫如春溫秋痢二症。是非有淺顯歌括。臨時繙檢未易查治。先是有友自蜀中來。攜有成都張子培所著春溫三字訣。頗愜余心。已早付諸石印。獨於痢疾尚未發明。諸家論說俱不足恃。因懇容川續成一卷。合印濟世。孟子云窮則獨善其身。達則兼善天下。方今時局無勞吾輩杞憂。願此刀圭亦名小善。竊推仁術冀拯斯民。伏願醫家急圖變法。病家勿更因循。實余所厚望焉。是為序。

光緒二十一年歲次乙未夏五月夔門鄧其章謹識

成都張子培先生道咸間名醫。以時人往往悞春溫為傷寒。覆轍相循。乃着三字訣。刊行問世。先生墓生宿學有年矣。門人吳士先學博。續刻於富順學署。光緒壬辰。携此書北上。二月十九日抵申。江適聞資州公車。門人李紹西以春溫歿客邸。嗟乎。紹西少顏子六歲。春溫烏足以困之。宮午不幸。未遇馬當風。倘早到浹日。紹西無死理亡之命矣。夫然出河帶本。挽袖海山。房印二千卷。所到散布。商諸業斯術者。子培以名諸生。精研內經。遠紹旁披。數十年淵乎有心得。書中方藥起死回生。已更僕難數。所願仁人君子。無易視之。蒼生幸甚。光緒壬辰上巳。

祥符王宮午錢卿氏題於海上客次

春溫三字訣

成都張子培先生著

夔門鄒其章雲航校印

溫為病雖分類

後世有風溫濕溫暑溫瘟疫等名。方書更創出大頭疔瘡等瘟名。愈多治愈亂。予所論者。風溫也。知此則一以貫之矣。

當顧名思其義

既曰溫則非寒矣。今醫之不能治此。由於不識其名耳。名且不識。從何施治。

仲景書發凡例

仲景太陽篇一節。為溫病之祖。傷寒論中。特為提出立論者。謂此症與傷寒迥異也。不出方者。謂書本為傷寒而作。論少方。少。恐其掛一漏萬也。論多方。多。恐其強賓壓主也。

後之醫仍寒治

劉河間張子和李東垣朱丹溪辨焉不精。語焉不詳。然猶不敢妄用參朮薑附也。至張景岳薛立齋輩則妄用矣。仍是治寒法也。

方藥雜死亡繼

後人九味羌活湯。人參敗毒散。逍遙散。香蘇飲等。皆知不敢用麻桂而設。似已窺見一斑。然而仍用辛溫。百治百死。不過較用參芪朮棗者。差緩須臾耳。傷心目。三字贅。

仲景本論。祇九十二字。字字是溫。字字不是寒。今人以治寒法治溫。百治百死。即有身體強壯。幸而不死者。則有拖延日時。傾破家產。熱邪久留於臟腑。新邪引動於經絡。至他年重感。亦必身死。滔滔皆是。喚醒無從。予目擊心傷。此所以有三字訣之作也。

何謂溫。溫是熱。

既名曰溫。則非寒也。今醫強名此症為寒火。名不正。則言不順。事不成矣。

與傷寒殊懸絕。

如此辨明。而仍以寒法治溫病。用桂枝湯。麻黃湯。葛根湯。小柴胡湯。不肯用心。甘願殺人者。吾知其報在子孫矣。行道者。宜何如之。兢兢哉。

初起時。口渴別。

傷寒初起不渴。溫病初起即渴。以此分別。然溫亦間有不渴者。但渴者多。不渴者少耳。

不惡寒。惟發熱。

仲景云。太陽病。發熱而渴。不惡寒者。名曰溫病。共十六字。予另有註在後。

按漢文簡質。此症初起。多有微惡寒者。斷無不發熱者。但二三日。則全不惡寒。惟發熱矣。此症初起。間有不口渴者。但二三日。斷無不渴矣。且傷寒多左手脉大於右手。溫病脉多右大於左。溫病初起。多兩寸脉大。右寸尤盛。

附子培註仲景原文。單行為原文。雙行為予註。

張子培曰。悟溫病者。古有劉河間等。今有薛生白等。然亦未將太陽病溫病五字分清。夫既曰太陽病矣。何得發熱云云。又曰溫病。今特拈出。以見狂瞽者之千慮一得。

太陽病。或已發熱。或未發熱。必惡寒。前有明發熱而渴。不惟無必惡寒。更如發熱而者。太陽病也。吾得確而指其名曰溫。冬傷於寒。春必病溫。之。

麻杏湯有神力。

用麻黃湯桂枝湯者無論矣。用人參敗毒散逍遙散者亦以五十步笑百步也。亦可無論。即薛一瓢之前胡桑皮鈎藤等。葉天士之桑葉菊花牛蒡等。吳氏祖薛葉二家用銀翹散。桑菊飲可謂此症暗室一燈。然予以謂不如仲景麻杏石甘一方為如神也。故予每用銀翹桑菊二方皆加生麻絨七八分。或一二錢。功效倍於本方百倍。但此症初起麻黃可用。至二三日後舌變胭脂色則風盡化熱矣。麻黃斷斷不可用。用必危殆。以麻黃大熱故也。

或銀翹或桑菊。

銀翹散為辛涼平劑。桑菊飲為辛涼輕劑。白虎湯為辛涼重劑。吳鞠通法也。要甚。

以辛涼解表劑。

或謂傷寒宜解表。溫病忌發汗。夫傷寒解表令出外也。然則溫病忌汗令內入乎。不通之甚。蓋傷寒以辛溫解表。溫病以辛涼解表。解表同而辛溫辛涼大異焉。昧昧者無論矣。乃高明之家亦出此語甚矣。結習之難除也。

誤辛溫變重病

辛溫辛涼乃此症之生死關頭也。時醫畧而不講久矣。

小遷延大殞命。

言誤治之害有如此者。但近日醫家不究見識之非。病家不悟醫人之誤。皆曰生死有命而已。

口大渴津液傷。

此症始終以救津液為主。甘寒法也。陳修園謂四逆湯麻黃附子細辛湯等以附子而救津液。雖在傷寒終屬強解。況溫病乎。今人一見溫病。陽極似陰。妄陳氏言。竟用薑附。着眼着眼。

或白虎承氣湯。

此症若先以辛涼解表。繼以苦甘化陰等法。無不愈矣。因誤治變重。非二湯力不能勝。

雖熱飲亦屬陽。

間有口大渴而飲熱湯。不肯飲冷。且畏飲冷。更有舌為沸湯起泡者。此陽極。

似陰重症也。時醫一見飲熱。皆謂陰症。妄投桂附。下咽立斃。特為拈出。切忌切忌。

治之法。急下良。

急以三承氣湯。選擇用之。或白虎亦有有用者。但此法祇可用在風溫。若別症喜熱。多屬陽虛。本宜薑附。妄用承氣。立斃。慎之。

若譫語。舌紅黃。

此症全憑驗舌。初病多無苔。然舌色必紅。便宜辛涼解之。半表半裡則白入裡則黃。甚則黑色。難治矣。

在包絡。非胃腸。

傷寒譫語。承氣下之。邪在腸胃也。此症邪在包絡也。非一下可解。竟用承氣。誅伐無過也。特為拈出。

用紫雪。清宮湯。

輕症清宮湯。及清絡湯可愈。若重症則不可恃矣。須得紫雪。

與至寶。及牛黃。

紫雪至寶丹。安宮牛黃丸。三方。芳香解穢。清輕透絡。鎮重安神。寒涼退熱。真此症起死回生神方也。

至病久氣液損。

傷寒傷陽。故用甘溫。溫病傷陰。宜用甘寒。甘溫甘寒。又此症之生死關頭也。

切記切記。

宜甘寒補而潤。

如復脉湯。去薑桂大棗。竹葉石膏湯。去半夏。甚去人參。甘寒法也。即喻嘉言清燥救肺湯。亦可間用。若氣液傷損。兼大熱譫語。是體已虛。邪仍實之候。最為危症。予每用炙草五六錢。以大補中氣。生地麥冬各一二兩。以滋陰液。大黃芒硝各四五錢及七八錢。以蕩實邪。應手而愈多矣。但症危如此。必憑脉以驗症。脉弦者生。脉濇者死。脉弦為陰氣未盡。脉濇為陰血已竭。所謂陰症見陰脉是也。

即下利。二甲症。

傷寒下利。非白通四逆不能回陽。此症下利。只用龍牡鎮濇存陰而已。不用

溫補也。然此就久下利而言。故用堵塞法。若在病初。身熱口渴。下利舌黃。胸痞脉數。此溫邪下注大腸之症。所謂協熱而利是也。當用黃芩葛根桔梗豆卷之屬。以升泄溫邪。二症辨之不清。生死立判矣。

變紛更此大概

予所閱歷者。有用大黃七八錢。芒硝四五錢。下至二十餘日而愈者。成都府庠生百善。叙州府庠生張正是也。有先用芒硝大黃三五錢。服一劑而病大增。次日衆謂藥誤。予謂病重藥輕。硝黃各加一二倍而愈者。鹽署典史林竹齋。華陽監生江曉帆是也。有病已大減而為寒阻遏。下不能通。先用理中微加附子一小劑。以驅其陰。腹痛即止。更用六味湯加大黃。以養陰蕩邪。一劑而愈者。則彭雲峯之長子也。有誤汗誤下。誤用滋膩。誤用苦寒。病至十五六日。壯熱不解。予自遠歸。遵喻嘉言先生法。用麻黃附子細辛湯一劑。而熱清去十之八九。後用回陽法。畧帶養陰。施治半年餘而愈者。則予子小培也。按後風溫中百難見者不可輕用凡此者不可勝數。蓋此症變遷極速。極歧。茲不過言其大概。然而會心者。處處與傷寒對看。可即始以見終矣。

知寒溫能涵蓋

凡病不外陰陽。知治傷寒能治陰病矣。知治溫熱能治陽病矣。雖有陽極似陰。陰極似陽。陽七陰三。陰七陽三。陰陽錯雜之不同。而理本一貫。認的陰陽。投無不利矣。

一切病迎刃解。

此二病萬病之綱也。綱舉則目張。萬殊可歸於一本。目張由綱舉。一本可發為萬殊。即以此症而推。彼如吳又可所論之瘟疫。是天地之厲氣。刀兵饑饉之餘。人從口鼻而受者。老子所謂大兵之後。必有凶年是也。其症大寒大熱。口渴身痛。脉浮洪而數。全類傷寒。風溫惟初起滿口。舌苔白而且厚。或有黃色。甚則黑矣。面如油垢。即是。的症。用達原飲如神。且非此無以搗銳而攻堅。彼陳修園吳鞠通舒馳遠輩。竭力訾詆。胡為哉。又如疔瘡瘟疫初起。與寒溫同。惟頭面疔瘡。如無名腫毒。然用銀翹桑菊二方。加減亦效。然不如升降散之靈妙敏捷也。又如濕溫初起。與前三症亦同。但舌上有苔而薄。胸膈痞悶。口渴不喜飲水。即飲亦不能多受。為獨異。或四肢骨節麻木酸疼。法宜辛涼淡

滲。如滑石木通杏仁半夏及苡仁厚朴竹葉菊花荊芥之屬。秋燥初起以肌膚燥燄神氣衰少為獨異。有外感者。蘇葉荊芥薄荷玉竹石膏梨皮麥冬貝母之屬。無外感者。喻氏清燥救肺湯。滋液救焚湯之屬。法宜辛涼清潤。一切外症。可由此正面推。即一切內症。可由此反面推矣。但難為不肯讀書。不肯用心者望也。

〔附方〕

麻杏石甘湯

麻黃 四錢 杏仁 三錢 石膏 八錢 生甘草 二錢

〔張子培按〕分兩必須因病輕重加減。不可竟用古法。

辛涼平劑銀翹散方

連翹 一兩 金銀花 一兩 苦桔梗 六錢 薄荷 六錢 竹葉 四錢

芥穗 四錢 生甘草 五錢 淡豆豉 五錢 牛蒡子 六錢

右杵為散。每服六錢。鮮葦根湯煎。香氣大出。即取服。勿過煮。肺藥取輕清。過煮則味厚。而入中焦矣。病重者。約二時一服。日三服。夜一服。輕者。

三時一服日二服夜一服病不解者作再服蓋肺位最高藥過重則過病所少用又有病重藥輕之患故從普濟消毒飲時時輕揚法今亦間有辛涼法者多不見效蓋病大藥輕之故一不見效遂改絃易轡轉去轉遠即不更張緩延至數日後必成中下焦矣胸膈悶者加藿香三錢鬱金三錢護膈中渴甚者加花粉項腫咽痛者加馬勃元參衄者去芥穗豆豉加白茅根三錢側柏炭三錢梔子炭三錢咳者加杏仁利肺氣二三日病猶在肺熱漸入裡加細生地麥冬保精液再不解或小便短者加知母黃芩梔子之苦寒與麥地之甘寒合化陰氣而治熱淫所勝

〔張子培曰〕按此症初起予用此方每加麻黃一二錢功效倍捷但三四日後舌變紅黃則不可用矣

桑菊飲方

杏仁二錢

連翹一錢

薄荷八分

桑葉二分

苦桔梗二錢

黃菊花一錢

甘草八分

葦根二錢

水二盃煮取一盃日二服二三日不解氣粗似喘躁在氣分者加石膏

知母 舌絳暮熱邪初入營。加元參二錢犀角一錢在血分者去薄荷葦根加麥冬細生地玉竹丹皮各二錢肺熱甚加黃芩渴者加花粉

白虎湯方

石膏 八錢
知母 三錢
生甘草 錢半
白粳米 四錢

調胃承氣湯方

大黃 四錢
炙甘草 二錢
芒硝 二錢

小承氣湯方

大黃 四錢
厚朴 二錢
枳實 一錢

大承氣湯

大黃 四錢
厚朴 三錢
枳實 三錢
芒硝 三錢

紫雪丹

張子培按局方原有黃金百兩更妙

滑石 一斤
石膏 一斤
寒水石 一斤
磁石 一斤
水煎二斤搗煎去渣入後藥

犀角 五兩
沉香 五兩
丁香 一兩
升麻 一斤
元參 一斤
羚羊角 五兩
木香 五兩

炙甘草 半斤
以上八味並搗剉入前藥汁中煎去渣入後藥

朴硝 硝石 各二斤提淨。入煎藥汁中。做火煎。不住手將柳木攪。候汁欲凝。再加入後二味。

長砂

三兩 研細

麝香

一兩二錢 研細入煎藥拌勻

合成退火氣冷水調服一二錢

清宮湯

元參心 三錢

蓮子心 五分

竹葉捲心 三錢

連心麥冬 三錢

連翹心 二錢

犀角尖 二錢 磨沖

加減法。熱痰盛加竹瀝梨汁各五匙。咯痰不清。加括蓼皮一錢五分。熱毒盛加金汁人中黃。漸欲神昏。加銀花三錢。荷葉二錢。石菖蒲一錢。

清絡湯

羚羊角 三錢 川貝母 二錢 連翹 二錢 連心麥冬 四錢 知母 二錢

石斛 二錢 青蒿 二錢 花粉 二錢

至寶丹

犀角 一兩 鎊

硃砂 一兩 飛

琥珀 一兩 研

玳瑁 一兩 鎊

牛黃 五錢 麝香 五錢

以安息重湯燉化。和諸藥為一百丸。蠟護。

安宮牛黃丸

牛黃一兩 鬱金一兩 犀角一兩 黃連一兩 硃砂一兩 梅片二錢

麝香一錢 真珠五錢 山梔一兩 雄黃一兩 黃芩一兩 金箔衣五分

右為極細末。鍊老蜜為丸。每丸一錢。金箔為衣。蠟護。虛者人參湯下。脉實者銀荷薄荷湯下。每服一九。兼治飛尸卒厥。五癰中惡。大人小兒。瘧厥之因於熱者。大人病重體實者。日再服。甚至日三服。小兒服半丸。不知。再服半丸。

復脉去姜桂湯

炙甘草六錢 乾生地六錢 生白芍六錢 麥冬五錢 存心 阿膠三錢 火麻仁三錢

竹葉石膏去參半湯

鮮竹葉三十片 石膏八錢 麥冬五錢 存心 炙草二錢 梗米八錢

清燥救肺湯

霜桑葉三錢 石膏二錢 半煨 甘草一錢 生 黑芝麻三錢 人參七分

麥冬一錢半 杏仁一錢 皮火 去 真阿膠一錢 枇杷葉一錢 炙