

临床执业医师专家 命题预测试卷

主 编 刘 枫



人民军医出版社

国家执业医师资格考试(含部队)推荐辅导用书

临床执业助理医师专家命题预测试卷

LINCHUANG ZHIYE ZHULI YISHI ZHUANJIA MINGTI
YUCE SHIJUAN

主 编 刘 枫

副主编 潘科聪 刘小同

编 者 (以姓氏笔画为序)

马 贞	马 超	马 崑	王 丹	王子熹
王玉静	王永宁	王延伟	王宗玉	王健仰
王海丹	毛锦龙	文 平	石 娟	刘 宁
刘 枫	刘 璐	刘小同	刘向宇	刘佛民
刘洪慧	刘梦玉	孙 谏	孙 煜	孙国哲
吴春虎	沈丽萍	宋文良	陆轶凡	罗 飞
袁海洋	唐晓燕	彭德志	童 珑	满高华
谭 强	潘科聪			



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

临床执业助理医师专家命题预测试卷 / 刘 枫主编. —北京: 人民军医出版社, 2013.1
ISBN 978-7-5091-6393-1

I. ①临… II. ①刘… III. ①临床医学—医师—资格考试—习题集 IV. ①R4-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 013543 号

策划编辑: 张 晶 文字编辑: 陈 卓 责任审读: 刘 平
出版发行: 人民军医出版社 经销: 新华书店
通信地址: 北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编: 100036
质量反馈电话: (010)51927290; (010)51927283
邮购电话: (010)51927252
策划编辑电话: 51927300—8162
网址: www.pmp.com.cn

印刷: 三河市世纪兴源印刷有限公司 装订: 京兰装订有限公司
开本: 787mm×1092mm 1/16
印张: 7 字数: 131 千字
版、印次: 2013 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
印数: 0001—5000
定价: 19.00 元

版权所有 侵权必究
购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换

出版说明

国家执业医师资格考试是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的行业准入考试。考试分为两级四类，即执业医师和执业助理医师两级；每级分为临床、中医、口腔、公共卫生四类。中医类包括中医、民族医和中西医结合。

医师资格考试分为实践技能考试和医学综合笔试两部分，实践技能考试一般在每年的7月举行，医学综合笔试于9月中旬举行，具体时间以卫生部医师资格考试委员会公告时间为准。执业医师考试时间为2天，分4个单元；执业助理医师考试时间为1天，分2个单元，每单元均为两个半小时。笔试全部采用选择题形式，共有A₁、A₂、A₃、A₄、B₁五种题型。助理医师适当减少或不采用A₃型题。医师资格考试总题量为600题，助理医师资格考试总题量为300题。

根据卫生部医考办2010年6月公布的数据，截至2009年，全国共有577万人次参加执业医师资格考试，188万人次通过，10年来的总体通过率为32.58%。全国每年参加考试总人数从1999年的不足20万人增加到目前的每年80万人左右，参考人数翻了两番，但目前每年通过考试的人数基本保持在20万人左右，通过率只有不足30%。与考试最初的几年相比，近年来的合格分数线有较大幅度提高，可见考试难度在逐年加大。

2009年，卫生部医师资格考试委员会批准实施新修订的《医师资格考试大纲（2009年）》。考试新大纲改变了过去以传统学科为基础的考试模式，采用了按系统、疾病为基础的考试模式，对学科进行了整合，加强考查考生动手操作能力和综合运用所学知识解决问题的能力。但大纲编排结构和顺序与传统学科划分不符，增加了复习的难度。

为了帮助广大考生做好考前复习，我社近年来组织了权威专家，联合历届考生，对考试的命题规律和考试特点进行了精心分析研究，严格按照考试大纲的要求，出版了这套国家执业医师资格考试辅导用书，共3大系列，分别为《历年考点精编》系列、《模拟试卷（解析）》系列、《考前冲刺必做》系列，每个系列8本书，覆盖了除民族医、公共卫生以外的4大类8个考试专业。根据全国广大军地考生的需求，经国家和军队相关部门认可，作为国家执业医师资格考试（含部队）的推荐辅导用书。

“国家执业医师资格考试（含部队）推荐辅导用书”紧扣考试大纲，以历年考点为编写的基本依据，内容的安排既考虑知识点的全面性，又特别针对历年考试通过率不高的现状，重点加强复习的应试效果，使考生在有限时间内扎实掌握大纲要求及隐含的重要知识点，从整体上提高考试的通过率。

《历年考点精编》系列的突出特点，是在分析了数千道考试题的基础上，紧紧围绕历年考点编写，提示考试重点；以条目式的简洁叙述宣讲考试命题点，重点、易考点一目了然。

《模拟试卷（解析）》系列。每个考试专业有4~5套卷。这个系列的突出特点，是试题质量非常高，题量适中，贴近真实考试的出题思路及出题方向，附有详尽解析，通过做题把

握考试复习的重点和方向。

《考前冲刺必做》系列。每个考试专业有3~4套卷。这个系列的突出特点，是在分析历年考试的基础上，总结历年必考重点，抽选高频考点组题，通过冲刺练习，使考生熟悉考试，得到考试必得分。

本套考试用书对考试知识点的把握非常准确，试题与真实考试最接近，对考生通过考试一定会有很大的帮助。由于编写及出版的时间紧、任务重，书中如有不足，请读者批评指正。

人民军医出版社

试卷标识码:

临床执业助理医师专家命题预测试卷 (卷一)

报考类别: 临床执业助理医师

考试日期: ××××年×月

考试时间:

考生姓名_____

准考证号_____

考场号_____

 人民军医出版社
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北京

第一单元

【A1 型题】

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 胎儿期是指
 - A. 从受精开始约为 38 周
 - B. 从受精开始约为 40 周
 - C. 从受精开始约为 42 周
 - D. 从末次月经第 1 天算起为 43 周
 - E. 从末次月经第 1 天算起为 44 周
2. 下列何者为卡介苗的初种年龄
 - A. 2 天至 2 个月
 - B. 3 天至 3 个月
 - C. 4 天至 4 个月
 - D. 5 天至 5 个月
 - E. 6 天至 6 个月
3. 下列足月新生儿特点，哪项不正确
 - A. 出生后第 1 小时内呼吸率可达 60~80 次/分
 - B. 血压平均为 9.3/6.7kPa
 - C. 出生后 24 小时后排胎粪
 - D. 具备拥抱反射
 - E. 巴氏征阳性
4. 中度营养不良时其体重是同性别、同身高参照人群值的中位数以下哪项
 - A. -1SD~-2SD
 - B. -2SD
 - C. -2SD~-3SD
 - D. -3SD
 - E. -3SD~-4SD
5. 婴幼儿秋冬季腹泻的最常见病原是
 - A. 腺病毒
 - B. 诺沃克病毒
 - C. 轮状病毒
 - D. 埃可病毒
 - E. 柯萨奇病毒
6. 中度脱水的临床表现下列哪项是不正确的
 - A. 失水量为体重的 5%~10%
 - B. 皮肤弹性较差
 - C. 眼窝、前囟明显凹陷
 - D. 四肢厥冷
 - E. 尿量明显减少
7. 支气管肺炎肾上腺皮质激素常用下列哪项
 - A. 氢化可的松
 - B. 泼尼松
 - C. 泼尼松龙
 - D. 甲泼尼龙
 - E. 地塞米松
8. 支气管肺炎一般用鼻前庭导管，氧流量为
 - A. 0.25~0.5L/分
 - B. 0.5~1L/分
 - C. 1~2L/分
 - D. 2~3L/分
 - E. 3~4L/分
9. 室间隔缺损患儿有时出现声音嘶哑，其原因是
 - A. 扩张的右心房压迫喉返神经
 - B. 扩张的左心房压迫喉返神经

- C. 扩张的主动脉压迫喉返神经
D. 扩张的肺动脉压迫喉返神经
E. 扩张的左、右心房压迫喉返神经
10. 单纯性肾病下列哪项意义最大
A. 高度水肿
B. 血胆固醇明显升高
C. 红细胞沉降率增快
D. 补体 C₃ 下降
E. 选择性蛋白尿
11. 骨髓分离是属于
A. 先天性骨发育不良
B. 骨折
C. 关节脱位
D. 骨肿瘤
E. 骨髓炎的一种类型
12. 根据骨折是否与外界相通, 可把骨折分为
A. 损伤性骨折和病理性骨折
B. 稳定性骨折和不稳定性骨折
C. 压缩性骨折和横断形骨折
D. 完全性骨折和不完全性骨折
E. 闭合性骨折和开放性骨折
13. 发生脱位率最高的关节是
A. 肩关节
B. 肘关节
C. 髋关节
D. 膝关节
E. 骶髂关节
14. 关节脱位的特有体征是
A. 疼痛与压痛
B. 反常活动
C. 运动消失
D. 关节面外露
E. 弹性固定
15. 髋关节后脱位的体征是
A. 患侧下肢短缩, 外旋
B. 患侧下肢外展, 外旋, 屈曲
C. 患侧下肢短缩
D. 患侧下肢短缩, 屈曲, 内收, 内旋
E. 患侧下肢过伸
16. 在下列引起肝脏脂肪变性的原因中, 哪项是**错误**的
A. 营养障碍
B. 败血症
C. 缺氧
D. 乙型病毒性肝炎
E. 四氯化碳中毒
17. 缺铁性贫血的改变顺序是
A. 低血清铁→骨髓贮存铁减少→贫血
B. 低血清铁→贫血→骨髓贮存铁减少
C. 骨髓贮存铁减少→贫血→低血清铁
D. 贫血→骨髓贮存铁减少→低血清铁
E. 骨髓贮存铁减少→低血清铁→贫血
18. 再生障碍性贫血最主要的诊断依据是
A. 全血细胞减少, 有出血或感染表现
B. 网织红细胞减少
C. 骨髓增生不良
D. 肝、脾淋巴结不肿大
E. 铁剂、叶酸治疗无效
19. 正常止血决定于下列哪项因素
A. 血小板的质和量及血管壁的正常
B. 皮肤完整性和凝血因素的正常
C. 血小板的质和量及血管壁和凝血因素的正常
D. 血小板的质和量正常, 凝血因素正常
E. 凝血因素正常, 骨髓象正常, 血小板质和量正常
20. 诊断急性白血病的依据主要是
A. 全血细胞减少
B. 发热、感染、出血严重, 肝脾肿大
C. 外周血可见幼稚细胞
D. 骨髓中大量原始细胞增生
E. 骨髓增生极度活跃
21. 急性白血病发生贫血的最主要因素是
A. 骨髓造血受白血病细胞干扰

- B. 脾大, 破坏红细胞过多
 C. 化疗后胃肠功能紊乱, 营养缺乏
 D. 严重皮肤黏膜及内脏出血
 E. 产生抗红细胞抗体
22. 慢性粒细胞白血病最常见的治疗药物是
 A. 羟基脲
 B. 环磷酰胺
 C. 6-巯基嘌呤 (6-MP)
 D. 甲氨蝶呤 (MTX)
 E. 氮芥
23. 流行性乙型脑炎, 病变最轻的部位是
 A. 脊髓
 B. 延髓束
 C. 脑桥
 D. 基底节
 E. 小脑
24. 下列哪种肝炎病毒基因组为 DNA
 A. 甲型肝炎
 B. 乙型肝炎
 C. 丙型肝炎
 D. 丁型肝炎
 E. 戊型肝炎
25. 下列哪种说法是错误的
 A. 急性发作的刺激性干咳常为上呼吸道感染引起
 B. 体位改变时咳痰加剧, 常见于肺脓肿
 C. 支气管肺癌初期常出现干咳
 D. 夜间阵发性咳嗽可见于左心衰竭者
 E. 支气管哮喘不应有阵发性咳嗽, 而呈发作性喘息
26. 阻塞性通气功能障碍的特征为
 A. 肺活量↓
 B. FEV₁/FVC↓
 C. 肺总量上↓
 D. 残气量↓
 E. 最大呼气中期流速正常
27. 与慢性支气管炎发病有关的最常见的细菌为
 A. 流感嗜血杆菌、肺炎球菌、甲型链球菌、葡萄球菌
 B. 甲型链球菌、肺炎球菌、流感嗜血杆菌、奈瑟球菌
 C. 肺炎链球菌、奈瑟球菌、流感嗜血杆菌、β-溶血性链球菌
 D. 肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、葡萄球菌
 E. 金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、厌氧菌
28. 慢性支气管炎病人的自主神经功能失调是
 A. 交感神经功能减退
 B. β受体功能亢进
 C. 受体功能亢进
 D. 副交感神经功能亢进
 E. M受体功能亢进
29. 严重支气管哮喘发作病人, 应用支气管舒张药疗效不好的最主要原因为
 A. 未并用激素
 B. 伴呼酸或代酸
 C. 缺氧
 D. 感染未控制
 E. 产生耐药
30. 支气管哮喘病人 PaCO₂增高, 表示
 A. 没有临床意义
 B. 病情好转
 C. 病情严重
 D. 发作早期
 E. 呼吸性碱中毒
31. 阻塞性肺气肿最常见的病因是
 A. 支气管哮喘
 B. 支气管扩张
 C. 慢性支气管炎
 D. 重症肺结核
 E. 肺尘埃沉着病 (尘肺)
32. 小叶中央型肺气肿的病理改变特点是
 A. 呼吸性细支气管扩张, 外周正常

- B. 终末细支气管以下结构全部扩张
- C. 肺泡管、肺泡囊、肺泡扩张
- D. 肺小叶和肺泡囊扩张
- E. 呼吸性细支气管破坏, 肺泡破裂

33. 慢性肺源性心脏病常见的原因疾病是

- A. 肺脓肿
- B. IV型肺结核
- C. 脊柱严重畸形
- D. 支气管扩张症
- E. 慢性支气管炎

34. 关于子宫的解剖, 下述哪项正确

- A. 成年的子宫长 7~8cm, 宽 4~5cm, 厚 2~3cm
- B. 成年人子宫体与子宫颈的比例为 1:2
- C. 子宫峡部的黏膜无周期性变化
- D. 子宫颈主要由平滑肌构成
- E. 成年妇女子宫颈管长 4~5cm

35. 维持子宫正常位置的是

- A. 盆底肌肉及筋膜的支托作用
- B. 膀胱和直肠的支托
- C. 子宫韧带和盆底肌肉筋膜的支托
- D. 子宫四对韧带的作用
- E. 腹腔压力作用

36. 正常妇女排卵的时间一般在

- A. 两次月经中间
- B. 下次月经来潮前 12 天左右
- C. 下次月经来潮前 14 天左右
- D. 本次月经干净后 14 天左右
- E. 本次月经来潮后 14 天左右

37. 月经血不凝的原因是

- A. 先凝固后纤溶
- B. 缺乏凝血因子
- C. 月经毒素抑制凝血
- D. 肝素的作用
- E. 血小板较少

38. 卵子受精是在输卵管的

- A. 质部

- B. 峡部
- C. 内侧 1/4 处
- D. 壶腹部与峡部连接处
- E. 伞部

39. 目前多数同意的围生期概念是

- A. 妊娠 20 周至产后 28 天
- B. 妊娠 28 周至产后 28 天
- C. 妊娠 28 周至产后 7 天
- D. 妊娠 24 周至产后 14 天
- E. 妊娠 24 周至产后 7 天

40. 孕妇尿妊娠试验开始出现阳性反应, 一般是在末次月经后的

- A. 31~40 天
- B. 41~50 天
- C. 51~60 天
- D. 61~70 天
- E. 71~80 天

41. 在孕妇腹壁上听诊, 与母体心率一致的音响是

- A. 胎心音
- B. 脐带杂音
- C. 子宫杂音
- D. 胎动音
- E. 肠蠕动感

42. 主要的产力是

- A. 腹肌收缩力
- B. 肛提肌收缩力
- C. 膈肌收缩力
- D. 圆韧带收缩力
- E. 子宫收缩力

43. 系统性红斑狼疮 (SLE) 病人典型的面部表现为

- A. 痤疮
- B. 湿疹
- C. 蝶形红斑
- D. 色素沉着
- E. 紫癜

44. 脑血管病常见病因下列哪项不正确
- 脑血管病最常见原因是动脉粥样硬化
 - 先天性动脉瘤是蛛网膜下腔出血最常见病因
 - 脑梗死最常见病因是脑动脉炎
 - 心源性栓子是脑栓塞最常见的栓子来源
 - 高血压病是脑出血最常见病因
45. 神经系统的组成下列哪项正确
- 包括大脑半球和小脑两部分
 - 包括中枢神经系统和周围神经系统两部分
 - 包括锥体系统和锥体外系统两部分
 - 包括运动系统和感觉系统两部分
 - 包括大脑、小脑和脑干三部分
46. 关于特发性面神经麻痹正确的是
- 女性多见
 - 通常是亚急性发病
 - 双侧多见
 - 贝尔现象阳性
 - 多数患者不能恢复
47. 急性横贯性脊髓炎最常损害脊髓的
- 颈膨大部
 - 胸 3~5 节段
 - 胸 7~10 节段
 - 腰膨大部
 - 圆锥部
48. 关于急性脑血管病的病因, 下列哪项是不正确的
- 脑出血最常见的病因是高血压和动脉硬化
 - 脑栓塞最常见的病因是风湿性心脏病合并房颤或其他的心源性栓子脱落
 - 脑血栓形成最常见病因是动脉炎
 - 蛛网膜下腔出血最常见病因是先天性颅内动脉瘤
 - 短暂性脑缺血发作最常见病因是动脉粥样硬化
49. 脑出血最常见的原因是
- 脑动脉炎
 - 高血压和脑动脉硬化
 - 血液病
 - 脑动脉瘤
 - 脑血管畸形
50. 蛛网膜下腔出血最常见的病因是
- 高血压病
 - 血液病
 - 脑动脉粥样硬化
 - 先天性颅内动脉瘤
 - 脑血管畸形
51. 癫痫持续状态必须是
- 全面强直阵挛发作频繁发生, 持续 24 小时
 - 连续的失神发作
 - 局部抽搐持续数小时或数日
 - 发作自一开始, 按大脑皮质运动区逐渐扩展
 - 全面强直阵挛发作频繁发生, 伴意识持续不清
52. 下列哪项可导致吸气性呼吸困难
- 喉头水肿
 - 支气管哮喘
 - 慢性支气管炎
 - 阻塞性肺气肿
 - 左心功能不全
53. 下列哪项疾病是咯血最常见的原因
- 肺淤血
 - 房间隔缺损 (ASD)
 - 肺结核
 - 支气管腺瘤
 - 肺梗死
54. 病毒性心肌炎属哪类心血管病
- 动脉粥样硬化
 - 风湿性心脏病
 - 内分泌性心脏病
 - 营养代谢性心脏病
 - 感染性心脏病
55. 致密斑位于
- 入球小动脉

- B. 远曲小管
- C. 出球小动脉
- D. 肾小球血管襻
- E. 皮质部髓襻

56. 多尿的定义是 24 小时尿量多于

- A. 1500ml
- B. 2000ml
- C. 2500ml
- D. 3000ml
- E. 3500ml

57. 下列哪项是加速肾小球疾病肾功能损害最重要的原因

- A. 水肿
- B. 蛋白尿
- C. 血尿
- D. 贫血
- E. 高血脂

58. 以下哪组为诊断肾病综合征所必需的

- A. 大量蛋白尿+血尿
- B. 大量蛋白尿+低蛋白血症
- C. 低蛋白血症+贫血
- D. 水肿+高脂血症
- E. 水肿+高血压

59. 诊断尿路感染下列哪项最有意义

- A. 畏寒、发热、白细胞增多
- B. 尿频、尿急、尿痛
- C. 清洁中段尿白细胞 >5 个/HP
- D. 尿培养菌落计数 $>10^5$ /ml
- E. 尿亚硝酸盐还原试验阳性

60. 慢性肾功能不全尿毒症期 Cr 应是

- A. $Cr > 707 \mu\text{mol/L}$
- B. $Cr < 178 \mu\text{mol/L}$
- C. $Cr > 884 \mu\text{mol/L}$
- D. $Cr > 178 \mu\text{mol/L}$
- E. $Cr > 445 \mu\text{mol/L}$

61. 治疗尿毒症心功能不全的最有效的方法是

- A. 利尿
- B. 强心
- C. 扩张血管
- D. 降压
- E. 超滤透析

62. 下列哪种因素首先参与了肾小球疾病的发病机制

- A. 循环免疫复合物
- B. 系统性红斑狼疮时机体的 DNA
- C. 肾小球系膜细胞
- D. 血小板
- E. 补体

【A2 型题】

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

63. 儿童保健门诊中，家长前来咨询，什么时候开始接种脊髓灰质炎疫苗

- A. 1 个月
- B. 2 个月
- C. 3 个月
- D. 4 个月
- E. 5 个月

64. 一新生儿，胎龄 36 周，出生后 3 小时出现呼吸困难，发绀，伴呼气性呻吟、吸气性三凹征，呈进行性加重，双肺听诊呼吸音减弱，诊断最大可能是

- A. 羊水吸入性肺炎
- B. 胎粪吸入性肺炎
- C. 新生儿肺透明膜病
- D. 产后感染性肺炎

E. 新生儿败血症

65. 患儿 10 个月，方颅，多汗，胸部肋膈沟，血钙稍低，血磷低，X 线可见骨骺软骨盘增宽，干骺端临时钙化带消失，呈毛刷样改变，诊断为

- A. 佝偻病初期
- B. 佝偻病激期
- C. 佝偻病恢复期
- D. 佝偻病后遗症期
- E. 软骨发育不全

66. 患儿，男，11 个月，发热咳嗽 3~4 天，食后呕吐，腹泻 5~6 次/天，蛋花汤样便，T39℃，P140 次/分，R60 次/分，神萎，气促，唇周发绀，口唇干燥，心音弱，两肺底湿啰音，腹部皮肤弹性减退。血气分析：血 pH 为 7.24，PaCO₂ 40mmHg，SB 18mmol/L，AB >SB，BB 40mmol/L，应考虑为

- A. 代谢性酸中毒，代偿性
- B. 呼吸性酸中毒，代偿性
- C. 呼吸性酸中毒，失代偿性
- D. 代谢性酸中毒，失代偿性
- E. 代谢性合并呼吸性酸中毒

67. 患儿女，6 个月，突然出现极度烦躁不安，呼吸困难加重。查体：P 191 次/分，R69 次/分，精神不振，唇周明显发绀，面色苍白，心音低钝，双肺叩诊正常，可闻及较密集的细湿啰音，肝肋下 3.5cm，中度硬。本病例诊断最大的可能是

- A. 支气管肺炎合并心肌炎
- B. 支气管肺炎合并中毒性脑病
- C. 支气管肺炎合并心力衰竭
- D. 支气管肺炎合并中毒性肠麻痹
- E. 支气管肺炎合并新生儿缺氧缺血性脑病 (HIE)

68. 患儿 6 岁，经常咳嗽气促，不爱玩耍，活动后乏力。体检：发育落后，胸骨左缘第 2、3 肋间闻及Ⅲ级收缩期杂音，无震颤，传导范围小，P₂亢进伴固定分裂。X 线胸片：

右心房右心室增大，肺动脉段突出，肺野充血，最可能的诊断是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

69. 10 个月女婴，单纯母乳喂养，面色渐苍白 2 个月，烦躁，食欲不佳，不愿活动，肝肋下 2cm，脾肋下可触及边缘，HB 70g/L，RBC $3.6 \times 10^{12}/L$ ，MCV 70fl，MCH 23pg，MCHC 29%，最可能的诊断是

- A. 营养性巨幼红细胞性贫血
- B. 营养性缺铁性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 地中海性贫血
- E. 铁粒幼红细胞性贫血

70. 患儿 8 岁，水肿 4 天，尿少如浓茶色，伴头痛、视物模糊，呕吐，一过性失明，血压 170/120mmHg，尿蛋白 (+)，红细胞 20 个/HP，颗粒管型 0~1 个/HP，最可能的诊断是

- A. 急进性肾小球肾炎
- B. 急性肾炎高血压脑病
- C. 慢性肾炎肾功能不全
- D. 急性肾炎循环充血
- E. 肾炎性肾病

71. 患儿女，12 岁，持续发热 10 天，膝踝关节无固定疼痛，乏力，食欲缺乏，查体：咽部充血，腭扁桃体Ⅱ度肿大，面色苍白，关节无肿胀及变形，心尖区舒张期杂音，既往健康，最可能的诊断是

- A. 器质性二尖瓣狭窄
- B. 先天性心脏病
- C. 功能性杂音
- D. 心脏炎
- E. 发热所致

72. 胫骨开放性骨折，清创与石膏固定后 36

小时，患者高热，脉快，伤口剧痛，大量恶臭渗出液，X线平片示皮下有气体，应首先考虑为

- A. 血肿吸收
- B. 组织坏死
- C. 伤口化脓菌感染
- D. 气性坏疽
- E. 骨筋膜室综合征

73. 患者女，18岁。右上肢内收位跌倒，右肘部触地。右肩疼痛，活动障碍。查体右上臂呈内收畸形，右肩部肿胀，稍下方有明显压痛，X线平片显示右肱骨外科颈骨折为内收型，其骨折断端的移位是

- A. 向内成角
- B. 外成角
- C. 向后成角
- D. 前成角
- E. 无成角畸形

74. 一工人于建筑工地右侧大腿被砸伤，当即不能站立，局部疼痛剧烈，用哪种最简易、最安全、最迅速、最无痛苦的方法，确定有否骨干骨折

- A. 检查有无神经损伤
- B. 有否骨摩擦者
- C. 有否异常活动
- D. 听诊
- E. 有否纵向压痛

75. 有一病人，检查时发现股四头肌稍有收缩，但不能引起膝关节活动，这时肌力应是

- A. 0级
- B. 1级
- C. 2级
- D. 3级
- E. 4级

76. 患者男，26岁。左上肢外展位跌倒，手掌触地，当即左肩肿痛。查体左肩部饱满，但局部稍下方凹陷，有明显压痛，患肩活动功能障碍。最可能的诊断是

- A. 左肩关节前脱位
- B. 左肩关节后脱位
- C. 肱骨外科颈骨折外展型
- D. 肱骨外科颈骨折内收型
- E. 肱骨外科颈骨折合并关节脱位

77. 某老人跌倒后右髌部痛，步行至附近医院就诊，经X线摄片见有外展嵌插型股骨颈骨折。此时正确的治疗措施是

- A. 持续皮牵引固定6~8周
- B. 皮牵引6~8周后手术，三根空心钉内固定
- C. 立即手术及三根空心钉内固定
- D. 小夹板同定
- E. 完全不必处理，听其自然

78. 慢性骨髓炎患者，发现贫血，红细胞为正常细胞型，血清铁450μg/L，总铁结合力2000μg/L，骨髓细胞外铁(++)，其贫血症诊断为

- A. 缺铁性贫血
- B. 营养性巨幼红细胞性贫血
- C. 慢性感染性贫血
- D. 失血性贫血
- E. 铁粒幼红细胞性贫血

79. 患者男，19岁，头晕、乏力3个月，HB 58g/L，WBC $3.8 \times 10^9/L$ ，PLT $50 \times 10^9/L$ ，胸骨穿刺有核细胞增生活跃，各系细胞形态正常，需再做哪项检查

- A. 髂骨穿刺
- B. 脊髓穿刺
- C. 复查血常规
- D. 骨髓染色
- E. 红细胞铁染色

80. 一出血患者，PT(一期法)20秒，加正常血浆为12秒，凝血酶时间正常，最大可能的诊断是

- A. 纤维蛋白原缺乏症
- B. 第V因子缺乏症
- C. 凝血酶原缺乏症
- D. 第VIII因子缺乏

E. 第X因子缺乏

81. 患者发热、无力、食欲缺乏、腹痛，以左下腹明显，腹泻早期稀便，大便次数增多后转为黏液脓血便，并有里急后重。应诊断为

- A. 急性胃肠炎
- B. 急性细菌性痢疾
- C. 肠伤寒
- D. 食物中毒
- E. 肠阿米巴痢疾

82. 一位血吸虫肝硬化病人，无黄疸，也无蜘蛛痣，肝肋缘下1cm，质硬，表面无明显结节，脾大下缘平脐、质硬，经常有鼻出血及牙龈、皮肤黏膜出血。出血的机制是

- A. 凝血因子Ⅶ合成减少
- B. 纤维蛋白原减少
- C. 凝血因子X减少
- D. 脾功能亢进破坏血小板
- E. 凝血酶原减少

83. 患者男，58岁，慢性咳嗽、咳痰10余年，测VC为预计值的85%，FEV₁/FVC为52%，此肺功能改变可能是

- A. 正常
- B. 限制性通气功能障碍
- C. 阻塞性通气功能障碍
- D. 混合性通气功能障碍
- E. V/Q比例失调

84. 患者男，20岁，因反复喘息而求医，自诉发病常在春季，为突然发作呼吸困难，咳嗽，咳出白色黏痰后气促减轻，喘息停止。血象检查有嗜酸粒细胞增多，IgE增高，应诊断为

- A. 内源性哮喘
- B. 喘息性支气管炎
- C. 外源性哮喘
- D. 混合性哮喘
- E. 心源性哮喘

85. 患者男，65岁，突然呼吸困难，喘息，大汗，咳嗽，肺有哮鸣音及湿性啰音，心电图示左心室肥厚劳损，应首选考虑为

- A. 支气管哮喘
- B. 过敏性肺炎
- C. 心源性哮喘
- D. 喘息型慢性支气管炎
- E. 支气管肺癌感染

86. 肺气肿患者，如剑突下出现心脏搏动及其心音较心尖部位明显增强时，提示

- A. 并发先天性心脏病
- B. 并发高血压性心脏病
- C. 并发甲状腺功能亢进性心脏病
- D. 并发早期肺源性心脏病
- E. 并发风湿性心脏病

87. 患者女，60岁，活动后气短10余年，用辅助呼吸肌努力呼吸，颈静脉略充盈，桶状胸，轻度发绀，听诊呼吸音弱，呼气延长，肝颈回流征阴性，血气：PaO₂50mmHg、PaCO₂38mmHg、pH 7.39，下列哪项结果是不恰当的

- A. 1秒率下降
- B. 残气量上升
- C. 换气功能减退为主
- D. 静脉压上升
- E. X线胸片呈明显肺气肿征

88. 患者男，65岁，慢性支气管炎30年，近3年来下肢水肿，平时活动气短，3天前受寒后加重，神志恍惚，嗜睡，血气分析pH 7.15，PaCO₂ 80mmHg，PaO₂ 45mmHg，BE-10mmol/L，HCO₃⁻20mmol/L，此结果符合

- A. 呼酸失代偿期
- B. 呼酸代偿期
- C. 呼酸+代碱
- D. 代碱+代酸
- E. 呼酸+代酸

89. 患者女，发热1周，体温38.5~39.5℃，周身痛，近两天轻微咳嗽，无痰。查体：胸

部无异常体征，肝大右肋下 2cm，脾大左肋下 1cm，WBC $7.0 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.60，淋巴细胞 0.40，ESR70mm/h，痰结核菌涂片（-），血细菌培养（-），肥达反应（-），X线胸片两肺可见细小等大，均匀分布的粟粒样阴影，诊断最可能是

- A. 伤寒
- B. 败血症
- C. 急性血行播散型肺结核
- D. 细支气管-肺泡细胞癌
- E. 肺源性心脏病

90. 胸腔积液患者，胸腔积液检查：比重 1.018，蛋白 27g/L，李凡他试验阳性，RBC $2 \times 10^9/L$ ，WBC $610 \times 10^6/L$ ，细菌阴性，积液的性质应首先考虑为

- A. 漏出性胸腔积液
- B. 血性胸腔积液
- C. 渗出性胸腔积液
- D. 乳糜性胸腔积液
- E. 化脓性胸腔积液

91. 初产妇，妊娠 40 周，产程进展 24 小时，宫口开大 4cm，给予肌肉注射缩宫素 2U，宫缩持续不缓解，胎心率为 90~100 次/分，耻骨联合以上有压痛，应考虑是

- A. 胎盘早期剥离
- B. 先兆子宫破裂
- C. 子宫收缩过强
- D. 高张性子宫收缩乏力
- E. 痉挛性子宫收缩

92. 一产妇分娩，胎盘滞留，经人工剥离胎盘，产后出现寒战、高热，持续下腹疼痛，放射至腹股沟及肋脊角。腹部检查：下腹软，但有左侧深压痛，子宫活动受限制，移动时感左上腹疼痛加重，本例最可能的诊断是

- A. 急性输卵管炎
- B. 急性盆腔结缔组织炎
- C. 急性盆腔腹膜炎
- D. 盆腔内血栓性静脉炎

E. 急性子宫内膜炎

93. 52 岁妇女，盆浴后白带多，外阴痒伴尿频，阴道黏膜有散在出血点，后穹窿有多量黄色泡沫状分泌物，诊断为

- A. 老年性阴道炎
- B. 真菌性阴道炎
- C. 淋菌性阴道炎
- D. 滴虫性阴道炎
- E. 细菌性阴道炎

94. 初孕妇，末次月经第一天为 4 月 21 日，持续 6 天，于 12 月 29 日就诊。腹部检查：子宫底在剑突下 2 横指，枕右前位胎心 140 次/分，血压 16/10.3kPa，尿蛋白（-），本病例现在是

- A. 妊娠满 35 周，子宫底高度符合正常情况
- B. 妊娠满 36 周，子宫底高度低于正常情况
- C. 妊娠满 36 周，子宫底高度符合正常情况
- D. 妊娠满 36 周，子宫底高度高于正常情况
- E. 妊娠满 37 周，子宫底高度高于正常情况

95. 心脏病患者，现妊娠 8 周，出现急性心力衰竭，最好的处理方法是

- A. 即刻终止妊娠
- B. 控制心力衰竭后，继续妊娠
- C. 控制心力衰竭后，吸宫终止妊娠
- D. 控制心力衰竭后，剖宫取胎，终止妊娠
- E. 边控制心力衰竭，边终止妊娠

96. 初孕，临产后子宫收缩时间短，间歇时间长，宫缩规律，宫口不能如期扩张，应诊断为

- A. 原发性子宫收缩无力
- B. 继发性子宫收缩无力
- C. 子宫不协调收缩
- D. 假临产
- E. 子宫收缩过强

97. 患者男，50 岁，右侧额纹消失，右侧眼睑不能闭合，右侧鼻唇沟变浅，露齿时口角偏向左侧，可能是

- A. 右侧中枢性面神经麻痹
- B. 左侧中枢性面神经麻痹
- C. 右侧周围性面神经麻痹
- D. 左侧周围性面神经麻痹
- E. 双侧周围性面神经麻痹

98. 患者 60 岁，走路时双脚有踩棉花感，睁眼站立稍不稳，Romberg 征极明显，双下肢音叉振动觉丧失，病变在

- A. 小脑
- B. 脊髓后索
- C. 脊髓侧索
- D. 脊髓后角
- E. 大脑额叶

99. 患者男，22 岁。受寒感冒后心慌气短。端坐呼吸，面色灰白，大汗淋漓，惊恐不安，咳粉红色泡沫样痰。两肺底湿啰音、心率快、脉细数、皮肤湿冷/血压下降、心尖部闻及奔马律及舒张期隆隆样杂音，其原因为

- A. 急性心肌梗死
- B. 急性左心衰竭
- C. 心源性休克
- D. 急性大叶性肺炎
- E. 肺梗死

100. 女性，28 岁。劳累后心悸气促伴反复咯血 4 年，近来加重，夜间不能平卧。查体：心尖部舒张期隆隆样杂音，肺底可听到细小水泡音。下列哪项治疗是**错误**的

- A. 静脉滴注低分子右旋糖酐
- B. 静脉注射呋塞米
- C. 吸氧
- D. 口服二硝酸异山梨醇酯
- E. 口服地高辛

101. 患者男，62 岁，2 天来反复短暂神志不清，伴尿失禁，抽搐 3 次。既往无类似发作。无夜间阵发性呼吸困难及水肿史。心率 30 次/分，规则，第一心音强弱不等，血压 180/80mmHg。最可能的诊断是

- A. 高血压脑病

- B. 窦性心动过速
- C. 二度 2:1 房室传导阻滞
- D. 三度房室传导阻滞伴 Adams-Stokes 综合征发作
- E. 癫痫大发作

102. 患者女，25 岁。心悸气短已数年，近 2 年加重。查体：心尖区听到舒张期隆隆样杂音，心律失常。M 型超声心动图示二尖瓣前叶曲线 EF 斜率降低、A 峰消失、后叶前向移动和瓣叶增厚，其诊断为

- A. 风湿性心脏病，二尖瓣狭窄
- B. 左心房黏液瘤
- C. 梗阻性肥厚型心肌病
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 室间隔缺损

103. 患者女，30 岁。心悸、气促 2 年，发热、关节痛 1 个月，心尖区有收缩期及舒张期杂音，心率 90 次/分，脾可触及，有杵状指，尿蛋白（++），红细胞 4~10 个/HP。X 线示心影呈梨形。最可能诊断为风湿性心脏病合并

- A. 风湿活动
- B. 肺部感染
- C. 上呼吸道感染
- D. 急性感染性心内膜炎
- E. 肾盂肾炎

104. 患者男，25 岁，反复检查尿蛋白阳性，尿液分析以白蛋白为主，选择性蛋白尿，BUN 10mmol/L，此种蛋白尿属于

- A. 溢出性蛋白尿
- B. 肾小球蛋白尿
- C. 肾小管蛋白尿
- D. 肾小管分泌性蛋白尿
- E. 组织蛋白尿

105. 男，15 岁，3 周前微热，咽痛，1 周来眼睑轻度水肿，1 天前突然剧烈头痛，全身抽搐，意识不清，数分钟后意识清醒，自述头痛，既往无高血压病史，BP23/13kPa