

東醫西齋貝鑑

卷二十三



訂正東醫寶鑑雜病篇卷之十一

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

小兒

小兒病難治

古語曰寧醫十丈夫莫醫二婦人。寧醫十

冷之尤難故也

入門

○爲醫之道大方脈爲難活

幼爲尤難以其藏府脆嫩皮骨軟弱血氣未盛經
終如絲脉息如毫易虛易實易冷易熱兼之口不
能言手不能指疾痛之莫知非觀形察色聽聲切
脉究其病源詳其陰陽表裏虛

實而能療之者蓋亦寡矣

得效

臟腑生成

夫一月之孕有白露之稱二月之胚有桃花

之譬及其三月則先生右腎而爲男陰包陽
也先生左腎則爲女陽包陰也其次腎生脾脾生
肝肝生肺肺生心以生其勝已者腎屬水故五藏

由是爲陰其次生小腸小腸生大腸大腸生膽
膽生胃胃生膀胱膀胱生三焦以生其勝已者小
腸屬火六府出是爲陽其次三焦生八脉八脉生
十二經十二經生十二絡十二絡生一百八十絲
絡絲絲生一百八十纏絡纏絡生三萬四千孫絡
孫絡生三百六十五骨節骨節生三百六十五大
穴大穴生八萬四千毛竅則耳
目口鼻百骸之身皆備矣

醫鑑

初生解毒法

嬰兒在胎口中中有惡物兒纔生不候聲出
坐婆急用軟帛裹手指蘸黃連甘草濃煎

汁拭去口中惡物若嚥入腹中必生諸疾。更以
煉蜜少許調朱砂末一字抹入口中令嚥下則一
生免瘡痘之患得效。朱蜜嚥下然後乃餉乳酌
量與之勿令大飽恐成吐姪良方○既繃裹了取
黃連甘草煎汁以綿纏子蘸入兒口令咂之
三日以來退惡物於大便謂之臍屎良方

初生洗浴法

湯洗之則兒少驚。尋常澡洗用豬膽汁

入湯中洗之卽不生瘡疥良方。世俗以爲小兒體熱或遇澡浴卽與久坐湯水之中風冷外傷水溼內滲變成風癩可

不戒之直指小兒

初生斷臍法

子在腹中胞胎十月止於臍中與母通氣雖出胞胎其臍中所通之氣猶未盡絕斷

臍之後招風致病者有之其法初生小兒綿裹臍帶離肚五六寸先用軟綿繩住臍於線外將臍咬斷片時去線待血流盡以手輕輕採散艾灸臍頭三壯或五壯結作紇繩臍帛要裹切不可常時揭看待臍根落去自然無事升心。初生卽將軟綿貼臍根繩住待第三日離肚二指許將臍剪斷用生薑自然汁或香油和麪裹臍四圍於臍頭以艾灸三壯謂之薰臍後不招風升心。先斷兒臍帶可只留二寸許以線繫定然後洗浴不然則溼氣入腹必作臍風之疾良方

擇乳母法

凡擇乳母須精神爽慧性情和悅肌肉充肥無諸疾病知寒溫之宜能調節乳食奶汁濃

白則可以餽兒不得與。於母大段酸鹹飲食仍忌
纏衝寒暑來便餒兒。於如此則必成於癬或驚疳
漏病之疾。

良方

。如陰陽交接之際切不可餒兒。

於此正謂之交於必生癬。

良方

。於母不可頻飲

酒恐兒作痰嗽驚熱昏眩之疾。

良方

。於母宜謹

節飲食飲食下咽乳汁便通情慾動中乳脈便應

病氣到乳汁必凝滯兒得此乳疾病立至不吐則

漏不瘡則熱或爲中糜或爲驚搐或爲夜啼或爲

腹痛病之初來其尿必甚少便須詢問隨證調治

母安子安可消患於未形也。

東垣

○夫飲食之擇

猶是小可乳母稟受之厚薄情性之緩急骨相

之堅脆德行之善惡兒能速肖尤爲關係。

東垣

人生十六歲以前血氣俱盛如日方升如

小兒乳哺法

人生十六歲以前血氣俱盛如日方升如

月方圓惟陰長不足腸胃尚脆而窄養之

東垣

道不可不謹。

○凡初乳先須搣去宿乳後與

之。母欲寐卽奪其乳恐睡困不知飽足也。兒

啼未定乳母勿遽以乳飲之恐停滯會脣而成嘔

吐也。乳後不與食哺後不與乳乳食相併則難

以剋化結於腹中作痛大抵成癖成積成疳皆自此始得效。小兒血氣俱盛食物易消故食無時然腸胃尚脆而窄一切發熱難化之物皆宜禁絕只與乾柿熟菜白粥非惟無病可以養德此外生栗味鹹乾柿性亦可爲養陰之助

然栗大補柿大澀亦宜少與

東垣

小兒保護法

凡嬰兒肌膚未實若厚衣過煖則傷皮膚損血脉發瘡瘍汗出腠理不閉風邪易入

若天氣和暖抱之使見風日則氣血堅剛可耐風寒不致疾病今人懷抱小兒不著地氣致令筋骨

緩弱疾病易生非父護之道

得效

○夜間不得令

兒枕臂須作一二豆袋令兒枕兼左右附之可近

乳母之側蓋覆衣衾須露兒頭面若一向仰臥恐成驚疾須時時回動之

良方

○天寒時兒用父母

常著舊衣作衣服不可用新綿絹只用舊者若太溫煖則筋骨軟弱易致疾病

良方

○宜用七八十

歲老人舊祫舊襪改作小兒衣祫真氣相滋令兒

有壽富貴之家切不宜新製紵絲綾羅之類與小

兒穿不惟生病抑且折福。初生三五月宜
繃縛令臥勿豎頭抱出六箇月方可與稀粥亦不

可與乳同

突

入門

同

養子十法

一要背煖。二要肚煖。三要足煖。四要頭涼。

五要心會涼。六要勿見怪物。
七脾胃常要溫。八啼未定勿便飲乳。

九勿服輕粉朱砂。

十少洗浴

入門

調護歌

養子須調護看承莫縱弛。乳多終損胃食
壅則傷脾。被厚非爲益衣單正所宜。無

風頻見日寒暑

順天時

入門

變蒸候

小兒變蒸俗謂之牙生骨長。比如蠶之有眠。龍

之蛻骨虎之轉爪皆同此類變生而長也

醫林

○小兒變蒸是胎毒散也

丹心

○變蒸者陰陽水

火蒸於血氣而使形體成就是五藏之變氣而七

情之所由生也蓋兒生之日至三十二日一變每

變蒸畢卽覺性情有異於前向者長生藏府意智

故也何謂三十二日長骨脈漆精神人有三百六十五骨以象天數以應期歲以分十二經絡故初生至三十二日一變生腎六十四日二變一蒸生膀胱九十六日三變生心一百一十八日四變二蒸生小腸一百六十日五變生肝一百九十二日六變三蒸生膽二百二十四日七變生肺二百五十六日八變四蒸生大腸二百八十八日九變生脾三百二十日十變五蒸生胃其主厥陰心包手少陽三焦無形故不變而不蒸夫十變五蒸乃天地之數以生成之然後始生齒能言知喜怒故始全也大倉公云氣入四肢長辟骨於十變是矣錢乙。變蒸既畢兒乃成人也變者變生五藏也蒸者蒸養六府也又云變者上氣蒸者體熱每經一變一蒸輕則發熱微汗其狀似驚重則壯熱脈亂而數或吐或汗或煩躁渴輕者五日解重者七八日解其候與傷寒相似但變蒸則耳冷尻冷上脣中心發白瘡狀如魚目珠者是也治法和平之劑微表之宜用惺惺散方見下熱實則微利之宜

用紫霜丸方見下或不治亦自愈

切不可妄投藥餌及鍼灸錢乙

小兒繼病魅病

母有娠乳兒有病如瘡癩他日亦相繼

鴟卽博勞也又以紅紗袋盛夜明砂與兒佩之每

○小兒生十餘月後母又有娠令前兒精神不

爽身體瘦瘁名爲魅病

魅音忌小兒鬼病也

用伏

翼燒灰細研以粥飲調下五分日四五次灸令香

熟嚼哺兒亦效伏翼卽蝙蝠也

聖惠

○婦人先有

小兒未能行而母更有娠使兒飲此乳則作鬼病

令兒黃瘦骨立發熱髮落千金論小兒魅病者是

也姪婦被惡神導其腹中姪嫉小兒令生此病般

亦小鬼也其證微微下利寒熱往來毛

髮攀鬚不悅者是也空服龍膽湯

三四

龍膽湯

大黃煨二錢龍膽草柴胡黃芩桔梗釣藤皮赤芍藥赤茯苓甘草各一錢蟻蠅二箇右剉

作一貼水一升煮取五合去滓一月內兒服一千金

一治十歲以下服二三合得下利卽止

相兒命長短法

凡兒三歲以上十歲以下視其性氣高
下即可知其夭壽。兒少時識悟通敏

過人者多夭。預知人意回旋敏速者亦夭。兒
骨法成就威儀回轉遲舒稍費人精神彫琢者壽
○初生叫聲連延相屬者壽。○聲絕而復揚急者
不壽。○啼聲散啼聲淡汗不流頭四破小便凝如
脂膏常搖手足頭毛不周匝者並不成人。○臍中
無血者好。○臍小者偏身軟弱如無骨者汗血者
多厄並不壽。○鮮白長大卵縫通達黑者並壽。
目視不正數動者大非佳兆。○早坐早行早齒早
語皆惡性非佳人。○髮稀小者性強不聽人。○額
上有旋毛妨父母或早貴。○初生枕骨不能能言
而死。○尻骨不能能蹈而死。○掌骨不能能匍匐
而死。○踵骨不能能行而死。○蹠骨不能立而
死。○身不收者死。○股間無生肉者死。○人中淡
長者壽。○陰不起者死。○陰囊下白者死。○赤者亦
死。○得效。

虎口三關脉法

初生回春


日嬰兒三歲曰小兒十歲曰童子

至五歲六歲曰嬰孩察三關脉三關在小兒男左手女右手次指內有紅紋似線者爲驗第一節名曰風關無脉則無病有脉則病輕○第二節名曰氣關脉見則病重尚可治○第三節名曰命關脉見則病極乃九死一生若直射三關青黑紋者死入門○第一節赤紋乃飛禽內外人驚赤紋後乃火驚黑紋水驚青紋乃天雷四足驚內隱青紋微屈則是急風候○第二節紫色紋乃驚疳青色紋乃疳傳肝白色紋乃疳傳肺黃色紋乃疳傳脾黑色紋難安○第三節青黑紋三關通度斜歸指甲則不治得效○五色之中紅黃易安紅盛作紫紫盛作青青盛作黑青黑之色至純黑則不可治入門○歌曰紫風紅傷寒青驚白色疳黑時因中惡黃則困脾喘本事

三

關

圖



三關在虎口次指
之側第一風關第

二氣關第三命關

也決病輕重死生

診小兒脉法

小兒三歲至五歲以一指按掌後人迎氣
之脉常以一息六七至爲常入門。七
歲八歲日齒九歲十歲日齶始可以一指按三部
脉而以一息七八至爲平十一至十四歲日童卯
以一息五六至爲常入門。小兒之脉以一息六
七至爲平和八九至爲發熱五至爲內寒綱目。
小兒脉亂不須治不須治藥也。弦急氣不和。
沈緩傷食。促急虛驚。浮爲風。沈細爲冷錢。

乙。浮緩傷風洪緊傷寒
數則爲熱遲則爲寒 入門

觀形察頰



左頰爲肝右頰爲肺天庭爲心地閣爲腎準頭爲脾凡五岳赤者皆熱淡白者皆虛。天庭爲火色紅主大熟青乃肝風。印堂青者人驚紅白者水火驚紅者痰熱。印堂連準頭紅者三焦積熱。印堂至山根紅者心小腸熱山根至鼻柱紅者心胃熱。鼻柱面中爲脾紅黃色者無病。脾應脣

紅主渴蛔蟲咬心頭者脣必反人中脣際也黑者
瀉痢久紅色熱痰壅盛青色驚風黑色爲痛中惡
黃色傷食吐利。左太陽青色驚重紅色傷寒黑
青色乳積。右太陽青色驚輕紅色傷寒黑
者死。地閣爲腎色青食時驚或煩躁夜啼黃多
吐逆紅者腎中氣病兩頤赤者肺熱。山根青黑
頻見災厄必火黑色痢疾赤黑色吐瀉黃色霍亂
紅色夜啼紫色傷飲食。中庭天庭司空印堂額
角方廣皆命門部位青黑爲

驚風惡候亦忌損陷

入門

面上形證歌

刺疾眉頭皺驚風面頰紅渴來脣帶赤
毒熱眼矇矓。山根若見脉橫青此病

明知兩度驚赤黑困疲時吐瀉色紅寐夜不曾停
○青脈生於左太陽須驚一度見推詳赤是傷寒
微燥熱黑青知是乳多傷。右邊青脈不須多有
則頻驚怎奈何紅赤爲風抽眼目黑青三日見閻
羅

正傳

五體以頭爲尊一面惟神可恃

小兒諸病但見兩眼無精光黑睛無運轉

目瞑無鋒芒如魚貓眼狀或兩眼閉而黑睛矇矂者死或外若昏困而神藏於內不脫者生黑珠滿輪晴明者少病眼白多睛珠或黃或小者稟弱多病目證內赤者心熱淡紅者心虛熱青者肝熱淺淡者肝虛黃者脾熱無睛光者腎虛白而混者肺熱也

入門

聲有輕重啼有乾溼

聲輕者氣也弱也重濁者痛也風也高喊者熱欲狂也聲急者

神驚也聲塞者疾也聲戰者寒也聲噎者氣不順也喘者氣促也噴嚏者傷風也驚哭聲沈不響者重也聲濁沉靜者疳積也如生來不大啼哭聲啾唧者夭○火之大發忽然驚叫乃火動氣虛必夜半發者多有口瘡宜看之

入門

○睡中驚啼聲浮者易治聲沈不響者難痊或聲如鴉中彈者不治得效

○直聲往來而無淚者是痛也連聲不絕而多淚者是驚也怒煎聲煩躁者難愈躁促聲音

者感寒
入門

小兒初生救急

有治法十八條

詳見婦人門

噤口撮口脣風證

噤口風者眼閉啼聲漸少舌上乘肉如粟米狀吮乳不得口吐白沫二便

皆通此胎中熱毒流於心脾一名鵝口瘡。鵝口瘡小兒初生有白屑滿口如鵝之口鼻外亦有不能吮乳山心脾熱也以亂髮纏指頭蘸薄荷汁拭

淨如不脫用保命散朱礬散入門。又法用一捻金散又亂髮纏指頭蘸井花水揩拭之又蘸粟荻

煮汁栗皮也拭之湯氏辰砂膏最妙方見下。

又地雞搗水塗之妙卽鼠婦蟲也。又白楊樹枝燒取瀝付之神效正傳

撮口

者面目黃赤氣喘啼聲不出乃胎熱流毒心脾則舌強脣青撮口聚面飲乳有妨用白殭蠶二枚略炒爲末蜜調付脣口卽差或用蝎梢散入門撮口者初生一臍內之篤疾一臍三七日也令

直指小兒。治法半

黃一錢竹瀝一合調和時抹口中卽差宣風散亦
可用丹心○撮口證若口出自沫四肢冰冷最爲
惡候一臘見之尤急得效○初生七日內患撮口
脣風不得飲乳急看兒齒齦上有小泡子如粟米
狀急以手指蘸溫水輕輕擦破卽開口便安不用
服藥入門○小兒口噤不開南星末一錢腦子少
許研勻調薑汁以指蘸擦兒牙齦上立開綱目
脣風者小兒斷脣後爲風溼所乘或尿溼襠裙遂成
日夜多啼不能飲乳甚則發搐噤口撮口宜用調
氣益黃散甚者用金烏散或宣風散入門○亦有
熱在胃堂伸引努氣亦令脣腫發風宜千金龍膽
湯入門○脣風撮口不得飲乳宜蝎梢餅宣風散
入門○凡脣邊青黑爪甲黑者久得效○初生七
日內見噤口撮口脣風三證者危百日內見此證

手足踶者亦
不治入門