

第四五三冊

博物彙編

藝術典

醫部

(卷)
三四—三五

古今圖書集成

中華書局影印

Z 225
1

人參 獨活 柴胡 桔梗炒 枳殼麸炒
羌活 茯苓 川芎 前胡 甘草各一錢

作一劑水二鍾薑三片煎一鍾服後服內托復煎散

郭氏神效烏金散

治癰疽疔腫時毒附骨疽諸惡瘡等證若瘡黑陷如石堅四肢冷脈細或時昏昧識語循衣煩渴危篤者服此汗之瘡起

蒼耳頭端午時收 草烏頭 火麻頭火日收

木賊去節 蝦蟆頭 樺皮節酥炙 麻黃去根節

右曬乾各等分同入磁器內鹽泥固濟炭火內從早煨至申分如黑煤色為度碾為末每服二錢病重者三錢用熱酒調下未汗再一服如汗乾却服解毒疎利之藥如修合此藥必選天晴好日於靜室中勿令雞犬猫畜及陰人見之又名首功元黑散

奪命丹

治諸般腫毒疔疽惡瘡

蟾酥 輕粉各五分 朱砂三錢 白礬枯

寒水石 銅綠 乳香 沒藥 麝香各一錢

蝸牛二十一粒另研

右件為細末將蝸牛另碾一處如丸不就用好酒糊為丸如菜豆大每服一丸生葱三五莖嚼極爛吐於手心包藥在內熱酒和葱送下如重車行五七里汗出為效重者再服一二丸

蟾酥丸

治疔黃一切惡瘡

川烏 蓮花蕊 大朱砂各一錢半 乳香 沒藥各二錢 輕粉 蟾酥各一錢 麝香五分

右為細末糊為丸豌豆大每服一丸病重者二丸依前法服取汗

右三方郭氏稱為首藥皆主乎發散首出太陽側後二方出少陰側然皆切劑也智者當較輕重陰陽之分取擇用之

寸金丹

二名返魂丹三名再生圓四名追命丹五名延壽圓六名來甦圓七名知命圓八名得道圓非人勿示此方若有人患瘡身未爛者與三圓服之嚥下便活如口噤但幹開牙關研化三圓灌下喉中立生此方治發背癰疽癰腫偏身附骨腫痛先覺時飲水口中煩渴發熱四肢沉重體壯熱

麝香一分 南乳香 烏金石 輕粉 雄黃

狗寶 沒藥各一錢 粉霜 黃蠟各三錢

硃砂五錢 鯉魚膽 狗膽各一箇陰乾用

金頭蜈蚣七條全者酥炙 頭首男孩兒乳一合

蟾酥二錢

右件為細末除黃蠟乳汁二味熬成膏子同和丸如菜豆大小兒丸如芥子大每服一丸病重者加至三丸白丁香七箇研爛新汲水調送下用衣服蓋之睡勿令透風汗出為度大段疼痛如無頭瘡腫不過三服立效服藥後喫白粥瓜薑就睡大妙

烏金散

治疔毒腫痛

牙皂四分 人言製 蟾酥 麝香各五分

血餘煨過 蛇蛻煨過 露蜂房煨各一錢 蟬蛻酒洗 血竭 乳香 殭蠶炒去絲各二錢

全蠍三錢湯泡七次 辰砂研水飛 雄黃 穿山甲炙黃各二錢半 天龍四錢酒炙去頭足

川烏尖 沒藥

右各為細末秤準分兩和勻每服三分赤砂糖調葱頭酒送下取汗為度

勝金丹

治證同前

麝香 白礬製各五分 蟾酥一錢 雄黃

辰砂 乳香 沒藥 血竭各錢半 全蠍泡炙

天龍去頭足炙 穿山甲炙各三錢 殭蠶炙五錢

右為細末和勻服法同前

奪命丹

治證同前

輕粉 麝香 白礬製各五分 白礬煨研

血竭各一錢 蟾酥酒化 銅綠 寒水石煨

乳香 沒藥 雄黃各二錢 蝸牛二十一箇連殼

右為末先將蝸牛研爛如泥勻和前藥為丸如菜豆大辰砂一錢為衣如丸不就加好酒打三五百

下每服二三丸先用葱白三寸與病者嚼爛吐於男左女右手心將藥丸裹入葱白用無灰酒三四

盞溫熱送下被蓋取汗為度重者不過三服

內托羌活湯

羌活 黃藥酒洗各二錢 防風 藥本 連翹 當歸各一錢 肉桂三分 甘草炙 蒼朮

陳皮各五分 黃芪一錢五分

右作一服酒二大盞水一大盞煎至一盞去滓熱服空心以夾被蓋覆其癰使藥行罷去之一服愈托裏溫經湯

治寒覆皮毛鬱遏經絡不得伸越熱伏榮中聚而赤腫痛不可忍惡寒發熱或相引肢體疼痛

麻黃去根節 白芷 當歸各二錢 防風去蘆 葛根各三錢 升麻四錢 炙草 白芍各錢半 人參 蒼朮各一錢

右剉如麻豆大每服秤一兩水二盞先煮麻黃令沸熱去沫再下餘藥同煎至一盞去滓大溫服訖臥於暖處即以綿衣覆之得汗而散

當歸拈痛湯

治一切風濕熱毒浸淫瘡瘍下注濕毒脚膝生瘡赤腫裏外腫癢膿水不絕或癢或痛脈沉緊實數動滑者並宜服之

羌活 人參 苦參酒製 葛根 眞茅朮

升麻各二錢 黃芩酒製 茵陳葉酒拌炒

甘草炙各半兩 防風 當歸身 知母酒製

澤瀉 猪苓各三錢 白朮一錢半

右咬咀每服一兩水煎空心服臨睡再服之

復煎散

治癰疽發背

黃芩 黃芩 黃連 知母 生地酒洗各一錢

防己 山梔 羌活 黃芪 麥門冬 甘草炙

獨活 人參各半錢 當歸尾二錢 陳皮

防風梢 甘草梢生 蘇木 當歸身 五味子

猪苓 藥本 連翹 桔梗各一錢半

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓隨證上下食前後服

金針散

治發背諸瘡腫

皂角針春取一半新採一半黑者

右一味不拘多少曬乾爲末食後酒調二三錢服精要十宣散

人參 當歸 黃芪各二兩 川芎 防風

厚朴 桔梗 官桂 甘草 白芷各一兩

右爲細末每服二錢加至六錢止熱酒調下日數服以多爲妙不飲酒者用木香濃煎湯下然不若酒力之勝也許學士云此方得於都下異人濟苦者不可勝數

十六味流氣飲

治無名惡腫癰疽等證

川芎 當歸 芍藥 防風 人參 木香

黃芪 官桂 桔梗 白芷 檳榔 厚朴

烏藥 甘草 紫蘇 枳殼

右咬咀水煎服

千金托裏散

治一切瘡腫發背疔瘡

黃芪一兩半 厚朴 防風 桔梗各二兩

連翹二兩二錢 木香不見火 沒藥各三錢

乳香二錢 當歸半兩 川芎 白芷 芍藥

官桂 人參 甘草各一兩

右爲細末每服三錢酒一大盞煎三沸和滓溫服

托毒散

治癰疽初起高腫發痛不定喘急氣粗

附子一枚炮去皮尖 當歸 麻黃 甘草

官桂 川芎 羌活 石菖 龍膽草

右九味等分爲末每服二錢水一大盞薑三片鹽少許同煎

聖濟射干湯

治癰疽發背諸瘡腫痛脈洪實數者

射干 犀角 升麻 元參 黃芩 麥門冬

大黃各一兩 山梔半兩

右咬咀每服五錢加竹葉芒硝一錢以利爲度

托裏散

治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脈洪實數腫甚欲作膿者三服消盡

川大黃 牡蠣 苦薤根 皂角針 砂硝

連翹各三錢 當歸 金銀花各一兩 赤芍藥

黃芩各一錢

右爲粗末每半兩水酒各半煎服

破棺丹

治諸熱腫一切風熱瘡證發熱多汗大渴便秘識語結陽之證

大黃二兩半生半熟 芒硝 甘草各二兩

右爲末煉蜜丸如彈子大每服半丸病重一丸至二丸食後童便入酒半盞化服或白湯合酒化服

瀉心湯

治瘡毒癰腫發背煩渴脈實洪數者

大黃四兩 黃連 山梔 漏蘆 澤蘭 連翹

黃芩 蘇木各二兩 犀角一兩
右咬咀每服三五錢水煎服

清涼飲

治瘡瘍煩躁飲冷厥痛脈實大便秘結小便赤澀

大黃炒 赤芍藥 當歸 甘草各二錢

右水煎服

精要漏蘆湯

黃芪生 連翹 沉香 大黃 漏蘆各一兩

粉草半兩

右爲細末每服二錢薑棗湯調下

內消升麻湯

治血氣壯實若患癰疽大小便不通

升麻 大黃各二兩 黃芩一兩半 枳實麩炒

當歸 芍藥 甘草炙各一兩

右咬咀水煎食前服

孫真人單煮大黃湯

脈實沉而數膏粱食肉之輩大腑祕者詳審用之

錦文大黃酒洗去皮

右一味剉如麻豆大水煮服

宣毒散

治一切瘡毒其功不可盡述

大黃煨 白芷各五錢

作一劑水二鍾煎一鍾食前服

內托散

治諸腫毒惡瘡一服立愈

大黃 牡蠣各半兩 苦薏二枚 甘草三錢

右剉每服三錢水一大碗煎七分去滓溫服

車螯散

治癰疽初發腫痛或少年熱盛發背等急宜宣毒
利下熱退爲度大人小兒四季皆可服之

紫背車螯一雙鹽泥固濟火煨通紅置地上出去火

毒用 輕粉 甘草各二錢 大黃五錢 黃芩

漏蘆去鬚 瓜根各半兩

右爲末每服二錢薄荷湯下連利酒亦可

內消九

治瘡腫初生及瘰癧結核熱毒鬱滯服之內消

薄荷葉 皂角不蛀者水炙至軟二味煎濃膏

牽牛取頭末各半斤 青皮 陳皮各一兩

沉香半兩 廣木炮 京三稜炮各三錢

右爲末入牽牛頭末用煎膏和丸如菜豆大每服

三十九煎連麵湯送下食後

神仙解毒萬病丸

一名追毒丸一名玉樞丹一名紫金錠治一切毒

及菰子鼠耳并菌草金石或喫疫死牛馬河豚等毒

或時行瘟疫山嵐瘴癘惡寒閉經喉風脾病黃腫

赤服及衝冒寒暑熱毒上攻或自益或溺水或打

撲傷損癰疽發背瘡腫湯火或蛇蟲犬鼠所傷或

中邪狂走鬼胎鬼氣並宜服之居家出入不可無

此藥真濟世衛身之寶

文蛤三兩用淡紅黃包者搥碎洗淨一名五倍子

山慈姑二兩 續隨子去殼研以紙包壓去油再研

一兩 紅芽大戟洗淨一兩五錢 麝香三錢研

右各另爲細末和勻以糯米粥和合於木臼中杵

千餘下每料分作四十錠於端午重陽七夕合如

中華書局影印

欲急用辰日亦得勿令婦人孝服不具足人及鷄
犬之類見之合宜珍重否則無效

如癰疽發背未破用冷水磨塗痛處并服良久覺

痒立消

陰陽二毒傷寒心悶狂語胃膈壅滯邪毒未發及

瘟疫山嵐瘴氣纏喉風冷水入薄荷一葉同研下

急中顛邪喝叫亂走鬼胎鬼氣並用暖無灰酒下

自縊或落水死心頭暖者及驚死鬼迷死未隔宿

者並冷水磨灌下

蛇犬蜈蚣咬並用冷水磨塗傷處如腹脹或迷悶

者更宜服之諸般瘡疾不問新久臨發時煎桃柳

枝湯下

小兒急慢驚風五疳八痢蜜水薄荷一葉同磨下

牙關緊急磨一錠外塗內服量大小用之牙痛酒

磨塗及含少許吞下

湯火傷東流水磨塗傷處

打撲傷損妙松節酒下

年深日久頭痛太陽疼用酒入薄荷磨紙花貼太

陽穴上并服之

諸般痢疾口服歪斜眼目掣眵夜多唾涎言語謬

溫卒中風口噤牙關緊急筋脈攣縮骨節風腫手

脚疼痛行步艱難一應風氣疼痛並用酒磨下有

孕婦人不可服

郭氏瑞效丸

治腸癰瘻瘻內積兼治男子婦人積聚證

當歸 京三稜 檳榔 木鼈 山甲炒各一兩

牡蠣爲末炒山甲都用 連翹 枳殼各一兩半

硝砂焙 琥珀各一兩 巴豆二十一粒去油
麝香少許

右爲末酒糊爲丸桐子大每服十九至三十九
溫酒下臨臥再服如利動臍減丸數大小便有
膿血出者却用別藥調治之

萬靈奪命丹

又名延壽濟世膏治一切瘡腫疔疽初起脉沉實
及服汗藥後毒氣在裏不盡者宜此下之
朱砂 鹽花各二錢半 雄黃 明礬生用

楓香各二錢 赤石脂 黃丹飛過 琥珀

真輕粉各一錢五分 巴豆去殼水煮十沸

蓖麻子另研各七箇 麝香 片腦各一錢

右爲末用巴豆蓖麻子膏和藥爲丸如和不就加
煉蜜就成膏收磁器內如用時旋丸芡實大每服
一丸井華水下或湯亦得忌熱物半日大人小兒
以意加減與服

一粒金丹

治一切惡瘡癰腫無名腫毒

沉香 木香 乳香各五分 巴豆霜一錢半

各爲細末照秤分數和勻用黑肥蠟一箇半去皮
搗爛爲丸如芡實大每服一丸量人虛實先呷水
一口行一次胃氣壯實者只可呷水三四口不可
太過後用水一口送藥下行畫數次以米飲補之

威靈仙飲

生威靈仙不拘多少爲末

每服一錢空心溫酒調服逐日微利爲度

五香連翹湯

治諸瘡腫初覺一二日便厥逆咽喉塞發寒熱
沉香 木香 麝香 丁香 連翹 射干

升麻 獨活 桑寄生 甘草炙各一兩 乳香

木通各二兩 大黃一兩半

右咬咀每服五錢水一盞半煎七分溫服取利

千金漏蘆湯

治癰疽丹疔惡肉時行熱毒赤腫

漏蘆 連翹 黃芩 白薇 枳殼 升麻

粉草 麻黃 砂硝各一兩 大黃一兩半

右除硝外每服二錢水一盞薑三片薄荷三葉同
煎溫服取利爲度

防風通聖散

治時毒熱毒便祕熱燥若時毒饑饉之後胃氣虧
損者須當審察非大瀉大實不用

防風 當歸 川芎 芍藥 大黃 芒硝

連翹 薄荷 麻黃 桔梗 石膏 黃芩

滑石各一兩 白木 山梔 荆芥各二錢五分

甘草二兩

右水煎服或爲末白湯調下仍量人虛實

中和湯

治瘡屬半陰半陽似潰非潰似腫非腫此因元氣
虛弱失於補托所致

人參 陳皮各二錢 黃芪 白朮 當歸

白芷各一錢半 茯苓 川芎 皂角刺炒

乳香 沒藥 金銀花 甘草節各一錢

右水酒各半煎服

內托散

一名護心散一日至三日內宜連進十數服
真茶豆粉一兩 明乳香半兩慢火於銀石器中炒
手指攪使乾急傾出搗冷研極細

右研令勻每服二錢至三錢濃煎甘草湯調下時
時細呷要藥常在胃脘間若毒衝心有嘔逆之證
大宜服此如有寒而嘔逆不宜服此當用辛熱

國老膏

治一切癰疽能消腫逐毒使毒不內攻其效不可
具述

甘草大者二斤

右槌碎河水浸一宿採令漿汁濃去盡筋滓再用
絹濾過銀石器內慢火熬成膏用器收之每服一

二匙無灰酒或白湯亦可會服燥藥丹劑者亦解
之本事方每甘草一斤分作三服溫酒調下今云

一二匙恐力少也

解毒散

治癰疽始覺便宜服

犀角屑 升麻 砂硝 赤芍 木通各一兩剉

石膏二兩 元參 麥冬去心 甘草生剉各半兩

右每服四錢水一中盞煎至六分去滓溫服無時
清心內固金粉散

又名金花散

辰砂另研 白茯苓 人參 甘草各七錢半

萊豆粉四兩研 白豆蔻仁 砂硝另研各半兩

雄黃研 麝香研各二錢半

右以參苓白豆蔻諸藥爲末入研藥令勻每服一
錢半蜜湯調下無時候此藥專治惡瘡熱盛焮痛

作渴煩躁此藥解毒

內追毒丹

清心解毒散潮

大朱砂 雄黃 生犀角 琥珀已上並別細研

黑角沉香各五錢 麝香一錢

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服二十九燈心薄荷

湯下

獨勝散

治癰疽皆緣血滯氣凝而致者

香附子去毛令淨以生薑汁淹一宿焙乾研極細

右無時以白湯調二錢服之又云疽疾多因怒氣

得之若有此疾必多怒但服香附進食寬氣自有

效

遠志酒

治一切癰疽發背癰毒惡候浸有死血陰毒在中

則不痛傳之即痛有憂怒等氣積而內攻則痛不

可忍傳之即不痛或蘊熱在內熱逼人手不可近

傳之必清涼或氣虛血弱潰而不斂若七情內鬱

治之必愈

遠志不以多少泔浸提去心乾爲末

酒一盞調末三錢澄清飲之以滓傳於患處

五香散

升降諸氣宣利三焦疎導壅滯發散邪熱治陰陽

之氣鬱結不消諸熱蘊毒腫痛結核或似癰癰而

非使人頭痛惡心寒熱氣急

木香 丁香 沉香 乳香 藿香各等分

右剉散每服三錢水一盞半煎食後溫服

忍冬酒

初發便當服此或貧乏中或居鄉僻田夫野老百

發百中

忍冬藤生取一把以葉入砂盆研爛入酒少許調和

得所塗傳四圍中心留一口又取五兩用木槌搗碎

不犯鐵器 甘草生剉一兩

右二味入砂瓶內用水二碗文武火煎至一碗入

好酒一大碗煎十數沸去渣分爲三服一日連夜

進盡病勢重一日夜可二劑

生地黃散

治發癰腫熱毒疼痛心神煩悶

生地黃二兩 川大黃剉碎炒 川升麻 黃芩

地骨皮 當歸剉微炒 木通 赤芍藥 黃芪

元參 甘草生各一兩 赤茯苓一兩半

右爲散每服四錢水一中盞入竹葉二七片煎至

六分去滓不拘時溫服

阿膠飲子

明阿膠炒如珠 粉草各一兩 橘紅半兩

右咬咀分作三服以水一盞煎七分去滓溫服

牛膠飲

截癰疽惡瘡發險處服之使毒氣不攻於內

牛膠通明者四兩

用酒一椀入膠內重湯煮鎔透攪勻傾出更浸酒

隨意飲能飲者以醉爲度此方活人甚多

黃礬丸

服過一兩已上無不取效最止疼痛不傷臟腑活

人不可勝數

白礬一兩 黃蠟半兩

右和丸如桐子大每服十丸漸加至五十丸溫酒

送下如未破即消已破即合一日服百粒則有效

能防毒氣內攻尤能護膜始終須服半斤瘡愈後

服之尤佳

托裏消毒散

治胃氣虛弱或因尅伐不能潰散服之未成即消

已成即潰腐肉自去新肉自生若腐肉既潰而新

肉不能收斂屬氣虛者四君子湯爲主屬血虛者

四物湯爲主氣血俱虛者十全大補湯爲主並忌

寒涼消毒之劑

人參 黃芪鹽水拌炒 當歸酒拌 芍藥炒

川芎 白朮炒 白茯苓各一錢 金銀花

白芷各七分 甘草炙 連翹各五分

右水煎服

托裏散

治瘡瘍因氣血虛不能起發腐潰收斂及惡寒發

熱者宜用此補托其屬六淫七情及諸經錯雜之

邪而爲患者當各審其因而參以主治之劑其屬

胃氣虛弱者當以六君子湯爲主

人參氣虛者多用之 黃芪炒各二錢 白朮炒

陳皮 當歸 熟地黃自製 白芍藥酒炒

茯苓各一錢半

右水煎服

散毒飲子

治癰疽初覺腫結未成者可以消散

黃芪二兩 甘草炙 天羅生 山藥炒各一兩

鬼腰帶葉半兩生竹雞陰濕石岸絡石而生者好絡木者無用其藤柔細兩葉相對形生三角

右爲粗末每服三錢水一盞煎至七分入酒三盞同煎一二沸去渣溫服

神效托裏散

治癰疽發背腸癰疔癰無名腫毒瘰癧赤疼痛憎寒發熱不同老幼虛弱並治之

黃芪去蘆 忍冬藤葉各五兩 當歸一兩八錢 粉草炙八錢

右爲細末每服五錢酒一盞半煎至一盞病在上食後服在下食前服少頃再進留滓外傳

黃芪散

綿黃芪 皂角刺揀紅紫者剉炒黃色各一兩

甘草半兩

細末每服五錢酒一盞乳香一塊煎七分去滓服

黃芪四物湯

人參 黃芪 白朮 茯苓 芍藥 甘草

生薑 當歸 地黃 川芎

右多加金銀花水煎服

內固黃芪丸

縣黃芪 人參各半兩

右爲末入眞生龍腦一錢研細生藕汁和九葉豆大每服三十九溫熱水下加至四十九日三服

回陽湯

治脾腎虛寒痞屬純陰或藥損元氣不腫痛不腐潰或腹痛泄瀉嘔吐厥逆或陽氣脫陷等證

乾薑炮 大附子炮各二錢 人參 白朮

黃芪各三錢 當歸 陳皮 甘草炙各二錢 柴胡 升麻各五分

右酒水煎服不應量附倍之數藥用回陽玉龍膏清熱消毒散

治一切癰疽疔證腫痛發熱作渴

黃連炒 山梔炒 連翹 當歸各一錢 川芎 芍藥炒 生地黃各一錢半 金銀花二錢 甘草八分

右水煎服

黃連消毒散

治腦疽背疽腫痛或癰木

黃連製 羌活各一分 黃芩 黃蘗各半錢

生地黃 知母製 獨活 防風 當歸尾 連翹各四分 藜蘆 防己 桔梗各半錢

黃芪 蘇木 陳皮 澤瀉各二分 人參 甘草各三分

右水煎服

黃連解毒湯

治瘡瘍癰疽煩躁飲冷脈洪數或發狂言

黃芩 黃蘗炒 黃連炒 山梔各一錢半

右水煎熱服

排膿湯

甘草二兩 桔梗三兩 生薑一兩 大棗十枚

右四味以水三升煮取一升溫服五合日再服

排膿散

枳實十六枚 芍藥一兩半 桔梗五錢

右三味杵爲散取雞子黃一枚以藥散與雞子黃

相等揉和煎如薄粥溫服一升即瘥

連翹飲

治癰腫瘡癤排膿

連翹 防風去叉各三兩 薺芩 白芍藥 黃芩去黑心 元參各二兩 白茯苓去黑皮 人參 桔梗剉炒 前胡去蘆 甘草炙各一兩 黃芪生四兩 桑根白皮剉一兩半

搗篩每服五錢水一盞半煎八分去滓溫服日二 柞木飲子

乾柞木葉四兩半 乾荷葉中心蒂 乾蒼草根 甘草節 地榆各一兩

右細到每服半兩水二碗煎一椀分作二服早晚

各一服未成者自消潰者自乾其荷蒂去惡血蓋

根下水解毒利胃驅柞木有芒刺能驅逐地榆主

下焦血病輕小證候或可倚仗

車螯散

車螯一兩煨通赤 生甘草二錢半 輕粉五分

爲細末每服四錢濃煎苦薑酒調五更服轉下惡

物爲度未知再用效在五香之上

內消散

治癰疽結鞭疼痛

人參去蘆 瞿麥 白薇 川升麻 當歸微炒 黃芩 防風 黃芪 沉香 甘草生各一兩

赤小豆煮熟一合

爲細末每服二錢不拘時溫酒調服

化毒爲水內托散

凡患癰疽發背對口惡疔瘡乳花百種無名無頭

又瘡此藥能令內消去毒化為黑水從小便出萬不失一此方不可秘藏不可輕視實之寶也

乳香 穿山甲 白芨 知母 貝母 半夏
金銀花 皂角刺 天花粉各一錢

右咬咀用無灰酒一椀煎半椀去粗作一服溫進不宜加減將粗搗爛加秋過芙蓉葉細末一兩以蜜水潤過一宿自消不必用第二服忌發物大效

仙方活命飲

又名異人活命飲治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰又止痛消毒之聖藥也

滴乳香研 防風 白芷 貝母 赤芍藥

當歸尾 明沒藥研 角皂刺炒 天花粉

甘草節 山甲炮各一錢 陳皮 金銀花各三錢

在背脊皂角刺為君在腹募白芷為君在胃次加

苦蕒仁二錢在四肢金銀花為君如疔瘡加紫河

車草根三錢如無亦可右為粗末大者四兩小者

二兩作一劑無灰酒十茶鍾瘡小五茶鍾入有嘴

瓶內以厚紙封口勿令泄氣煎至三大鍾去粗作

三次服接連不斷隨瘡上下服能飲酒者服藥後

再飲三五盃此藥並無酒氣不動臟腑不傷氣血

忌酸薄酒鐵器服後側睡覺痛定回生神功浩大

不可臆度

保安方

治瘡托裏或已成者速潰

苦蕒新者一枚去皮火焙 沒藥通明者一錢研

金銀花 甘草 生薑各半兩

右為細末用好無灰酒三升於銀石器內煎至一

升分作三盞三次飲盡病微者只一服如服托裏藥不能發散又作瘡者用此

祕方托裏散

治一應瘡毒始終常服不致內陷

苦蕒大者一枚杵 當歸酒拌 黃芪鹽水拌炒

甘草 白芍藥各一兩半 皂角刺炒 金銀花

天花粉 熟地用生香酒拌入瓷器蒸半日各一兩

用無灰酒五茶鍾和藥五兩入瓷器內厚紙封口

再用油紙重封置湯鍋內煮用蓋覆之煮至藥香

取出分服直至瘡愈

祕方拔毒散

治一切癰疽腫毒其功不可盡述

乳香 沒藥 穿山甲炮 當歸 木鼈子

連翹各一錢 苦蕒實八錢 甘草炙五分

牙皂角炒 貝母各七分 大黃生熟各一錢半

忍冬藤二錢

作一劑用酒水各一鍾煎至一鍾食前服

歸芪湯

治癰疽無頭但腫痛

黃芪 當歸 苦蕒仁 皂角刺 金銀花

甘草各一錢

右咬咀水一鍾半煎八分去滓入乳香酒再煎服

榮衛返魂湯

又名通順散又名何首烏散

何首烏不犯鐵 當歸 木通去皮尖 赤芍炒

白芷不見火 茴香炒 土烏藥炒 甘草

陳枳殼麵炒若惡心加薑汁炒

右方止此九味各等分水酒湯使隨證用之水酒相半亦可惟流注加獨活每服四錢病在上食後服病在下食前服

龍虎交加散

治發背癰疽發腦發鬚發髭又治腦虛頭運風濕之證

南木香剉碎用紙墊鍋焙乾研為細末 罌粟殼去

頂穢筋剉焙乾為細末 甘草用濕紙裹煨焙乾為

細末 吳白芷麝香煨去麝焙乾為細末 川芎濕

紙裹煨焙乾為細末

右件藥末各另包收看瘡加減用之

如神托裏散

治發背等瘡初起又治疔瘡并一切腫毒及發散

傷寒

蒼耳草根 兔耳草根 金銀藤用花亦可

五味子根各等分

右咬咀每服五錢用生白酒二盞煎至七分去粗

服臥蓋取微汗查再煎

前鋒正將

治一切癰疽不問發背發肩作瘰癧疼痛其效如神

刺芥 薄荷 山蜈蚣 老公蟻 天花粉

荏苳 荏苳 敗荷心 川白芷 赤芍藥

豬牙皂角切炒已上各等分 淮烏大者一箇煨

紅內消倍其數 甘草每十五文入一文喜恬加用

右為末每服二錢薄荷茶清調下欲快利用酒調

服效若服經日未見效恐是涼藥還血可加當歸

羌活如熱重雄黃酒調乳癰加查草根研汁調其

餘候只用酒下或麥門冬去心煎湯亦可但較緩耳

引兵先鋒

凡用內消先用此藥退潮止渴解熱以升麻葛根湯表散後服此

木通 瞿麥 荊芥 薄荷 白芷 天花粉

甘草 赤芍藥 麥門冬去心 生乾地黃

山梔子 車前子 連翹各等分

右劉每服二錢燈心生地黃煎熱潮加淡竹葉煎

溫服上屬食前下屬空心老人氣虛者宜加當歸

羌活

加味十奇散

主內護治癰發已成未成服內消藥三五日不效或年四十已上氣血衰弱成者速潰未成者速散服至瘡口合而止內能固濟去舊生新又名固壘元帥

當歸酒浸 桂心不見火 人參 土芎 桔梗

香白芷 防風去蘆 厚朴去粗皮薑汁炒

甘草五文 乳香 沒藥并別研

右件藥各等分研爲末每服二錢酒調日三服病

愈而止不飲者麥門冬去心煎湯或木香湯

稀發散

治癰疽發背及一切癰毒等證如神

稀發草其葉長如牛舌其氣如豬臭者 小蘗根

五爪龍即五藤 生大蒜

右四物各等分細研用酒和勻濾去粗服一椀得

大汗通身而愈

圓藥

五倍子炒一兩 天南星 草烏頭 黃藥

白芨各二兩

右爲細末調如糊飽血團匝如牆壁可移險處於不險處如神

敷藥

白芨 白芷 天南星 白芨 貝母各等分

右爲末水調俾外用圓藥束定內用傳藥提起制之有理

將軍鐵箍膏

治諸惡毒瘡紅腫突起用藥箍瘡四圍不令滋蔓

走疰毒氣

鹽霜白梅 南星 大黃 蒼耳根各一兩

白芨 白芨 防風 川烏頭各半兩 草烏頭

雄黃各三錢

右爲末先以蒼耳根霜梅搗爛和餘藥調成膏如

乾入酢調得所於瘡四圍用藥作鐵箍塗上止舊

瘡高突處如藥乾以雞羽蘸水掃之日換二三次

大妙

又方

治一切癰疽腫毒

草烏 貝母 天花粉 南星 芙蓉葉各等分

右爲細末酢調搽四圍雷頭出毒如乾以酢潤之

正鐵箍散

貝母去心 白芷 蒼耳草灰酢拌曬乾各二兩

或加龍骨二錢九妙

右爲細末水調或香油調貼瘡上

大鐵箍散

芙蓉 豬卷皮 木鼈子各四兩 白芷 黃藥

寒水石 赤豆 白芨 貝母各二兩 大黃

紫荊皮 白芨 真地青 羌活去蘆各一兩

防風半兩

右爲末凉水調圓應四畔如肉脫去白芨白芨加

生地黃地榆用芭蕉油調傳熱甚者用三消散

水黃散

圓腫毒

犀角屑 大黃 白芨 草烏皮尖 白芨

麝香 砂硝各等分

右爲細末蜜酢調薄攤油紙上稍乾揭下再添潤

濕貼之即消

外用潰毒藥

治諸腫毒堅硬不消

升麻 葛根 鼠黏子 地骨皮 金銀花

黃花地丁 甘草生各等分

右爲粗末每用五七錢水一升煎十沸於腫處四

畔熱用冷則再燉

圓腫方

草烏 白芨 白芨 黃藥 砂硝各等分

右爲末用蜜酢調圓腫外即便敷起

神白膏

貼五發未破

南星 大黃 草烏 白芨各半兩 蚌粉

大柏皮 赤小豆各一兩

右爲末取芭蕉頭研取油調角四畔加乳沒九妙

雄黃散

治癰疽發背紫暈疼痛不止

粟米小粉三兩炒 草烏頭 南星 絡石

百合各一兩 白芨二兩 乳香 沒藥 雄黃

黃丹各半兩

右為極細末溫水調敷之

鐵井欄

治無名腫毒或背疽腫圍

芙蓉葉重陽前收研末 蒼耳端午前收燒灰存性

右同研細以蜜水調敷之

烏龍膏

一名烏金散治一切腫毒癰疽收赤暈

木鼈子去殼切 半夏各二兩 小粉四兩

草烏頭半兩

右於鐵鍋內慢火炒令轉焦為細末出火毒再研

以水調稀稠得所敷瘡四圍中留頂出毒氣或用

酢調亦得

宜毒散

初發或發後敷貼消腫收暈圍聚

露蜂房三兩炒焦 南星 赤小豆各半兩

小米一合 生草烏二錢半 生白礬半錢

右為細末用淡酢調塗四畔乾即再上

拔毒散

癰疽腫結通用能散能潰

南星上等大白者一兩 草烏頭 白芷各半兩

木鼈子仁一箇研

右為細末分兩次法酢入蜜調敷紗貼之

獨毒散

治癰疽腫毒未結則散已結則潰去風排膿

天南星一兩 貝母七錢半 白芷 赤小豆

直礬蜜炒各半兩 雄黃二錢

右為細末初用酢調敷後用蜜水調敷

退毒散

癰疽通用

木鼈子去油 天南星 半夏生 赤小豆

白芷 草烏連皮尖各等分

右為細末硬則法酢調敷熱熨則蜜水調敷

神功妙貼散

塗敷癰疽量內使膿血化為水出收暈斂毒

大南星圓白者 蓖麻子仁各四錢 半夏生

白芷稍 五倍子 薑黃 貝母 白芨各三錢

沒藥 乳香各二錢 花藥石散二貼

右為細末夾和井水入蜜調敷瘡色黯晦薑汁調

敷從暈邊抹收入裏面中間如錢大貼膏藥若瘡

開大全用紗攤藥以舊茶籠內白竹葉尾剪兩片

如猪勢先貼藥上然後貼瘡久年蓮仰上竹葉亦

得竹葉出水藉藥以行之凡敷藥須是細末則不

痛

特異萬靈散

治癰疽發背腫毒等患神妙

軟石膏燒通紅盤覆在泥地上一宿 大白南星

赤小豆 草烏連皮尖各半兩 乳香二錢別研

右為細末蜜水調成膏從外抹收入雷最高處如

錢勿敷如瘡已破切忌藥入瘡口恐痛斂毒排膿

不致潰爛慶效

又方

治冷癰青硬無頭陰毒并瘡疥毒瘡皆效

生鐵銹 輕粉各二錢 白松香一兩五錢

麝香少許

先將鐵銹松香為細末入鍋內加麻油一兩慢火

煎數沸離火待熱少退入輕粉麝香末攪勻即為

膏矣收貯量瘡大小攤貼患處

隔皮取膿法

治諸般腫毒

驢蹄甲細切炒 蕎麥麪各一兩 白鹽半兩

草烏去皮四錢

右為末水調作餅子慢火炙黃出火毒研米酢調

成膏用白紙攤貼患處毒自毛竅而出其腫自退

雄黃散

治癰疽赤腫疼痛未得膿潰貼之成膿

雄黃 黃藥 檳榔 川大黃 血竭各七錢半

麝香研一錢 黃連一兩 白芷 木香 芍藥

桂心各半兩 當歸炒三錢

右為細末用臘豬脂調令勻塗於絹上貼腫處候

膿潰後即用膏藥搜膿生肌

萬應針頭丸

治一切癰疽惡毒大瘡欲死者一粒即愈

麝香二錢 血竭如蠟者用散者不用 輕粉

蟾酥舌試粹者 硃砂各三錢 片腦一錢

蜈蚣一對全用 右為極細末煉蜜和丸為劑如瘡有頭者用針頭

挑破微有血出將藥一黍米大放挑開瘡內上用紙花周圍唾津濕貼瘡上不過時刻即愈如兩腋見無頭瘡即是暗疔即將兩手虎口內白土紋用針挑破如前法用藥封蓋忌雞鵝酒溫麪一切發熱之物

萬槌青雲膏

治諸般癰腫未成膿者貼散已成膿者拔毒追膿腹中痞塊貼塊上瘰癧貼大椎及身柱其效如神白松香淨者一斤 輕粉二錢 蓖麻子去殼

杏仁去皮各三百枚 乳香 沒藥各一兩五錢 銅青三兩

右共作一處用鐵槌木臼於日中搗成膏如燥少加香油杵之或用石臼木杵搗亦可用磁器盛緋帛攤貼湯中燉不見火

四虎散

治發背初生筋脈緊急不舒

附子生去皮一兩 天南星 半夏 狼毒各半兩 一方無附子有草烏各等分右爲末熱酒調成膏攤上腫處以熟絹縛定覺患處如火燒不妨

回陽玉龍膏

草烏頭三兩炒 軍薑二兩煨 白芷不見火 南星煨 赤芍藥各一兩炒 肉桂半兩不見火

此方治陰發背冷流注鼓椎風久損痛冷痹風濕諸脚氣冷腫無紅赤者冷腫不痛者足頑麻痺婦人冷血風諸陰證之第一藥也用熱酒調塗

洪寶丹

一名金丹又名寸金又名四黃散

天花粉三兩 蠶黃 白芷各一兩 赤芍藥二兩 右爲末茶酒湯使隨證熱塗

金黃散

貼癰毒令內消

白芷 白芨 白薇

右等分爲細末新汲水調敷

天花青露散

圍腫一切腫毒

白芨 白薇 白薇 白芷 白蘚皮 砂硝 青黛 黃藥 老龍骨各一兩 大黃四兩

天花粉 青露各三兩

右爲細末酢蜜調勻如疽毒未成則當頭覺退若已成四面圍之中留頭用替針膏貼之

消腫散

圍毒腫毒一切瘡癰並治

大黃 水仙子 山藥 芎藭 青露 小赤豆 寒水石 水蘊 香蛤粉 花藥石

右將前藥搗和如乾加酢蜜調勻如疽毒未成則當頭覺退若已成四面圍之留一頭用替針膏貼之

神護膏

圍毒一切腫毒

小赤豆 黃皮 白薇 天花粉 天南星 白芷各等分

右爲末陰用米酢與蜜水調陽用商陸根亦用芭蕉油此是邵邑要黃金散加黃皮爲主

水澄膏

秘方圍敷腫毒

鬱金 白薇 白芨 五倍子各一兩 乳香 雄黃各五錢

右爲細末水調敷如熱極者用臘水尤妙

五金膏

一名葵花散

黃葵花七朵 川連二錢去麩 山梔三箇肥者 黃藥五錢 川鬱金三錢

右爲末并華水調成膏傳此藥性急宜速打之

清水膏

治癰疽及一切毒腫堅硬腫痛攻衝四畔欬腫抽熱毒散腫氣

羊桃根

大黃 黃芩 萊豆粉 黃藥各一兩 赤小豆

赤小豆

右爲細末用茶蘆菜取自然汁入蜜少許相和調藥令稀稠得所看四畔腫赤處大小剪生絹上勻攤可厚一錢許貼之乾即易

水調膏

治癰疽毒熱赤焮疼痛

川大黃生用研末 杏仁去皮尖研 鹽花各三分

右爲細末研令勻以新汲水調和稀稠得所旋即塗腫上乾即易之

水澄膏

治風熱腫毒赤紅色攻焮疼痛不止

白芨 白薇各四錢 鬱金一對 大黃 黃藥 黃藥子 榆皮各七錢五分 乳香 沒藥 雄黃各半兩

右爲細末用新汲水一碗藥末不以多少澀於水內藥定去水敷於腫處上用白紙封之用雞翎掠此水溫潤

二黃散

治一切腫毒

黃藥 大黃各等分

右爲末用酢調搽如乾以水潤之

揭毒散

大黃一兩半 白芨一兩 硫磺二兩

右爲末用井水調搽如乾再搽

三消散

退極熱證赤腫焮開者

硫磺 焰硝 大黃 梔子炒黑色 寒水石 南星各等分

右爲細末生地黃汁調塗貼芙蓉葉搗汁調亦可

四面楚歌

敷諸般疽發腫赤痛不可忍未成則散已成則破至瘡口合而止

荆芥和根剉碎 赤芍藥 大藥根 土當歸

山大黃 土白芷 天南星圖白者 赤小豆

商陸根剉片子焙 白芨 赤蘆 白蘆 草烏

藥水石煨或炒各等分

右爲末生地黃汁調角四畔或苦蓋根汁腫用商陸根研汁未潰則滿塗上或有尖起處則割出瘡口

水師晶明

治諸般已破未破皆洗如成膿潰爛最要洗淨去

故肉生新肉洗後淨乾再用角貼藥一日一次
大藥皮 澤蘭 莽草 荆芥 赤芍 山大黃 土白芷 土當歸 獨活各等分

右剉粗散用水一斗入蔥白大椒橘葉同煎煮洗如已爛入猪蹄下膝爪骨肉煎可免乾痛洗淨爲度

礱砂膏

治癰疽腫毒并治療點落疣痣等

礱砂生用一錢 石礱灰一兩炒黃色 白丁香三錢炒黃色 黃丹半斤生用 醋一斤淋水五碗

右四味研爲極細末次將鹹水煎作一椀成膏待冷以前末入膏和勻藏磁器中一應毒物以此膏點之白丁香即麻雀兒尿用堅尖者不用輒賴者

六灰膏

治發背疔瘡癰子腫毒癰瘡痔瘡瘰癧子疣子其功用與礱砂膏同也

灰覓 桑木 棗木 蕎麥科 茄科各燒爲灰石礱灰研細

右件多少不妨和勻湯泡水淋淋下之水煎成膏如糊裝磁器中一應毒物以膏點之若點癰瘡痔瘡待爛去少許再點之再爛去如是漸漸點去

援生膏

治諸般惡瘡及癰癰風瘡起者點破即愈

血竭一錢 蟾酥 輕粉各三錢 麝香五分 雄黃五錢 乳香 沒藥各一錢

右件俱爲極細末再用蕎麥楷灰或真炭灰一斗三升淋灰湯八九盞用栗柴或桑柴文武火煎作

三椀取一椀收留將二椀盛於好磁器內候溫將藥末入灰湯內用鐵瓢或桑柳枝攪又用好細石灰一升入藥灰湯攪勻取出候冷過宿盛於小白磁罐內凡遇諸惡瘡點在當頭一日二次夫日又一大瘡頭食破約五分血水出爲妙恐日久藥乾將前收留灰湯和用

替針丸

治癰疽已潰未破或破後膿出不快者

白丁香 礱砂 沒藥 乳香各一字

石灰藥汁內種糯米十四粒其法用石灰五升燻灰三升以水五升淋取清汁入大鍋內熬濃汁至三二升用瓦器盛貯臨用時以小青盞盛取半盞濃汁却用皮紙貼蓋中濃汁面上安定然後取糯米十四粒種在皮紙面上一宿即是右同爲細末糯米飯丸如麥粒大每用一粒未破用津貼瘡頭薄處即破膿滯不快則用一粒納瘡口內使膿不滯好肉易生

又方

雄雀糞二十粒 礱砂 陳倉米 沒藥各一字

右研勻以米飯丸如果大每用一粒貼瘡口眼中心即潰膿出

替針丁香丸

草烏尖 礱砂 白丁香堅者

右爲末酸酢調點將破者令速潰若急則無如刀快蟬針一法亦妙見後

托裏溫中湯

治瘡爲寒變而內陷者膿出清稀皮膚涼心下痞

滿腸鳴切痛大便微溏食則嘔氣短促逆不絕不得安臥時有昏憤

丁香 陳皮 沉香 茴香 益智仁各一錢
木香一錢半 黑附子炮去皮臍四錢 羌活
乾薑炮各三錢 甘草炙二錢

加味十全湯

治癰疽潰後補氣血進飲食

黃芪蒸 地黃蒸 當歸 川芎 人參 茯苓
芍藥炒 白朮 陳皮各一兩 粉草炙 桂心

五味子各半兩 烏藥七錢

右咬咀每服一兩用水一椀生薑五片棗二枚同煎分作二服留滓曬乾為末服之丹溪云加味十全湯須看年之老壯資之強弱證之緩急時之寒熱加減用之

補中益氣湯

治瘡瘍之人元氣不足四肢倦怠口乾發熱飲食無味或飲食失節或勞倦身熱脈洪大而無力或頭痛惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩

黃芪炙一錢五分 甘草炙 人參 當歸酒拌
白朮炒各一錢 升麻 柴胡 陳皮各三分
作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎一鍾空心服

人參養榮湯

治潰瘍發熱或惡寒或四肢倦怠肌肉消瘦面色痿黃吸吸短氣飲食無味不能收斂或氣血原不足不能收斂若大瘡愈後多服之不憂他病

白芍藥一錢半 人參 陳皮 黃芪蜜炙
桂心 當歸酒拌 白朮 甘草炙各一錢

熟地黃酒拌 五味子炒杵 茯苓各七分半
遠志去心炒五分

作一劑水二鍾薑三片棗一枚煎八分食前服

四君子湯

治脾胃虛弱或因尅伐腫痛不散潰斂不能宜用此以補脾胃諸證自愈若誤用攻毒七惡隨至脾胃虛弱飲食少思或食而難化或欲作嘔或大便不實若脾胃氣虛痞口出血吐血便血尤宜用之蓋氣能攝血故也凡氣血俱虛之證宜於前湯但加當歸脾胃既旺飲食自進陰血自生若用四物沉陰之劑脾胃復傷諸證蜂起若命門火衰而脾土虛寒必用八味丸以補土母

人參 茯苓 白朮各二錢 甘草炙一錢

右薑棗水煎服

六君子湯

治脾胃虛弱或寒涼尅伐腫痛不消或不潰斂宜服此湯以壯營氣諸證自愈

即四君子湯加陳皮半夏

異功散

治脾胃虛弱飲食少思

即四君子湯加陳皮

四物湯

治血虛發熱或因失血或因尅伐或因潰後致喘熱內熱煩躁不安皆宜服之經云血生於脾若脾虛不能生血者宜用四君子湯加當歸酒炒白朮以補脾

熟地黃 當歸各三錢 芍藥二錢 川芎一錢半

右水煎服

八珍湯

調和榮衛順理陰陽滋養血氣進美飲食退虛熱此氣血虛之大藥也

當歸酒拌 川芎 芍藥炒 熟地黃酒拌

人參 白朮炒 茯苓各一錢 甘草炒五分

作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

十全大補湯

治潰瘍發熱或惡寒或作痛或膿多或清或自汗盜汗及流注癰癰便毒久不作膿或膿成不潰潰而不斂或血氣不足之人結癰未成膿者宜加枳殼香附連翹服之自消

人參 肉桂 地黃酒洗蒸焙 川芎 茯苓

白芍藥炒 白朮土炒 黃芪用鹽水拌炒

當歸酒拌各一錢 甘草炙五分

作一劑用水二鍾薑棗煎服

歸脾湯

治憂思傷脾血虛發熱食少體倦或脾不能攝血以致妄行吐下或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體腫痛大便不調或婦人經候不准補熱內熱或瘡流注等證不能消散潰斂

白朮 白茯苓 黃芪炒 當歸 龍眼肉

遠志肉 人參 酸棗仁炒各一錢 木香五分

甘草炙三分

右薑棗水煎服

黃芪人參湯

治諸瘡破後食少無睡及有虛熱穢氣所觸者

黃芪二錢 人參 白朮 麥門冬 蒼朮
陳皮 升麻 五味子 當歸身 甘草各一錢
黃藥炒四分 炒麴五分
右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

托裏當歸湯

治潰瘍氣血俱虛瘡口不斂補熱內熱寒熱往來
婦人諸瘡經候不調小便頻數大便不實等證
當歸 黃芪炙 人參 熟地黃 川芎 芍藥
芍藥各一錢 柴胡 甘草各五分
右水煎服

人參散

治癰疽內虛不足

人參 白朮 上白茯苓 枸杞子各一兩
熟地黃 黃芪剉各二兩 桂心 白芍藥
當歸微炒 甘草炙各半兩
右剉碎每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚
煎至六分去滓不拘時溫服

麥門冬湯

治癰疽潰後膿水不絕

麥門冬去心 黃芪剉 五味子炒 人參去蘆
白茯苓去黑皮 官桂去粗皮 當歸切焙
遠志去心 芎藭各一兩 甘草炙七錢半
右咬咀每服五錢水一盞半入生薑半分擘碎大
棗二枚擘破同煎至一盞去滓空心溫服

護壁都尉

治諸發已潰去舊生新老人氣血虛弱宜補之此
潰後服至愈而止

防風去蘆 厚朴去粗皮薑汁炒 苦梗 白芷
黃芪炙各半兩 人參二錢 川芎 甘草
柳桂 當歸各三錢
右爲末每服二錢空心溫鹽酒調服至瘡口合後
更服爲佳不飲酒不香湯兼服降氣湯尤妙

六味丸

一名六味地黃丸此壯水之劑夫人之生以腎爲
主凡病皆由腎虛而致此方乃天一一生水之劑無
有不可用者世所罕知若腎虛發熱作渴小便淋
秘痰氣壅盛欬嗽吐血頭目眩運小便短少眼花
耳聾咽喉燥痛口舌瘡裂齒不堅固腰腿痠軟五
臟齊損肝經不足之證尤當用之水能生木故也
若腎虛發熱自汗盜汗諸虛失血失音水泛爲痰
之聖藥血虛發熱之神劑也
熟地黃生者自製八兩 山萸肉 山藥各四兩
白茯苓 牡丹皮 澤瀉各三兩
右地黃杵膏餘爲末蜜和丸桐子大每服七八十
丸滾湯下

八味丸

治命門火衰不能生土以致脾土虛寒而患流注
鶴膝等證不能消潰收斂或飲食少思或食而不
化脘腹疼痛夜多漩溺
前方加肉桂附子各一兩
加減八味丸

治證同前

即六味丸加肉桂五味子各一兩
人參內托散

治瘡瘍潰膿而作痛者
人參 黃芪 當歸 川芎 厚朴 防風
桔梗 白芷 官桂 紫草 木香 甘草
右入糯米一撮水煎服

黃芪散

治癰潰後補虛去客熱

黃芪 石膏各二兩 知母 麥門冬去心
白芍藥 白茯苓 桂心 熟地黃 人參去蘆
川升麻各一兩 甘草炙微赤半兩
右剉碎每服四錢水一中盞煎六分去滓溫服日
三四服

當歸補血湯

治瘡瘍潰後氣血俱虛肌熱躁熱目赤面紅煩渴
引飲晝夜不息脈洪大而虛重按全無此脈虛血
虛也若誤服白虎湯必死宜此主之
黃芪炙一兩 當歸酒拌三錢
作一劑水一鍾半煎六分服

沉香散

治癰潰已絕肌肉內虛尚有餘熱

沉香剉 柴胡去苗 黃芪 麥冬去心各一兩
白朮七錢半 熟地黃二兩 黃芩 苦蕒根
甘草生剉各半兩
右剉碎每服四錢水一中盞入竹葉二七片小麥五
十粒煎至六分去滓不拘時溫服

加味逍遙散

治肝脾血虛內熱發熱或遍身瘙癢寒熱或肢體
作痛頭目昏重或怔忡煩赤口燥咽乾或發熱盜

汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛或胃乳腹脹
小便欠利

甘草炙 當歸 芍藥酒炒 茯苓 白朮炒
柴胡各一錢 牡丹皮 山梔炒各七分

右水煎服

梔子黃芩湯

治發背癰疽潰後因飲食有傷調攝不到發熱不
住用以退熱

漏蘆 連翹 山梔仁 黃芩去心 防風

石葦 如無以葦 生甘草 生犀角屑 人參

苦參各去蘆 茯苓上白者去皮各二錢半

生黃芪去叉蘆一兩

右爲粗末每四大錢水一鍾煎至六分去滓溫服

六合回生丹

一名六合奪命散治發背癰疽潰爛有回生之妙

鉛粉一兩 輕粉 銀硃 雄黃 乳香著上灰

沒藥炙各二分半

右六味各擇真正好者研爲極細末收貯凡治其

病先煎好濃茶將瘡洗淨候帛拭乾後剖開豬腰

子一枚用藥一分摻於豬腰子上傳患處待豬腰

子上發熱如蒸良久取去自此毒氣滅滅痛苦定

瘡口出膿穢不可手擠次日依前法仍傳之第三

日亦傳之瘡勢惡甚可傳七八九次瘡小只傳一

次可愈豬腰子不發熱勿治又治對口瘡同前

驪龍散

治發背癰疽破與不破二者之間功能捷奏

珍珠五分 牛黃十二月生用餘月燒存性

鐵鎔各重一兩

右研極細末以豬腦髓和好酢調傳瘡口三五次

愈初起者自消凡發毒品味忌食之

麥飯石膏

在膿潰後圍瘡口

麥飯石不拘多少炭火煨至紅以好酢淬之如此煨

煨十數次研爲末重羅去粗者取細末入乳鉢數人

更遞研五七日如麵極細爲妙 白磁研爲細末

鹿角不用自脫者須用帶腦頂骨全者却是生取之

角截作二三寸長炭火燒令烟盡研羅爲末再入乳

鉢更遞研令極細

右用麥飯石細末二兩白磁末二兩鹿角灰四兩

最要研得極細方有效粗則反致甚痛細則大能

止痛收口排膿精粗之異如此和合量藥末多寡

用經年好米酢入銀石器內熬令魚眼沸却旋旋

入藥末用竹篦子不住手攪熬一二時久令稀稠

得所提出以磁器盛之候冷以紙蓋覆勿令著塵

用時先以豬蹄湯洗去膿血以故帛把乾鵝翎蘸

膏塗傳四圍凡有赤處盡塗之但留中心一口如

錢大未潰能令內消已潰則排膿如流水逐日瘡

口收斂瘡久肌肉腐爛筋骨出露用舊布片塗藥

貼瘡但內膜不穿亦能取安洗瘡勿可手觸嫩肉

亦不可口氣吹著合藥亦忌服氣之人及月經有

孕婦人見之仍可熬好米酢一大碗收磁器內候

逐日用藥於瘡上久則藥乾以鵝翎點酢拭藥

上勿令稠也初則一日一洗一換藥十日後兩日

解毒百用膏

豬牙皂角煨 南星各一兩 大米一合炒黑

臭小粉乾者四兩炒焦去火毒

右爲末和勻蜜水調團治頭撲酒醉調團

遍毒散

劉氏貼發背癰疽膿盡四面皮粘恐有膿毒攻起

宜用此

黃藥子 白藥子各一兩 透明雄黃一錢

赤小豆二兩

右爲末水調傳

青散子

治發背癰疽膿盡生肉平滿宜用此緊瘡口生肌

槿花葉盛時收陰乾取四兩爲末 青赤小豆

白芨各二兩

右爲末臨時用槿花末三錢白芨小豆末各一

錢匕相和新汲水調攤紙上貼四畔中心瘡口不

用貼

