



痘疹

保元湯一 治痘瘡氣虛下陷者

人參錢二三 炙甘草一錢 肉桂分五七 黃耆二三錢 灌服時酒 炒回漿時蜜炙 水一鍾半 加糯米一撮煎服 此藥煎熟加人

乳好酒各半盞和服更妙酌宜用之 〇頭額不起加川芎三五分 〇面腫難辨麻三四分 〇胸腹如桔梗三

四分 〇腰膝加牛膝四分 〇四肢不起加桂枝 〇嘔惡加丁香三四分 〇元氣虛寒加大附子七八分或一

錢

調元湯二 按此即保元湯無肉桂者名為調元湯即東垣之黃耆湯也東垣用為小兒治驚之劑魏桂巖用

以治痘多效因美之名保元湯也蓋小兒元氣未充最易傷殘用此保全誠幼科玉道之妙方但能因此廓

克則凡氣分血分虛寒虛陷等症皆可隨症增減用之無不可奏神效也

內補湯三 治痘瘡中虛等症

人參 黃耆 當歸 白朮 川芎 甘草 茯苓 陳皮 厚朴 右等分水煎服

托裏散四 治痘毒元氣虛弱或妄行剋伐不能潰散用之未成自消已成自潰并治癰毒內虛不能起發

人參 黃耆炒各錢 當歸酒洗 白朮 熟地 芍藥炒 茯苓各錢 炙甘草五分 石每用三五錢水

煎服 外科樞要方有陳皮一錢半無甘草

解毒內托散五 治痘癰

金銀花 黃耆 當歸 赤芍藥 防風 甘草節 荆芥 連翹 木通 石水煎

入酒少許服

陳氏托裏消毒散六 治痘毒氣血虛弱不能起發腐潰收斂或發寒熱肌肉不生

人參 黃耆炒 當歸酒洗 川芎 芍藥炒 白朮炒 茯苓 陳皮錢各一 金銀花 連翹

白芷各七 炙甘草五分 右每服三五錢水煎服○外科方無陳皮

參耆肉托散七 治痘瘡裏虛發痒或不潰膿或為倒靨及瘡癰膿毒不化膿潰作痛等證

人參 黃耆蜜炙 當歸 川芎 厚朴薑制 防風 桔梗炒 白芷 紫草 官桂 木香

香 甘草等分 入糯米一撮水煎服色淡白者去防風紫草白芷多加糯米○一方有芍藥

參耆四聖散八 治痘瘡已出至六七日不起發不成膿

人參 黃耆炒 白朮炒 當歸 川芎 芍藥炒 茯苓各五分 紫草 防風 木通各三

右用水煎服

陳四聖散九 治痘瘡出不快及倒靨因內實者

紫草 木通 炙甘草 枳殼麸炒 黃耆等分 右每服二錢加糯米一百粒水煎待米熟溫服

加味四聖散十 治痘瘡黑陷倒陷

人參 黃耆炙 川芎 甘草 紫草 木通 木香等分 蟬蛻十個 右加糯米百粒水

一盞煎服

如聖湯十一 治毒盛不起

芍藥 升麻 乾葛各一錢 甘草 紫草 木通各五分 水一鍾薑一片煎七分溫服不拘時

人參固肌湯十二 治痘瘡發表太過致肌肉不密或痘痂久粘者

人參 黃耆 當歸酒洗 甘草 蟬蛻去土等分 水一鍾入糯米一撮煎服

人參透肌散十三 治痘瘡虛而有熱雖出快而不齊隱於內膚間者

人參 紫草如無紅花代之 白朮 當歸 芍藥 茯苓 甘草 木通 蟬退

糯米 右每服三錢水一盞煎半盞徐服之

十宣散 十四 一名托裏十補散 〇調氣補血內托瘡毒五日後必用之方也亦治癰疽

人參 黃耆 當歸各二錢 川芎 防風 桔梗 白芷 甘草各一錢 厚朴各一錢

桂心 三分 右為細末每服一錢或二錢木香湯下

芎歸湯 十五 亦名活血散 〇大能養營起痘

當歸 倍用 川芎 右為細末每服一錢紅花湯調服

活血散 十六 治痘疹血虛血熱已出未盡煩躁不寧腹痛

白芍藥 酒炒 右為末每服一匙糯米湯調下或荔枝湯亦可 〇此方對四君子湯加歸者名參歸活血散

當歸活血散 十七 治痘色淡白

當歸 酒焙 赤芍 酒炒 川芎 紫草 紅花 錢 五 木香 二錢 血竭 一錢 右為末每五歲者服一錢十歲

已上服二錢酒下

養血化斑湯 十八 治白疹白痘

當歸身 人參 生地 紅花 蟬蛻等分 水一盞生薑一片煎六分溫服無時

人參胃愛散 十九 治痘疹已發未發吐瀉不止不思飲食等證

人參 茯苓 甘草 丁香 藿香 紫蘇 木瓜 糯米 右每服三錢薑棗水煎溫服

二仙散 二十 治體寒肢冷腹痛口氣冷陰盛陽衰嘔吐泄瀉難發等證

丁香 九粒 乾薑炒一錢 右為細末每服五七分白湯送下被蓋片時令脾胃溫暖陰返陽回則痘變潤矣量

大小加減與之

陳木香散 二十一 又名十一味異功散 〇治小兒痘疹虛寒多滯者宜此

木香 丁香 大腹皮 人參 桂心 炙甘草 半夏製 訶黎勒 赤茯苓

青皮 前胡等分 右每服二三錢薑水煎 薛按曰前方治痘瘡已出未愈之間其瘡不光澤不起發

或不紅活五七日內泄瀉作渴或肚腹作脹氣促作喘或身雖熱而腹脹足指冷或驚悸或汗出或寒戰咬牙

或欲醫不醫瘡不結痂或醫後腹脹泄瀉作渴此皆脾胃虛寒津液衰少急用此藥治之若誤認為實熱用

寒涼之劑及飲蜜水生冷瓜果之類必不治

陳氏十二味異功散 治元氣虛寒小兒痘疹色白寒戰咬牙泄瀉喘嗽等證

人參 丁香 木香 肉豆蔻 陳皮 厚朴各二錢 茯苓 官桂各二錢 當歸三錢

半製附子 半夏各錢 右咀每服二三錢薑棗水煎服○愚按陳氏此上二方溫性有餘補性不足用

以治寒證則可用治虛證則不及也用者更當詳酌

陳氏人參麥門冬散 治痘瘡微渴

麥門冬一兩人參 炙甘草 白朮 陳皮 厚朴薑製各五錢 右每服三四錢水一大盞煎至六

分徐徐溫服量兒增減 薛氏曰前方治痘瘡熱毒氣虛宜用之若因氣虛作渴宜人參白朮散

柴胡麥門冬散 治痘瘡壯熱經日不止更無他證者

柴胡二錢 龍膽草一錢 麥門冬三錢 甘草炙 人參 玄參各錢 右咬咀每服三錢水一大盞煎至六

分不拘時徐徐溫服量大小加減 按此方解表之功居六清火之功居四養營退熱此方最宜

升均湯 治痘瘡已出不勻或吐瀉發熱作渴

升麻 乾葛 人參 白朮炒 芍藥炒 茯苓 甘草 紫草如無紅花代之 右每服三五錢薑

水煎

升麻葛根湯 亦名升麻湯○解發痘毒之良方

升麻 葛根 芍藥 甘草 葶分 石叻咀水一盞煎七分溫服無時 萬氏曰古人治痘以升麻

葛根湯為主後世好奇多立方法法愈多而治愈難矣白能變通則痘疹諸證皆可增減用之不特發表解

肌而已今以葛根湯為主治隨證立增損法於後○初發熱解表加柴胡羌活白芷桔梗防風○口乾渴內

熱也加葛粉天花粉麥門冬○自利加條貫黃芩○嘔吐加半夏生薑○腹中痛加木香青皮枳殼山查肉

腰痛加獨活北細辛○頭痛加羌活藁本蔓荊子○驚搐加木通生地黃燈心○小便少加木通車前瞿麥

○大便秘加大黃 衄血加山梔仁玄參生地黃○發熱三四日熱甚不減須解其毒加大力子連翹紫草

○瘡不出加防風蟬蛻荆芥穗紅花子○目痛加龍胆草蜜蒙花柴胡○瘡出太稠密加人參當歸木香紫

草大力子防風桔梗○咽痛加桔梗連翹○瘡乾或帶紫或太赤者血熱也加當歸梢生地黃紅花地骨皮

牡丹皮○痘平陷反白色氣虛也加人參白朮防風木香官桂○手足瘡不起脾胃不足也加人參黃耆防

風官桂○泄瀉者裏虛也加人參白朮訶子白茯苓○瘡不著痂者濕也加黃耆防風官桂白芷 愚謂前

方乃胃經發表之劑萬氏增減之法大意已悉但此方性味清涼純於疎泄必陽明多實多熱者乃宜用之

然小兒氣血體質大都虛弱平和者十居七八故凡痘瘡初起乍見發熱用藥最貴平和兼養營氣則庶乎

盡善若預用清涼未免傷其胃氣全用解散未免虛其表氣二者受傷變患有不可測矣故余制柴歸飲為

治痘之先著所當酌宜用之若治麻疹則多屬火證此方乃所宜也

蘇葛湯二錢 初熱未見點發表之劑暫用之分兩宜酌兒大小以為增減

蘇葉二錢 葛根二錢 甘草一錢 白芍藥錢半 連翹葱白三根生薑三片水鍾半煎七分熱服○原方有陳

皮砂仁各五分此惟氣滯腹痛者宜用之否則不必

連翹升麻湯二八 散毒清火

連翹一錢 升麻 葛根 桔梗 甘草各七 白芍藥五分 薄荷少許 右加淡竹葉燈草水一盞半

長入景古全書 卷六十三 古方 痘疹

煎一盞溫服無時

柴胡橘皮湯 二九

柴胡 橘皮 人參 半夏 茯苓 黃芩等分 右加竹茹一團水一盞煎七分溫服不拘時

人參敗毒散 三十 方在散陣三六 治時疫斑疹

荆防敗毒散 三一 亦名消風敗毒散○發散痘疹俱可用及時氣風毒邪熱

柴胡 荆芥穗 防風 羌活 獨活 前胡 川芎 枳殼 人參 甘草

桔梗 茯苓等分 石切細加薄荷葉水一盞煎七分去滓溫服

紫葛敗毒散 三二 疑似湯寒以此解散

柴胡 乾葛 人參 羌活 防風 荆芥 桔梗 蘇葉 甘草 右用生薑三片

水煎服

參蘇飲 三三 方在散陣三四 治傷風咳嗽傷寒痘疹

加減參蘇飲 三四 初熱見點解利之藥但表邪未達而元氣強壯者宜暫用之或前後感冒風寒俱可暫用

蘇葉 一錢 乾葛 錢半 前胡 八分 陳皮 七分 枳殼 六分 桔梗 甘草 各四 水一鍾半加生薑三片煎服

麻黃甘草湯 三五 冬月痘毒熾盛表實者宜用之

麻黃 一錢 生甘草 減半 水煎服

柴葛桂枝湯 三六 表散痘熱

柴胡 乾葛 桂枝 防風 甘草 人參 白芍藥 水一盞加生薑三片煎七分溫服

桂枝葛根湯 三七 解散寒邪

桂枝 葛根 升麻 赤芍藥 防風 甘草 各一 右加生薑三片淡豆豉一錢水一鍾煎

十味羌活散 三八

此初熱見點解利之劑若小兒身壯力強者可用蘇葛以行表其次者宜此和解疎利之藥若虛而宜補者必當兼顧元氣不得單用此類

羌活 前胡

防風各一 荆芥

獨活各八 細辛

白芷各三 柴胡

炙甘草

蟬退各四

水一鍾半加薄荷三葉煎五分不拘時服○發搐及熱盛不退者調入製過硃砂末服之神效

十三味羌活散 三九

解熱散毒治風癩欲作痘疹者

羌活

獨活

防風

桔梗

荆芥

柴胡

前胡

地骨皮

炙甘草

蟬退

川芎

天花粉

天麻等分

石為細末每服二三錢水一盞入薄荷葉三片煎四分溫服

羌活湯 四一

解發痘瘡兼治肝熱驚狂

羌活

川芎

防風

山柅仁

龍膽草

當歸等分

甘草減半 淡竹葉

薄荷葉

水煎溫服無時

雙解散 四一

痘疹表裏俱實者非此不解

防風

川芎

當歸

連翹

芍藥

薄荷

大黃各五

石膏

桔梗

黃芩各八

荆芥穗

白朮

桂枝各二

滑石各二

甘草各二

水二鍾加生薑三片煎一鍾溫服無時○此即防風通聖散減去麻黃芒硝梔子外加桂枝也

柴胡散子 四二

治痘瘡表裏俱實良方

柴胡

防風

當歸

人參

白芍藥

甘草

黃芩

滑石

大黃等分

右加生

薑一片水煎服

桂枝大黃湯 四三

治腹痛大便不通良方

桂枝大黃湯 四三

治腹痛大便不通良方

桂枝 白芍各二錢半甘草五分大黃半錢 右剉細如生薑一片水一鍾半煎八分食前溫服

防風芍藥甘草湯四四 解毒及陽明經痘出不快

防風 芍藥 甘草等分 右每服一二錢水煎服

荆芥防風甘草湯四五 解毒及太陽經痘出不快

荆芥 防風 甘草等分 右每服一二錢水煎

蟬退膏四六 治痘瘡虛陷不起

蟬退 當歸 川芎 甘草 升麻 防風 荆芥穗等分 加人參 白芍藥 右為末

煉蜜丸如芡實大每服一丸薄荷湯下

消毒散四七 亦名消毒飲 治痘瘡六七日間身壯熱不大便其脈緊盛者用此藥微利之

荆芥穗 炙甘草各一兩 牛蒡子四兩 右為粗散每服三錢水一盞煎七分不拘時徐徐服

四味消毒飲四八 治痘瘡熱感毒氣壅遏無間前後皆可服

人參 炙甘草 黃連 牛蒡子等分 右為粗末每服一錢加薑一片水一盞煎四分去滓溫服

不拘時

六味消毒飲四九 解毒

牛蒡子 連翹 甘草 升麻 紫草 山豆根等分 水一盞煎七分溫服不拘時

消毒化斑湯五十 消風散毒清眼目咽喉

升麻 柴胡 桔梗 甘草 連翹 龍膽草 牛蒡子 防風 蟬蛻

蜜蒙花 水一鍾半加淡竹葉十片煎服

解毒湯五 治一切熱毒腫痛或風熱癩瘡

黃蓮 金銀花 連翹 右水煎服

真人解毒湯 五二 治痘母

忍冬花 半斤 甘草節 一兩 水通 防風 荆芥 連翹 各三

腫消瘡出為度 右分作三劑用水酒各一鍾煎服以

葛根解毒湯 五三 解痘毒止渴良方

葛根 升麻 減半 生地黃 麥門冬 天花粉 等分 甘草 減半

根自然汁一合服之 右取糯米泔水一盞煎七分入茅

寶表解毒湯 五四

人參 黃耆 當歸梢 生地黃 甘草 白芍藥 柴胡 升麻 酒片苓

玄參 地骨皮 石人薄荷葉少許 淡竹葉十片 水煎服

遯源解毒湯 五五 解胎毒之良方

當歸身 川芎 生地黃 白芍藥 人參 生甘草 黃連 連翹 陳皮

木通 等分 水一盞加淡竹葉十片煎半盞溫服無時

陳解毒防風湯 五六 治痘瘡毒氣熾盛

防風 黃芩 地骨皮 白芍藥 炒 荆芥 牛蒡子 右每服四五錢水煎服或為末白湯調

下○外科解毒防風湯方見本門六三

化毒湯 五七 治痘未出腹痛者

白芍藥 炙甘草 各一木香 青皮 枳殼 各七 山查肉 連翹 肉桂 各五 水一盞煎七

分溫服不拘時

消風化毒湯五八

防風 黃耆 桂枝 荆芥穗 升麻 白芍 牛旁子等分 甘草減半 石加薄荷葉七

片水一盞煎七分 溫服無時

涼血化毒湯五九 治痘瘡初出痘焦黑

歸尾 赤芍藥 生地黃 木通 連翹 牛旁子 紅花 紫草 桔梗

山豆根 石水煎服或加童便一小盞亦可

犀角化毒丸六十 治諸積熱及痘疹後餘毒生瘡口舌牙齦糜爛等證

犀角屑銔 生地黃 當歸 防風 荆芥穗各一兩 牛旁子炒并 赤芍藥 連翹

桔梗各七錢 薄荷 黃芩炒 甘草各五錢 石為末煉蜜丸芡實大每服一丸薄荷湯下

五福化毒丹六一 治胎毒及痘後頭面生瘡眼目腫痛

生地黃 天門冬 麥門冬 玄參 熟地黃各三兩 甘草 砒硝各二兩 青黛兩半 石為末煉

蜜丸芡實大每服一丸白湯或薄荷湯化下

料五福化毒丹六二 方在外科七六 治一切熱毒瘡癩

犀角散六三 治痘瘡癰毒時毒熱感煩躁多渴小便赤澀或赤斑

犀角銔 甘草各半兩 防風 黃芩各一兩 石為粗末每服二錢水一小盞煎五分溫服無時

紫草化毒散六四 解實熱毒發痘

紫草 升麻 炙甘草等分 糯米粒五十 水煎服

紫草散六五 治痘疹黑陷氣血虛弱瘡疹不起

紫草 黃耆炙 炙甘草 糯米各錢半 石水煎服

紫草散六 治痘瘡黑陷不起

紫草 當歸 芍藥 甘草 麻黃等分 水一盞煎不拘時服

紫草散子六 治倒陷腹脹大小便秘

紫草 人參 枳殼 山查 木通 穿山甲土炒 蟬蛻等分 水一盞煎五分作三四次溫服

紫草快斑湯六 一名紫草湯 治痘疹血氣不足或血熱不能起發色不紅活不灌膿等證

紫草 人參 白朮 茯苓 甘草 當歸 川芎 芍藥 木通等分

糯米 石每服三五錢水煎服

紫草木香湯六 治痘瘡裏虛瘡塌黑陷悶亂

紫草 木香 人參 白朮 茯苓 甘草 糯米 石每服三錢水煎服

紫草木通湯七 治痘疹出不快

紫草 人參 茯苓 木通 甘草 糯米等分 石每服二三錢水煎服

紫草膏七 紅紫黑陷者暫用之

紫草 白附子 麻黃去節湯泡去黃沫曬乾用 甘草受各 僵蠶炒 全蠍炒各 石為細末用白蜜一兩好酒

半盞先將紫草煎熬成膏旋入各藥丸兒子大每服一丸紫草煎湯化下就用補藥調理 如治驚搐以金

箔為衣薄荷湯下

紅綿散七 亦名天麻散 治痘疹身有大熱面赤氣粗無汗而表未散者可服之此藥以麻黃天麻發表

為主有汗者不可服蓋腠理已開不可再發汗也若有汗而熱則當以惺惺散為和解之劑故仲景之治表

證有宜發汗者有宜和解者有宜調和營衛者若有汗而熱者則和解為宜虛而熱者則調和營衛為宜如

和中散寒之類是也

麻黃去節 天麻

荊芥

炙甘草各二錢 全蠍七枚

右為末每服一錢以水半盞薄荷葉二片入酒四

五滴煎二三沸帶熱服之如疹未出再進一服次又一服即傷風寒證服亦無妨

快斑湯七三 治起發遲

人參五分 當歸

防風

木通各一 甘草三分 木香

紫草

蟬蛻各二

水一盞煎七分溫服

不拘時

快斑越婢湯七四

治痘瘡手足不起發

黃耆炙

白芍藥

桂枝

防風

炙甘草

右加生薑一片棗一枚水煎服

快透散七五

治痘出不快

紫草

蟬蛻

木通

芍藥

炙甘草等分

右每服二錢水煎

王海藏先生云身後出不快

足太陽經也用荆芥甘草防風湯身前出不快手陽明經也用升麻葛根湯四肢出不快足陽明經也用防

風芍藥甘草湯此皆解毒升發之藥也不可不知

鼠粘子湯七六

治痘稠身熱毒盛服此以防青乾黑陷并治斑疹稠密

牛旁子炒

歸身

黃耆

炙甘草

柴胡

黃芩酒炒 連翹

地骨皮

石等分水煎熟退

則止服

射干鼠粘子湯七七

治痘瘡壯熱大便堅實或口舌生瘡咽喉腫痛皆餘毒所致

鼠粘子四兩 甘草炙

升麻

射干各一兩

右每服三錢水一大盞煎六分徐徐溫服 薛氏曰前方若

痘疹初出發熱焮痛根盤赤盛或咽喉口舌疼痛作渴引飲者宜用若因胃氣虛弱發熱而致前證者宜人

參麥門冬散

錢獨聖散七八

治痘瘡倒靨陷伏

用川山甲取前足爪上者燒存性為末每服四五分以木香湯入少酒

服之或紫草湯亦可

無價散 七九 治一切痘瘡倒陷焦黑危急之證

人牙 猪牙 狗牙 猫牙 右以炭火燒去烟存性等分為末每服三分熱酒調下○如養扇寒

戰泄瀉煎異功散調下○一方人牙散只用人牙燒去烟存性為末酒調服

三酥餅 八十 治初發熱用以表汗解毒稀痘神效

辰砂 擇上好明淨無砂石者以絹囊盛之用麻黃升麻紫草荔枝殼同煮麻黃亦用蟾酥另調作餅

研細極亦用蟾酥餅於端午日捉蟾取酥捻前三 右方如遇時行痘疹小兒發熱之初每三歲者將三餅

酥另調作餅 蟾酥餅每餅加麝香少許微炒 各取半分熱酒化下蓋覆出汗如不能飲酒用敗毒散煎湯化下更好○若痘已出滿項紅紫色為熱毒之

盛宜煎紫草紅花湯或化毒湯將辰砂紫草二餅調下少許以解之但痘出之後不可服麻黃餅也蓋辰砂

能解毒紫草涼心火製過亦能發痘解毒麻黃能發表發痘蟾酥能驅臟腑中毒氣從毛腠中作臭汗而出

此四藥誠解毒稀痘之神方也

神應奪命丹 八一 治風邪倒陷及痘毒入裏

辰砂 擇墻壁鏡面者以白紗囊盛之用升麻麻黃紫草連翹四味同入砂罐以新汲水麻黃連根節酒蜜蟬

蛻洗淨去三分紫草五分紅花子五分穿山甲五分真蟾酥三分 右共研細末用醇酒杵丸分作千粒周歲者

半丸二歲者一丸服止三丸熱酒化服厚蓋取汗汗出痘隨出也擇天醫生炁日修合 此方與三酥餅功同

萬奪命丹 八二 治倒陷發痘毒

麻黃 炒焦升麻 錢各五 山豆根 紅花子 大力子 連翹 錢各二 蟬蛻 紫草 人中黃 錢各三

石研細末酒蜜和丸辰砂為衣薄荷葉煎湯下

凍涼膈散 八三 解痘疹裏熱良方

黃芩 連翹為君 甘草 梔子 薄荷 桔梗 竹葉 石水煎服

退火丹 八四 治痘中狂妄神方

滑石 硃砂飛各冰片 三厘 共為細末冷水調一分服得睡少時神安氣寧痘轉紅活矣

陳通關散 八五 通心經降心火利小便良方

山梔仁 大黃炒各木通 甘草炙 車前子 赤茯苓 人參 瞿麥 滑石各三

扁蓄炒五 石用水一盞燈草十根煎半盞溫服

玄參地黃湯 八六 治痘疹衄血

玄參 生地黃 牡丹皮 梔子仁各錢 甘草 升麻各半 白芍藥 一錢 蒲黃炒五 水一盞煎

七分溫服 〇愚謂此方宜去升麻以塞上衝之源勿謂但屬陽明即宜用升麻也

萬清肺飲 八七 治肺熱喘嗽聲啞

麥門冬 桔梗各二 荆芥穗 天花粉 知母各一 石菖蒲 訶子仁各八 石水煎服 〇此當

與清肺湯參用方在後一四五

導赤通氣散 八八 治心虛聲不揚者

木通 生地黃 人參 麥門冬 當歸身 石菖蒲 甘草 石加燈心水煎服

甘桔清金散 八九 治肺熱咽痛聲不清者

桔梗 一兩 甘草 連翹各半 訶子皮 三錢 牛旁子炒七 右為細末每服一錢薄荷葉少許同煎服

加味甘桔湯 九十 咽喉腫痛暫用

桔梗 八分 甘草錢二 牛旁子 射干各六 防風 玄參各四 水一鍾煎服或加生薑一片 〇熱甚者

加黃芩去防風亦可

大如聖飲子 九一 治瘡疹痘毒又咽嗔腫痛熱渴或成腫毒不消等證

桔梗 甘草 鼠粘子炒各一兩 麥門冬五錢 右每服二錢水煎

萬槓皮湯 九二 行滯消痰止嘔吐

橘皮煨去白二錢 半夏一錢 白茯苓錢半 右加生薑三片水一盞煎七分溫服

白氣散 九三 行氣化滯

木香 青皮各五錢 山查肉半錢 右為末每服一錢甘草湯調服

前胡枳殼湯 九四 治痰實壯熱胸中煩悶大便堅實卧則喘急

前胡一兩 枳殼 赤茯苓 甘草炙 大黃各半兩 右吹咀每服三五錢水一大盞煎至六分不拘時

溫服此方宜量大小加減如身溫脈微并瀉者不可服 薛氏曰前症若屬肺胃實熱氣鬱痰滯大便秘結

小便赤澀煩渴飲冷身熱脈實者宜用之以疎通內臟使邪無壅滯則痘瘡輕而易愈也

當歸丸 九五 治便堅三五日不通者

當歸半兩 紫草三錢 黃連炒半錢 炙甘草一錢 大黃二錢半 右以當歸紫草熬成膏下三味研為細末以膏和

為丸如胡椒大三歲以下兒服十九七八歲兒二十九食前清米飯下漸加之以利為度

百祥丸 九六 治痘瘡紫黑乾陷熱毒便秘裏實等症紅芽大戟不拘多少用漿水煎極軟去骨日中晒乾復

內原汁中煮汁盡焙乾研末水丸粟米大每服一二十九丸研赤芝麻湯下

粟變百祥丸 九七 治同前而稍緩可代百祥丸

紅芽大戟去骨青州棗肉個三十 右用水一碗同煎至水盡為度去大戟不用將棗焙乾可和作劑或搗爛

為丸從少至多以木香湯吞服至利為度

排毒散 九八 治痘毒發癰

大黃 當歸梢各一兩 白芷 沉香 木香各半兩 穿山甲七片土炒焦 石為細末看虛實大小加減長流

水煎沸調服

錢氏苦參丸 九九 治痘後潰爛瘡毒疥癩

苦參一兩 白蔞藜 何首烏 牛旁子 荊芥穗各半兩 石為末酒調麵糊為丸竹葉湯下○外科

苦參丸見本門八

稀痘方一百 用老鼠去皮取肉水煮熟量兒大小與食數次出痘甚稀未食當時與食尤效屢試屢驗

稀痘酒百一 最能散毒稀痘

麻黃去節 紫草各二兩 右二味細切布囊盛之浸無灰酒一小壺泥封固凡過天行小兒發熱時與半杯或

一杯量兒大小服之出微汗為佳

三豆湯百二 痘發時預服之

大黑豆 赤小豆 綠豆等分 右用甘草浸水去渣以甘草水煮豆熟為糜逐日空心任意飲其汁

自然出少○此方冬月煮熟令兒常食豆尤妙

絲瓜湯百三 解瘡毒○一方無山查

絲瓜 升麻 芍藥酒炒 生甘草 山查 黑豆 赤小豆 犀角鎊等分 石為粗散每服

三錢水一大盞煎至六分不拘時徐徐溫服量大小加減

辰砂散百四 預解痘毒

好辰砂一錢 老絲瓜近蒂三寸連子燒灰存性 此物發痘瘡最好 石研末蜜水調服多者可少少者可無或以紫草甘草湯調

服尤佳

保嬰丹百五 稀痘