

卷三

5828

金匱翼

金匱要略卷三目錄

膈噎反胃 統論

痰膈 血膈 氣膈 虫膈 梅核膈氣

雜療方

虛勞統論

營衛不足 肺勞 心勞 腎勞 脾勞

風勞 熱勞 乾血勞 傳尸勞

發熱統論

勞倦 火鬱 血虛 陽浮 痰積 瘀血

骨蒸
食積酒毒發熱
藏府血氣分治

惡寒

瘧疾統論

風瘧
溫瘧
溼瘧
癰瘧
壯瘧
痰瘧

食瘧
虛瘧
瘵瘧

金匱翼卷三

飼鶴山人尤在舊集

長洲後學徐錦炳南氏讀

膈噎反胃統論

膈隔也。飲食入咽。不得輒下。噎塞膈中。如有阻隔之者。故名曰膈噎。又其病正在膈間。食不得下。氣反上逆。隨復吐出。故又名膈氣反胃者。飲食入胃。全無阻隔。過一二時。輒復吐出。有反還之意。故曰反胃。甚者朝食暮吐。暮食朝吐。有翻傾之義。故亦名翻胃。不似

噎隔之噎然後吐不噎則不吐也

噎膈之病有虛有實實者或痰或血附着胃脘與氣
相搏。翳膜外裹或復吐出。膈氣暫寬旋復如初。虛者
津枯不澤。氣少不充。胃脘乾痛。食澁不下。虛則潤養
實則疏瀹。不可不辨也。

飲食下咽不得入胃爲噎。食不下通氣反上逆爲塞。
東垣乃謂陽氣不得出者爲塞。陰氣不得降者爲噎。
豈非謂入食從陰而氣出從陽耶。其文則深其旨反
晦。至謂先用陽藥治本。後用堵塞瀉標。吾不知其何

所謂矣。

于和論膈噎累累數百言。謂三陽結熱。前後閼澁。下
既不通。必反上行。所以噎食不下。夫膈噎胃病也。始
先未必燥結。久之乃有大便秘少。若羊矢之證。此因
胃中津氣上逆。不得下行。而然。乃胃病及腸。非腸病
及胃也。又因河間三乙承氣之治。謂噎膈之病。惟宜
用下。結散陽消。其疾自愈。夫脘膈之病。豈下可去。雖
仲景有大黃甘草東垣有通幽潤腸等法。爲便秘嘔
吐者立。然自是食入輒吐之治。非所論于食噎不下

也。獨其所謂慎勿頓攻。宜先潤養。小著湯丸。累累加用。關扃自透。或用苦酸微湧。膈涎因而治下。藥勢易行。設或不行。蜜苦鹽下導。始終勾引。兩藥相通者。其言甚善。蓋痰血在腕。不行不愈。而藥過病所。反傷真氣。非徒無益矣。故以小丸累加。適至病所。無過不及。以半爲期。則治噎之道也。但須審是痰是血而行之耳。膈噎之證。大都年踰五十者。是津液枯槁者居多。若壯年氣盛。非血卽痰。近見有津液枯槁之劑。治一少年肥實男子。至死不悟。哀哉。鶴年

先嬌傳一方云用燒酒一斤浸海蜚花頭一斤入
磁瓶內埋地數年則海蜚化為水矣

取飲半酒杯
妙鶴年又識

痰膈

痰膈因七情傷于脾胃鬱而生痰痰與氣搏升而不
降遂成噎膈其病令人胸膈痞悶飲食輒噎不得下
人胃中必反上逆而嘔與痰俱出治法宜調陰陽化
痰下氣陰陽平均氣順痰下病斯已矣

和劑四七湯

治喜怒憂思悲恐驚之氣結成痰

涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥

不下。此七情所爲也。中脘痞悶。氣不舒快。或痰
飲嘔逆惡心。並皆治之。

半夏

製二錢

茯苓

一錢六分

紫蘇葉

八分

厚朴

薑製一錢二分

水一盞。生薑七片。紅棗二枚。煎至八分。不拘時
服。

丁沉透膈湯

和劑

治脾胃不和。痰逆惡心。或時嘔

吐。飲食不進。十膈五噎。痞塞不通。並皆治之。

人參

砂仁

香附

各一兩

青皮

木香

肉豆蔻

白豆蔻

丁香

各半兩

陳皮

藿香

沉香

厚朴

各七錢五分

草菓

半夏

神麴

各二錢半

甘草

一兩五錢

麥芽

五錢

白朮

二兩

每服四錢水一盞薑三片棗一枚不拘時熱服

滌痰丸

半夏麴

桔礬

皂角

炙刮去皮弦子

元明粉

白茯苓

枳殼

各等分

右爲末霞天膏和丸量人虛實用之

血膈

丹溪治一少年。食後必吐出數口。却不盡出。膈上時作聲。面色如平人。病不在脾胃。而在膈間。其得病之由。乃因大怒未止。輒食麪。故有此證。想其怒甚。則血菀于上。積在膈間。礙氣升降。津液因聚。爲痰爲飲。與血相搏而動。故作聲也。用二陳加香附。荳蔻汁。蘿蔔子。二日。以瓜蒂散敗醬吐之。再一日又吐。痰中見血一盞。次日復吐。見血一鍾而愈。

一中年人中脘作痛。食已乃吐。面紫霜色。兩關脉瀉。乃血病也。因跌仆後。中脘卽痛。投以生新血。推陳血。

之劑吐血片碗許而愈。

一中年婦人反胃。以四物加帶白陳皮。留尖去皮桃仁。生甘草酒紅花濃煎入驢尿。以防生虫。與數十貼而安。

一人咽膈間常覺有物閉悶。飲食妨礙。脉瀉稍沉。形色如常。以飲熱酒所致。遂用生薑汁每服半盞。日三服。至二斤而愈。

一人食必屈曲下膈。梗澁微痛。脉右甚瀉而關沉。左却和。此汚血在胃脘之口。氣因鬱而爲痰。必食物所

致詢其去臍。日飲刮剝酒三盞。遂以生韭汁冷飲細呷之。盡半斤而愈。

一貧叟病噎膈。食入卽吐。胸中刺痛。或令取韭汁入鹽梅滷汁少許細呷。得入漸加。忽吐稠涎數升而愈。此亦仲景治胸痺用薤白。取其辛溫能散胃脘痰涎惡血之義也。愚謂此不獨辛溫散結之義。蓋亦鹹能潤下。而酸味最能開膈胃止嘔吐。品味不雜而意旨周密殊可取也。

一婦年及五十。身材畧瘦小。勤于女工。得噎膈證半

年矣飲食絕不進而大便燥結不行者十數日小腹
隱隱然疼痛六脉皆沉伏以生桃仁七箇令細嚙杵
生韭汁一盞送下片時許病者云胸中畧覺寬舒以
四物六錢加括蕞仁一錢桃仁泥半錢酒蒸大黃一
錢酒紅花一分煎成止藥一錢取新溫羊乳汁一錢
合而服之半日後下宿糞若干明日腹中痛止漸可
進稀粥而少安後以四物出入加減合羊乳汁服五
六十貼而安

江應宿治一老婦年近七旬患噎膈胃脘乾燥屬血

虛有熱。投五汁湯二十餘日而愈。其方蘆根汁藕汁
甘蔗汁牛羊乳生薑汁少許。餘各半饒。重湯煮溫。不
拘時徐徐服。

滋血滿腸湯 治血枯及死血在膈。飲食不下。大

便燥結。

當歸 酒洗三錢 芍藥 煨

生地黃 各一錢半 紅花 酒洗

桃仁 去皮尖炒 大黃 酒煨

枳殼 麩炒各一錢

水一鍾半。煎七分入茱萸汁半。酒盞食前服。

秦川剪紅丸 良方

雄黃

另研

木香

各五錢

枳櫟

三稜

煨

蓬朮

煨

貫仲

去毛

乾漆

炒煨盡

陳皮

各一兩

大黃

一兩半

右麪和丸梧子大每五十丸食前米飲送下吐

出瘀血及下虫爲效

氣膈

氣膈病使人煩懣食不下時嘔沫淳于意作下氣湯

治此疾一日氣下一日能食三日愈然下氣湯方不

傳

一村夫因食新笋羹。嚙納間忽爲一噎。延及一年。百藥不效。王中陽乃以草撥麥芽炒青皮去穢。人參苦桔梗柴胡白蔻南木香高良薑半夏麴共爲末。每服一錢。水煎熱服。次日病家報云。病者昨已痛極。自己津唾亦嚙不下。服藥幸納之。胸中沸然。作聲覺有生意。敢求前劑。況數日不食。特游氣未盡。擬待就木。今得此藥。可謂還魂散也。王遂令其搗碎米煮粥。將熟卽入藥再煎一沸。令啜之一吸而盡。連服數劑。得回生。因名曰還魂散。食以之治七情致病吐逆不定。面