

傷寒論註卷之四

南陽

張機

重刊

慈谿

柯琴

韵伯編註

崑山

馬中騁驤北較訂

太陰脉證

太陰之爲病。腹滿而吐。食不下。自利益甚。時腹自痛。自下之必胸下結鞭。

陽明三陽之裡故提綱屬裡之陽證太陰三陰之裡故提綱皆裡之陰證太陰之土濕氣主之腹痛吐利從濕化也脾爲濕土故傷于濕脾先受之然寒濕傷

人入于陰經不能動藏則還于府府者胃也太陰脉
布胃中又發于胃胃中寒濕故食不內而吐利交作
也太陰脉從足入腹寒氣時上故腹時自痛法宜温
中散寒若以腹滿爲實而誤下胃口受寒故胸下結
腹

自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當温之宜四逆
輩。

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趨少腹者此欲自利也
上條明自利之因此條言自利之兆四五日是太陰
發病之期

傷寒脉浮而緩手足日溫者繫在太陰太陰當發身其
若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十
餘行必自止以脾家實腐穢當去故也

前條是太陰寒濕脉當沉細此條是太陰濕熱故脉
浮緩首揭傷寒知有惡寒證浮而緩是桂枝脉然不
發熱而手足溫是太陽傷寒非太陽中風矣然亦陪
對不發熱言耳非太陰傷寒必手足溫也夫病在三
陽尚有手足冷者何況太陰陶氏分太陰手足溫少
陰手足寒厥陰手足厥冷是大背太陰四肢煩疼少
陰一身手足盡熱之義第可言手足爲諸陽之本尚

自溫不可調脾主四肢故當溫也凡傷寒則病熱太陰爲陰中之陰陰寒相合故不發熱太陰主肌肉寒濕傷于肌肉而不得越于皮膚故身當發黃若水道通調則濕氣下輸膀胱便不發黃矣然寒濕之傷于表者因小便而出濕熱之蓄于內者必從大便而出也發于陰者六日愈至七八日陽氣來復因而暴煩下利雖日十餘行不須治之以脾家積穢臭塞于中盡自止矣手足自溫是表陽猶在暴煩是裡陽陡發此陰中有陽與前藏寒不同能使小便利則利自止不須溫亦不須下也

傷寒下利日十餘行脉反實者死

脾氣虛而邪氣盛故脉反實也

太陰病脉弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其胃氣弱易動故也

太陰脉本弱胃弱則脾病此內因也若因于外感其脉或但浮或浮緩是陰病見陽脉矣下利爲太陰本証自利因脾實者腐穢盡則愈自利因藏寒者四逆輩溫之則愈若自利因太陽誤下者則腹滿時痛當加芍藥而大實痛者當加大黃矣此下後脉弱胃氣亦弱矣少其制而與之動其易動合乎通因通用之

法

大黃瀉胃是陽明血分下藥芍藥瀉脾是太陰氣分
下藥下利腹痛熱邪爲患宜芍藥下之下利腹痛爲
陰寒者非芍藥所宜矣仲景于此芍藥與大黃並提
勿草草看過

惡寒脉微而復利亡血也四逆加入參湯主之
方註見四逆湯註中

○右論太陰傷寒脉証

太陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯

太陰主裡故提綱皆屬裡証然太陰主開不全主裡

也脉浮者病在表可發汗太陰亦然也尺寸俱浮者
太陰受病也沉爲在裡當見腹痛吐利等証此浮爲
在表當見四肢煩疼等証裡有寒邪當溫之宜四逆輩
表有風熱可發汗宜桂枝湯太陽脉沉者因于寒寒
爲陰邪沉爲陰脉也太陰有脉浮者因于風風爲陽
邪浮爲陽脉也謂脉在三陰則俱沉陰經不當發汗
者非也但浮脉是麻黃脉沉脉不是桂枝証而反用
桂枝湯者以太陰是裡之表証桂枝是表之裡藥也
太陰中風四肢煩疼陽微陰濇而長者爲欲愈
風爲陽邪四肢爲諸陽之本脾主四肢陰氣衰少則

兩陽相搏故煩疼脉瀼與長不是並見瀼本病脉瀼而轉長病始愈耳風脉本浮今而微知風邪當去瀼則少氣少血命而長則氣治故愈

四肢煩疼是中風未愈前証微瀼而長是中風將愈之脉宜作兩截看

太陽以惡風惡寒別風寒陽明以能食不能食別風寒太陰以四肢煩溫別風寒是最宜着眼少陽爲半表半裡又屬風藏故傷寒中風互稱少陰厥陰則但有欲愈脉無未愈証惜哉

○右論太陰中風脉証

太陰病欲解時從亥至丑上。

經曰夜半後而陰隆爲重陰又曰合夜至鷄鳴天之陰陰中之陰也脾爲陰中之至陰故主亥子丑時。

何陋

何陋

三

三白散證

寒實結胸，無熱証者，與三白小陷胸湯爲散亦可服。
太陽表熱未除而反下之，熱邪與寒水相結成熱實。
結胸，太陰腹滿時痛而反下之，寒邪與寒藥相結成。
寒實結胸，無熱証者，不四肢煩疼者也，名曰三白者。
三物皆白，別于黃連小陷胸也。舊本誤作三物以黃。
連括蕞投之，陰盛則亡矣。又誤作白散，是二方矣。黃。
連巴豆寒熱天淵，云亦可服，豈不誤人。且妄編于太。
陽篇中，水瀉証後而方後又以身熱皮粟一段雜之。
使人難解。今移太陰胸下結鞭之後，其証其方若合。

符節

三物白散

桔梗

貝母

各二錢

巴豆

一分去皮熬黑研如脂

右二時爲散內巴豆更于硃中

以白

飲和服強人半錢

七羸者減之

貝母主療心胸鬱結桔梗能開提血氣利膈寬胸然

非巴豆之辛熱斬關而入何以勝硝黃之苦寒使陰

氣流行而成陽也白飲和服者甘以緩之取其留戀

于胸不使速下耳散者散其結塞比湯以蕩之更精

病在膈上者必吐在膈下者必利

本証原是吐利因胸下結鞭故不能通因其勢而利導是則結鞭自除矣

不利進熱粥一杯利過不止進冷粥一杯

東垣云淡粥爲陰中之陽所以利小便今人服大黃後用粥止利卽此遺意耳

修定前書

卷四

七

少陰脉證

少陰之爲病脉微細但欲寐也。

三陽以少陽爲樞三陰以少陰爲樞弦爲木象浮而弦細者陽之少也微爲水象沉而微細者陰之少也衛氣行陽則寤行陰則寐日行二十五度常從足少陰之間分行藏府今少陰病則入陽分多故欲寐欲寐是病人意中非實能寐也少陽提綱各臻其妙少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救若小便色白者以下焦虛有寒不能制水故也。

欲吐而不得吐者樞病而開闔不利也與喜嘔同少陽脉下胸中故胸煩是病在表之裡也少陰經出絡心故心煩是病在裡之裡也欲吐不得吐欲寐不得寐少陰樞機之象也五六日正少陰發病之期太陰從濕化故自利不渴少陰從火化故自利而渴少陰主下焦輪津液司閉藏者也下焦虛則坎中之陽引水上交于離而未能故心煩而渴開門不開故自利不能制火由于不能制水故耳然必驗小便者以少陰主水熱則黃赤寒則清白也不干此詳察之則心煩而渴但治上焦之實熱而不顧下焦之虛寒則熱