

武昌醫館叢書

二二

傷寒論目錄

卷第一

辨脉法

平脉法

卷第二

傷寒例

辨痙濕暍脉證

辨太陽病脉證并治上

卷第三

辨太陽病脉證并治中

卷第四

辨太陽病脉證并治下

卷第五

辨陽明病脉證并治

辨少陽病脉證并治

卷第六

辨太陰病脉證并治

辨少陰病脉證并治

辨厥陰病脉證并治

卷第七

辨霍亂病脉證并治

辨陰陽易差後勞復病脉證并治

辨不可發汗病脉證并治

辨可發汗病脉證并治

卷第八

辨發汗後病脉證并治

辨不可吐

辨可吐

卷第九

辨不可下病脉證并治

辨可下病脉證并治

卷第十

辨發汗吐下後病脉證并治

傷寒論目錄

傷寒論卷第三

漢 張仲景述 晉 王叔和撰次

辨太陽病脉證并治中第六

合六十六法方三十九首并見

太陽陽明合病法

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之第

一七味

太陽陽明合病必自利葛根湯主之第二

用前第一

方一云用後第四方

太陽陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯

主之第三八味

太陽病桂枝證醫反下之利不止葛根黃芩黃連湯主之第四 四味

太陽病頭痛發熱身疼惡風無汗而喘者麻黃

湯主之第五 四味

太陽陽明合病喘而胃滿不可下宜麻黃湯主

之第六 用前第五方

太陽病十日以去脉浮細而嗜臥者外已解設

胃滿痛與小茈胡湯脉但浮者與麻黃湯第七

用前第五方小茈胡湯七味

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而

煩躁者大青龍湯主之第八 七味

傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證

大青龍湯發之第九 用前第八方

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬小青

龍湯主之第十 八味加減法附

傷寒心下有水氣欬而微喘小青龍湯主之第

十一 用前第十方

太陽病外證未解脉浮弱者當以汗解宜桂枝

湯第十二 五味

太陽病下之微喘者表未解桂枝加厚朴杏子

湯主之第十三 七味

太陽病外證未解不可下也下之為逆解外宜

桂枝湯第十四 用前第十二方

太陽病先發汗不解復下之脉浮者當解外宜

桂枝湯第十五 用前第十二方

太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解

表證在發汗已發煩必衄麻黃湯主之第十六

用前第五方下有太陽病并二陽併病四證

脉浮者病在表可發汗宜麻黃湯第十七 用前第五方

方一法用桂枝湯

脉浮數者可發汗宜麻黃湯第十八

用前第五方

病常自汗出榮衛不和也發汗則愈宜桂枝湯

第十九

用前第十二方

病人藏無他病時自汗出衛氣不和也宜桂枝

湯第二十

用前第十二方

傷寒脉浮緊不發汗因衄麻黃湯主之第二十

一

用前五方

傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯小便

清者知不在裏當發汗宜桂枝湯第二十二

用前方

第二十

方

傷寒發汗解半日許復熱煩脉浮數者可更發

汗宜桂枝湯第二十三

用前第十二方
下別有三病證

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不

嘔不渴無表證脉沈微者乾薑附子湯主之第

二十四

二味

發汗後身疼痛脉沈遲者桂枝加芍藥生薑各

一兩人參三兩新加湯主之第二十五

六味

發汗後不可行桂枝湯汗出而喘無大熱者可

與麻黃杏子甘草石膏湯第二十六

四味

發汗過多其人叉手自冒心心悸欲得按者桂

枝甘草湯主之第二十七 二味

發汗後齊下悸欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗

湯主之第二十八

四味下有作甘爛水法

發汗後腹脹滿者厚朴生薑半夏甘草人參湯

主之第二十九 五味

傷寒吐下後心下逆滿氣上衝胃頭眩脉沈緊

者茯苓桂枝白朮甘草湯主之第三十

四味

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子

湯主之第三十一

三味

發汗若下之不解煩躁者茯苓四逆湯主之第

三十二 五味

發汗後惡寒虛故也不惡寒但熱者實也與調胃承氣湯第三十三 三味

太陽病發汗後大汗出胃中乾躁不能眠欲飲水小便不利者五苓散主之第三十四 五味即豬苓散

發汗已脉浮數煩渴者五苓散主之第三十五

用前第三十

傷寒汗出而渴者五苓散不渴者茯苓甘草湯主之第三十六 四味

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐名曰水逆五苓散主之第三十七

用前第三十四方
下別有三病證

發汗吐下後虛煩不得眠心中懊憹梔子豉湯主之若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子生薑豉湯主之第三十八

梔子豉湯二味梔子甘草豉湯梔子

生薑豉湯
並三味

發汗若下之煩熱曾中室者梔子豉湯主之第

三十九

用上
初方

傷寒五六日大下之身熱不去心中結痛者梔

子豉湯主之第四十

川上初方

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯

主之第四十一

三味

傷寒醫以丸藥下之身熱不去微煩者梔子乾

薑湯主之第四十二

二味下有不可與梔子湯一證

太陽病發汗不解仍發熱心下悸頭眩身瞤真

武湯主之第四十三

五味下有不可汗五證

汗家重發汗必恍惚心亂禹餘糧丸主之第四

十四

方本闕下有吐蛇先汗下二證

傷寒醫下之清穀不止身疼痛急當救裏後身

疼痛清便自調急當救表救裏宜四逆湯救表

宜桂枝湯第四十五

桂枝湯用前第十
二方四逆湯三味

太陽病未解脉陰陽俱停陰脉微者下之解宜

調胃承氣湯第四十六

用前第三十三方一云
用大茈胡湯前有太陽

病一
證

太陽病發熱汗出榮弱衛強故使汗出欲救邪

風宜桂枝湯第四十七

用前第
十二方

傷寒五六日中風往來寒熱胃脅滿不欲食心

煩喜嘔者小茈胡湯主之第四十八

再見茈胡
湯加減法

附

血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣分爭往來

寒熱休作有時小芩胡湯主之第四十九方用前方渴

者屬陽明證附下有
芩胡不中與一證

傷寒四五日身熱惡風項強脅下滿手足溫而

渴者小芩胡湯主之第五十方用前方

傷寒陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛先與小建

中湯不差者小芩胡湯主之第五十一方用前方
小建中

湯六味下有嘔家不可用
建中湯并服小芩胡一證

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之第

五十二方用前方第五
十一方