

東醫寶鑑內景篇卷之二上

東醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

血

陰血生於水穀

靈樞曰中焦受氣變化而赤是謂血又曰榮出於中焦又曰穀入於胃脈道乃

行水入於經其血乃成內經曰榮者水穀之精

氣也和調於五臟灑陳於六腑乃能入於脈也故

循脈上下貫五

臟經六腑也

血爲榮

內經曰血爲榮榮於內目得血而能視足得血而能步掌得血而能握指得血而能攝

厚曰榮者水穀之精也生化於脾總統於心藏受

於肝宣布於肺施泄於腎灌溉一身目得之而能

視耳得之而能聽手得之而能握掌得之而能握足得之而能步臟得之而能液腑得之而能傳注之於脉少則澁克則實常以飲食日滋故能陽生陰長取汁變化而赤爲血也是故血盛則形盛血弱則形衰矣

血爲氣配

夫血譬則水也氣譬則風也風行水上有血氣之象焉蓋氣者血之帥也氣行則血行氣

止則血止氣溫則血滑氣寒則血滯氣有一息之不運則血有一息之不行病出於血調其氣猶可

以導達病原於氣區區調血何加焉故人之身

調氣爲上調血次之是亦先陽後陰之義也

脉法

脉經曰脉得諸澁濡弱爲亡血脉訣曰諸證失血皆見芤脉脉貴沉細浮大難治正傳曰芤爲

失血澁爲少血又曰吐血之脉必大而芤大爲發熱芤爲失血靈樞曰衄而不止脉大者逆內

經曰脉至而搏難經曰病若吐衄血脈當沉細反

大時絕者死浮大而牢者死丹溪曰吐血脉滑數者難治吐唾血脈小弱

者生實大者死血證脉大且數者逆

熱能傷血凡熱皆出於心熱甚則能傷血熱出於心洗

心散所不可關丹溪曰諸見血皆熱證所

謂知其要者一言而終是也又曰血見熱則行見

寒則凝凡口鼻出血皆係陽盛陰虛有升無降血

隨氣上越於上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經

也○凡血得熱則淖溢故鮮得寒則凝

澁故瘀瘀者黑色也鮮者赤色也

七情動血內經曰諸血者皆屬於心又曰大怒則形氣

絕而血菀於上使人薄厥又曰怒則氣逆甚

則嘔血 怒氣逆甚 嘔血暴癰內逆 肝肺相搏則
血溢鼻口 但怒氣致血證暴甚 故經曰抑怒以全
陰者是也 否則五志之火動甚 火載血上 錯經妄
行 宜用保命生地黃散 助魂下 內傷七情者暴
喜傷心 不能生血 暴怒傷肝 不能藏血 積憂傷肺
過思傷脾 失志傷腎 皆能動血 又曰五志火動失
血 熱者解鬱湯 虛者保命散 助腎又曰大怒薄厥
此怒傷肝而嘔血 以黃連香附青黛柴胡甘草平
其肝則自愈矣 暴喜傷心 則氣緩而心不出
血 故肝無所受 暴怒傷肝 則氣逆而肝不納血 故
血無所歸 又房勞過度 以致陰火
沸騰 血從火起 故錯經而妄行 衄
內傷失血 靈樞曰卒然多食飲 則脹滿 起居不節 用力
過度 則陽絡脈傷 陽絡脈傷 則血外溢 血外
溢 則衄血 陰絡脈傷 則血內溢 血內溢 則後血
前血出上七竅為血溢 大小便便血為血泄 經

失血諸證

失血諸證妄行於勞妄返於下則便紅積熱勝於

則衰涸於外則虛

癰閉尿血

滲透腸間則爲腸風陰虛陽搏則爲崩中濕蒸熱

瘀則爲滯下熱極腐化則爲膿血火極似水則血

色紫黑熱勝於陰則發爲瘡瘍濕滯於血則發爲

痛痒癰疹皮膚則爲冷痺蓄之在上其人喜忘蓄

之在下其人喜狂衄其從肺而上溢于鼻者曰

衄血從胃而上溢于口者曰嘔血吐血其咯血唾

血者出于腎也咳血嗽血者出于肺也其痰帶血

絲出者或從腎或從肺來也其出于小便者曰尿

血曰血淋其出于大便秘者曰腸風曰血痔從

汗空出謂之肌衄從齒齦出謂之齒衄從舌出謂

之舌衄從委中出謂之臍血從

九竅皆出謂之九竅出血

門入

辨血色新舊

新血鮮紅舊血瘀黑又曰風證色青寒證色暗暑證色紅濕證色如烟煤屋漏水

陽證溢出血陰證下如豚肝初便褐色

者重再便深褐色者愈重三便黑色者尤重色

變者以其火燥也如羊血在日色中須與

變褐色久則漸變而為黑色即此意也藏海

蓄血即瘀血積蓄也傷寒熱病身黃尿黑如

蓄血證

狂喜忘者為蓄血也神海藏曰喜忘發狂身

黃尿黑疾已甚也但小腹滿小便不利者輕也

蓄血外證痰嘔燥渴昏瞶迷忘常喜湯水漱口搥

凡病日輕夜重便是瘀血發狂喜漱水而不欲

下咽凡蓄血有上中下之別以衄嘔唾吐血

為上部血結胃中為中部蓄血下焦為下部血蓄

上焦則善忘宜犀角地黄湯防見血蓄中焦胃滿

身黃漱水不欲嚥宜桃仁承氣湯防親血蓄下焦

則發狂糞黑小腹硬痛宜抵當湯九須取盡黑物

為效傷親又生地黄湯通治三焦蓄血藏海綱目

曰瘀血果結宜用玉蜀散防親下焦蓄血藏海綱目

五靈脂生地黄大黃甘草利而逐之澁○沒藥
木水蛭竈蟲五靈脂留尖桃仁皆破瘀血韃○生

韭汁善治胃膈
問瘀血甚效研

生地黄湯

治蓄血證脉沉細微膚冷臍下滿或狂或躁大便秘色黑小便自利老幼氣弱者尤宜

生地黄汁一升無則用生乾地黄二兩乾深炒烟

盡半兩生藕汁半升無則用刺薊汁一升半生藍

葉一握剉無則用乾米半升重二十個炒水蛭

十個炒大黃一兩剉桃仁研半兩石水三升同熬

至二升放冷分二服先服至半日許血未下再服

之此藥比抵當湯丸甚輕恐抵當丸下血不止故

以此湯

主之藏海

血病吉凶

凡血逆行難治順行易治無潮熱者輕有潮熱者重潮盛脉大者死又曰九竅出血身熱

不得臥者卽死又曰凡血證陽盛則身熱多渴陰盛則身涼不渴然血陰也身涼者易愈又曰如心肺脉破血若湧泉口鼻俱出者不治喉○靈樞曰淫而脫形身熱色天然白及後下血衄血衄篤重是爲逆又曰衄而不止脉大是爲逆又曰咳且洩血脫肉其脉小勁是爲逆又曰嘔血胃滿引背脉小而疾是爲逆又曰腹脹便血其脉大時絕是爲逆又曰咳洩血形肉脫脉搏是爲逆○東垣曰諸見血身熱脉大者難治難治者邪勝也身涼脉靜者易治易治者正氣復也又曰血溢上行或唾或嘔或吐皆凶也若變而下行爲惡痢者順也上行爲逆其治難下行爲順其治易故仲景云蓄血證下血者當自愈若無病之人忽然下血利者其病進也今病血證上行而復下行爲惡利者其邪欲去是知吉也○仲景曰吐血咳逆上氣脉數而有熱不得臥者死○無故忽然寫下惡血名曰心色

爲難治。○傷寒太陽證衄血者，病欲愈，熱結膀胱而血自下者，亦欲愈。以此觀之，則他病伏熱之人，上焦痰熱而作吐者，亦其病之有瘳也。雖然，血既吐而自止，則可矣。槌

亡血脫血證

靈樞曰：鼻頭黑白者，亡血也。又曰：衝脈爲血之海，血海不足，則身少血色，面無精光。

又曰：血脫者，色白，天然不擇其脈，空虛。○內經曰：臂多青脈，曰脫血。又曰：安臥，脈盛，謂之脫血。○東垣曰：六脈弦細而澁，按之空虛，其色必白，而天不擇者，脫血也。通用四物湯，防見三才丸。

三才丸

補血虛。天門冬、熟地黃、人參各等分，右爲末，蜜丸。梧子大，每服百丸，酒飲任下。

目綱

衄血

鼻通於腦，血上溢於腦，所以從鼻而出，兼以陽明熱鬱，則口鼻俱出也。又曰：衄血出於肺，宜沙芎散。

三黃補血湯、雞蘇散、陶氏生地黃連湯、保命生地黃散、馮潤清衄散、解鬱散、丹溪曰：衄血以涼。

血行血爲主犀角地黄湯金加片芩升麻
東垣曰衄血出於肺犀角升麻梔子黃芩芍藥生
苧紫苑丹參阿膠之類主之○經曰脾移熱於
肝則爲驚衄又曰春善病衄肝
衄衄又曰陽明厥逆喘咳身熱善衄吐血○衄
不止以麝香散及諸藥塞鼻又用止血諸方法
傷寒當汗不汗熱盛迫血必爲衄宜麻黃升麻湯
麻黃桂枝湯滑石丸鼻流涕久成衄宜犀角地黄

湯

莎芎散

治衄血香附子四兩川芎二兩右爲末每一
錢茶清調下不以時丹溪心法芎附飲同

蓋香附開鬱行氣使邪火散於經絡川芎和血
通肝使血歸於肝藏血歸火散其血立止衄

三黃補血湯

治六脉虛芤而衄吐血升麻白芍藥各
二錢熟地黃一錢當歸川芎各七分半

生地黃柴胡黃芪牡丹皮各五分右剉作一貼水煎服

雞蘇散

治衄血不止乃肺金受相火所制然也雞蘇葉黃芪生地黃阿膠珠白茅根各一錢麥門

冬苦黃蒲黃炒貝母炒桑白皮甘草炙各五分右剉作一貼姜三片水煎服兼以黃丹吹入鼻

陶氏生地黄連湯

治鼻衄成流不止失血過多譫語失神閉目撮空不省人事生地黄黃

芩黃連梔子川芎赤芍藥柴胡苦黃犀角鎊甘草各一錢右剉作一貼大棗一枚同煎臨服以藕

汁磨墨汁

調服

清衄湯

治衄血當歸赤芍藥生地黄香附子黃芩梔子側柏葉各一錢黃連七分赤茯苓苦黃各

五分生甘草三分藕節五個右剉作一貼水煎入童便調服

東醫寶鑑
解鬱湯

治衄血柴胡黃連黃芩黃芪地骨皮生地黃熟地黃白芍藥各一錢右剉水煎服門入

犀角地黄湯

治衄吐血不止及上焦瘀血面黃大便黑能消化瘀血生地黃三錢赤芍藥二

錢犀角鎊牡丹皮各一錢右剉作一貼水煎服門入回春加當歸黃芩黃連各一錢尤佳

麻黃升麻湯

治傷寒表未解熱鬱作衄俗呼謂紅汁麻黃升麻赤芍藥黃芩石膏赤茯苓甘

草各一錢右剉作一貼姜三片水煎熱服微汗門入

麻黃桂枝湯

治傷寒不得汗作衄又治感寒衄吐血麻黃白芍藥黃芪甘草炙各一錢桂枝

當歸各五分麥門冬人參各三分五味子五粒右剉作一貼水煎服門入

麝香散

治衄血不止白礬枯白龍骨各三錢麝香二分半右爲細末每用少許先以冷水洗淨鼻

內然後吹入鼻中或以濕紙蘸藥塞鼻尤妙
百草霜細末二錢水調服名曰黑神散又吹入鼻

中 衄血不止蒲黃炒或血竭末或油
髮灰末或人中白末並吹入鼻中

草本

滑石丸

治傷寒不得汗以致鼻衄纔見血急用此止
之滑石末飯丸梧子大每十丸微嚼破新水

點下立止

目繩

止衄法

治鼻衄久不止諸藥無效神效以大白紙一
張或二張作十數摺冷水浸濕置頂中以熱

熨斗熨之至一二重紙乾則血立止
藥不止用線緊扎手中指中節如左鼻出血扎右

手中指右鼻出血扎左手
中指如兩鼻出血左右
俱扎之一方用色線

繩

治衄不止白芨爲末冷

水調塗山根上
尤妙又方大蒜一枚細研作餅之如錢大左鼻出

兩側

立止仍以冷水調三錢服之

血貼左腳心右鼻出血貼右腳心如兩鼻出血指兩腳心血止即洗去

藥冷水調塗後頂上最絕血路

方春

嘔血吐血

成碗有聲者為嘔成盆無聲者為吐

湯虧勞加黃連主之

研

千金曰吐血有三種有

內衄有肺疽有傷胃內衄者出血如鼻衄但不從

鼻孔出是近從心肺間流入胃中或如豆羹汁或

如切齧血凝停胃中因滿悶便吐或數斗至一石

者是也得之於勞倦飲食過傷也肺疽者或飲酒

之後毒熱滿悶吐之時血從吐後出或一合半升

一升是也傷胃者因飲食太飽之後胃冷不能消

化便煩悶強嘔吐使所食之物與氣共上衝臍因

傷裂胃口吐血鮮赤腸亦絞痛自汗其脈緊而數

名為難治傷胃吐血宜理中湯助陽加川芎乾

葛肺疽吐血宜葛黃丸內衄吐血實者三黃瀉心湯加生地黃虛者茯苓補心湯人參救肺散仲

景曰酒客咳者必致吐血此因極飲過度所致卽肺疽之屬也暴吐紫黑血成塊者此因熱傷血

瘀於中吐出爲好四物湯合黃連解毒湯勑調之又曰吐血覺胸中氣塞桃仁承氣湯勑下之

研火載血上錯經妄行四物湯加山梔童便姜汁姜汁童便吐血要藥也心吐血火病也雖挾

痰只治火則血止嗽汗乃心液熱則變紅而逆出上竅傷寒失汗則熱毒入臟化爲瘀血從口吐

出多屬陽明凡見目紅骨熱神昏狂譫胃腹急滿皆血證也輕者犀角地黃湯加黃芩梔子茅根藕

節重者桃仁承氣湯抵當湯九勑門○吐血宜大薊飲子蓮心散是齋白朮散天門冬湯口鼻

俱出宜四生丸畔霜散黑神散側柏散藕汁散七生湯清熱解毒湯花蕊石散五神湯狗膽丸

葛黃丸

一名葛連丸治飲酒多積熱以致吐衄血垂死者黃連四兩葛花二兩無則葛根代之右

爲末用大黃末水熬成膏和丸梧子大溫水下百丸

三黃瀉心湯

治吐血大作此乃熱之甚也大黃二錢黃連黃芩各一錢加生地黄二錢右剉

作一貼水煎服

神心血不足吐衄血用瀉心湯

何也曰心氣獨不足則不當吐衄也此乃邪熱因

不足而客之故爲吐衄以寒泄其

熱以苦補其心蓋兩全之義也

茯苓補心湯

治勞心吐血白芍藥二錢熟地黄一錢半當歸一錢三分川芎白茯苓人參前

胡半夏各七分陳皮枳殼苦黃乾姜紫蘇葉甘草各五分右剉作一貼姜五片棗二枚煎服

人參救肺散

一名救肺散治虛勞吐血人參黃芪白芍藥熟地黃當歸梢各一錢升麻柴胡