

吳氏醫學述第三種本草從新總目

卷一上

草部

山草類五十二種

卷一中

草部

芳草類三十二種

卷一下

草部

隰草類五十一種

卷二上

草部

毒草類三十一種

卷二中

草部
蔓草類二十八種

卷二下

草部
水草類七種
石草類六種
苔類

三種

卷三上

木部
香木類二十五種

卷三中

木部
喬木類二十四種

卷三下

木部 灌木類二十四種 苞木類四種

寓木類六種

卷四上

菓部 五菓類六種 山菓類一十四種

夷菓類九種 味類五種 蔬類五種

水菓類一十種

卷四中

菜部 葷辛類二十三種 柔滑類一十七

種 蔬菜類七種 水菜類五種 芝栴

類三種

卷四下

穀部 麻麥稻類一十一種 稷粟類一十

六種 菽麥類一十一種 造釀類一十

六種

卷五上

金石部 金類八種 玉類三種 石類二

十六種 鹵石類一十一種

卷五中

水部 天水類二十三種 地水類二十三種

卷五下

火部五種 土部九種

卷六上

禽部 原禽類二十一種 水禽類七種

林禽類七種

獸部 畜類九種 獸類一十五種 鼠

二種

卷六中

蟲部

化生類五種

卵生類二十一種

濕生類四種

魚部

有鱗類一十三種

無鱗類一十種

鱗部

龍類四種

蛇類四種

介部

龜鼈類三種

蛤蚌類二十六種

卷六下

人部一十四種

吳氏醫學述第三種

門人周蘭九生庭

武原吳儀洛遵程輯

男

有榆蒼培同較
有杜雋望

本草從新

草部 毒草類

附子 辛甘大熱純陽其性浮多沉少其用走而

大燥回陽補腎
命火逐風寒濕

不守通行十二經無所不至能引補氣藥以復

散失之元陽
丹溪曰氣虛甚者稍加附子以行參耆之功肥人多濕亦用引

內附子
至南星
皆大毒
之品

吳綬傷
寒蘊要

陳言三
因方

補血藥以滋不足之真陰引發散藥開腠理以

逐在表之風寒

同乾姜桂枝溫經散寒發汗

引溫煖藥達下

焦以祛在表之寒濕

善引火下行津調塗足心亦妙

治三陰傷

寒戴陽

吳綬曰附子陰証要藥凡傷寒傳變三陰中寒夾陰身雖大熱而脈沉細或厥

冷腹痛甚則唇青囊縮急須用之若待陰極陽竭而用之已遲矣東垣治傷寒陰盛格陽面目俱赤煩渴引飲脈七八至但按之則散用姜附湯加人參投半斤得汗而愈此神聖之妙也

中寒中風

卒中曰中漸傷曰傷輕為感胃重則為傷又重則為中

氣厥痰

厥咳逆

元陽下虧生氣不布宜同歸地人參用

自汗

三因有耆附尤附參附三

湯嘉言曰衛外之陽不固而自汗則用耆附脾中之陽遏鬱而自汗則用尤附腎中之陽浮游

而自汗則用參附凡屬陽嘔噦膈噎膈噎多由

虛自汗不能舍三方為治氣血虛胃

冷胃槁而成飲可下而食不下槁在吸門喉間

之厭會也食下胃脘痛須臾吐出槁在賁門胃

之土口也此上焦名噎食下良久吐出槁在幽

門胃之下口也此中焦名膈朝食暮吐槁在關

門大小腸下口也此下焦名反胃又有痰飲食

積瘀血壅塞胃口者如寒痰胃冷則宜姜附參

朮胃槁者當滋潤宜四物

牛羊乳瘀血者加韭汁心腹冷痛暴瀉脫陽

脾泄久痢霍亂轉筋寒客中焦脾胃為霍亂拘

攣風瘴癘瘕積聚督脈為病脊強而厥小兒慢

驚痘瘡灰白癰疽不斂一切沉寒痼冷之證經曰

陰盛生內寒陽虛生外寒開關門消腫滿經曰腎者胃之關

也關門不利故聚

水而從其類也。嘉言曰：腎之閔門不開，必以附子。陽主開，故也。集驗曰：腫因積生，積去而腫再作。若再用利藥，小便愈閉，醫多束手。蓋中焦氣不升降，為寒所膈，唯服附子，小便自通，縮小便，消陰翳，則便溺有節。

壯陽退陰，殺邪辟鬼，通經墮胎，通宜冷服。熱因寒用

也。蓋陰寒在下，虛陽上浮，治之以寒，則陰益甚。治之以熱，則格拒不納，用熱藥冷飲，下嘔之後，冷體既消，熱性便發，情且不違，而致大益。此反治之妙也。又有寒藥熱飲，以治熱証，此寒因熱用，義亦相同也。經曰：正者正治，反者反治。如用寒治熱，用熱治寒，此正治也。或以寒治寒，以熱治熱，此反治也。經所謂必伏其所主，而先其所因，蓋借寒藥熱藥為反佐，以侖向導也。故亦曰從發散，生用峻補，熟用。趙嗣真曰：仲景麻黃附子細辛湯，熟附配麻黃。

趙嗣真

發中有補四逆湯生附配乾姜補中有發其旨
微矣明醫雜著曰氣虛用四君血虛用四物虛
甚者俱宜加熟附蓋四君四物皆和平寬緩之
劑須得附子健悍之性行之方能成功附子熱
毒本不可輕用但有病當雖暑熱時月亦可
用也景岳曰今之用附子者必待勢不可為不
得已然後用之不知回陽之功當於陽氣將去
之際漸用以望挽回若既去之後死灰不可復
然矣但附子性悍獨任為難必得大甘之品如
人參熟地炙甘草之類皆足以制其剛而濟其
勇斯無往不利矣丹溪曰烏附行經仲景八味
丸用為少陰向導後世因以為補藥誤矣附子
走而不守取其健悍走下以行地黃之滯爾相
習用為風藥及補藥殺人多矣韋翰菴曰附子味
甘氣熱峻補元陽微欲絕者起死回生非此
不為功故仲景四逆真武白通諸湯多用之其
有功於生民甚大况古人日用常方用之最多
本非禁劑丹溪乃僅以為行經之藥而云用作

補劑多致殺人言亦過矣蓋丹溪法重滋陰故每訾陽藥亦其偏也

若內真熱

而外假寒熱厥似寒

宜承氣白虎等湯

因熱霍亂等證

服之禍不旋踵陰虛者亦不可加入滋陰藥中

常服

好古曰用附子以補火必防涸水若陰虛之人久服補陽之藥則虛陽益熾真陰愈

耗精血益枯而氣無所附麗遂成不救者多矣

從前附子皆野生所

產甚罕價值甚高而力甚大近今俱是種者出

產多而價值賤力甚薄土人以鹽醃之愈減其

力陝西出者名西附四川出者名川附川產爲

勝川附體鬆而外皮多細塊西附體堅而外皮

光潔以皮黑體圓底平八角頂大者良修治法

煎極膿甘草水將附子泡浸剝去皮劑切作四

塊再膿煎甘草湯泡浸令透然後切片漫火炒

黃而乾放泥地上出火毒

有用水浸麴裏煨令發折則雖熟而毒仍

未去非法之善者有用黑豆煮者有用甘草鹽水姜汁童便煮者恐煮之氣味全出其力亦薄且製之不過欲去其毒性爾若用童便是反抑其陽剛之性矣尤非法之善者唯用甘草湯泡浸其毒解而力不減允爲盡善矣畏人參黃耆甘草防風犀角

童便綠豆反貝母半夏栝蒌白芨白蘘中其毒

者黃連犀角甘草煎湯解之或用黃土水澄清

大燥風

宣吐風痰

大燥回陽補腎命火逐風寒濕

亦可解

附生者為附子

手足凍裂附子去皮為末以水麵調塗之

烏頭

功同附子而稍緩附子性重峻回陽逐

寒烏頭性輕疏溫脾逐風寒疾宜附子風疾宜

烏頭

即附子之母

有謂春採為烏頭冬採為附子者非也

烏附尖

吐風痰治癰癩取其銳氣直達病所

丹溪治許白雲屢用瓜蒂梔子苦參藜蘆等劑吐之不透後用附子尖和漿水與之始得大吐

膠痰數碗而安

天雄

補下焦腎命陽虛

烏附天雄之尖皆向下其脐乃向上生苗

之處寇氏謂其不肯就下潔古謂其補上焦陽虛俱誤認尖為向上爾丹溪以為下部之佐者

庶幾得之若果上焦陽虛則屬心治風寒濕痺

肺之分當用參耆不當用烏附矣
爲風家主藥發汗又能止陰汗
細長者爲天

雄

大燥治
手足風

側子 散側旁生宜於發散四肢充達皮毛治
手足風濕諸痺 連生者爲側子

大燥開
頑痰

草烏頭 辛苦大熱搜風勝濕開頑痰治頑瘡以

毒攻毒頗勝川烏然至毒無所釀制不可輕投

野生狀類川烏故亦名烏啄薑汁炒或豆腐

煮

十便良方治腰脚冷痛草烏頭三
個去皮臍爲末醋調貼須臾痛止

濕風
治面
疾

白附子

辛甘大熱純陽陽明經藥能引藥勢上

行治面上百病

陽明之脈繫於面白附能去頭面遊風可作面脂消癰疵而

風痰治心痛血痺諸風冷氣中風失音陰下濕

癢燥毒之品似中風證雖有痰亦禁用小兒

慢驚勿服根如草烏之小者皺紋有節泡用

宏景曰此藥久絕無復真者今唯涼州生

燥溫宣
祛風痰

天南星

味辛而苦能治風散血

南星防風等分爲末名玉真散

治破傷風刀傷撲傷如神破傷風者藥敷瘡口溫酒調下二錢打傷至死童便調灌二錢連進

三服氣溫而燥能勝濕除痰性緊而毒能攻積