

痔漏方 凡五類

九漏第一 論一首 方八十三首 灸法十六首

論曰夫九漏之為病皆寒熱瘰癧在於頸腋者何氣使生此皆鼠瘻寒熱之毒氣提留於脈而不去者也鼠瘻之本皆根在於臟其末上出於頸腋之上其浮於脈中而未著於肌肉而外為膿血者易去去之奈何曰請從其末引其本可使衰去而絕其寒熱審按其道以予之徐往來以去之其小如麥者一刺知三刺已決其死生奈何曰反其目視其中有赤脈從上下貫瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲死赤脈不下貫瞳子者可治也○凡項邊腋下先作瘰癧者欲作漏也宜禁五辛酒麵及諸熱食凡漏有似石癰累累然作瘰癧子有核在兩頸及腋下不痛不熱治者皆練石散傳其外內服五香連翹湯下之 二方並見卷癰疽門 已潰者治如癰法諸漏結核未破者火鍼鍼使著核結中無不瘥者何謂九漏一曰狼漏二曰鼠漏三曰螻蛄漏四曰蠱漏五曰蚘蟬漏六曰螻蛄漏七曰浮沮漏八曰瘰癧漏九曰轉脈漏

空青商陸散 治狼漏始發於頸腫無頭有根起於缺盆之上連延耳根腫大此得之憂患氣上不得下

其根在肝 一作肺 空青主之商陸為之佐方 空青 蝟腦各二 蝟肝一具 商陸 獨活 黃芩 當歸

乾薑 婦人蓐草 鱉甲 蟹螯 地膽 茴香 礬石各一 芎藭 半分 蜀椒 粒三十 右十六味治

下篩酒服方寸七日三服十五日服之

行義 嘗讀內經僅有鼠瘻寒熱而無九漏之名詳推受病之源多由憂患所致屬於肝腎居多再參

千金瘰癧一一定名何漏因於何病屬諸何臟言雖鑿鑿不無砭砭混玉之疑如狼漏之毒根於肝而用空青商陸散首取空青利竅通津佐以商陸利水導氣然在始病元氣未漓者庶為合宜更取蝟肝

蝟腦入肝追毒蟻螫地膽攻堅破血礬石滌除腐穢一皆眩眩之藥其餘皆歸於獨驚甲苗香椒薑之屬約雖稍平不過為空青等味之助力至用犀草其義未詳

狸骨知母散 治鼠漏始發於頸無頭尾如鼯鼠使人寒熱脫肉此得之食有鼠毒不去其根在胃以狸骨主之知母為之佐方 狸骨 知母 桂心 鯢鯢甲 山龜殼 雄黃 甘草 乾薑等分 右

八味治下篩飲服方寸七日三仍以蜜和內瘡中無不瘥者先灸作瘡後以藥傅之已作瘡不用灸

行義 狸專捕鼠鼠漏用之每效故用狸骨佐以知母龜殼鯢鯢甲薑桂雄黃都是腎家辟除邪毒之藥方下雖言其根在胃而後方之用鼠灰亂髮地黃膏傅並屬腎約恐是腎字之誤亦未可知以二字形頗相似也

治鼠漏方 用蛇虺所吞鼠燒末服方寸七日二不過三服此大有驗但難得耳并傳瘡中佳○又方死鼠形如一枚中亂髮大一枚右二味以臘月猪脂煎令消盡膏成分作二分一分稍稍塗瘡一分稍稍

酒服之瘥鼠子當從瘡中出良地黃膏 治鼠漏瘡復發及不愈出膿血不止方 以不中水猪脂咬咀生地黃內脂中令脂與地黃

相淹和煎六七沸其瘡先用桑灰汁洗去惡次以地黃膏傅上日一易

行義 衍義并見狸骨知母散內 桂子桔梗丸 治螻蛄漏始發於頸項狀如腫此得之食瓜果實毒不去其根在大腸桂子王之桔梗為

之佐方 桂子 龍骨各半附子一兩蜀椒百粒桂心 桔梗 乾薑 礬石 獨活 芎藭各一右十味為末以棗二十枚合搗醋醬和丸如大豆溫醬下五丸加至十丸

行義 桂子芳香通達肺氣佐以桔梗開提胸膈更兼椒薑桂附辛溫破結獨活芎藭祛風活血礬石滌垢龍骨收津使不隨辛溫耗散深得散中寓斂之義 雄黃黃芩散 治蜂漏始發於頸瘰癧三四處俱相連以漬此得之飲流水中有蜂毒不去其根在脾雄

黃王之黃芩為之佐方 雄黃 黃令融 蜂房 一具 茴香 吳茱萸 乾薑 兩各半 蜀椒 粒二百 蟹甲 枚

右八味治下篩傳瘡口上日一度十日止

衍義 蜂漏用雄黃黃芩解毒清熱仍取蜂房助之其餘椒薑茴香輔雄黃以破陰毒蟹甲輔黃芩以

泄旺氣此雖外治之方未嘗不可內服

礬石防風散 治蚘蟬漏始發於頸初得之如傷寒此得之食中有蚘蟬毒不去其根在腎礬石主之防

風為之佐方 礬石 防風 知母 雌黃 桃白皮 乾地黃 獨活 青黛 蟹螯 白芷 松

脂 脂 脂 芍藥 海藻 當歸 各二 白木 蛻皮 各四 蜀椒 百粒 右十七味治下篩飲服一錢七日三

衍義 本經言礬石治寒熱鼠瘻死肌風痺腹中堅癰邪氣諸臟腑經絡無不達之佐以防風開泄風

熱其外諸味分解各經原不專主腎病若言得之食中未嘗不傷在胃亦未可確指蚘蟬也

礬石白木散 治蟻螬漏始發於頸下無頭尾如棗核塊累移在皮中使人寒熱心滿此得之喜怒哭泣

其根在心礬石主之白木為之佐方 礬石 白木 空青 當歸 各二 細辛 一兩 蛻皮 蟹螯 杓

杞 地膽 各一 乾烏腦 三 右十味為末以醋醬服方寸七日三病在上側輸臥在下高枕以便藥

流下

衍義 礬石專除氣分之垢膩佐以白木專理氣分之津液餘皆散堅利數之品惟乾烏腦專於截風

然其病得之喜怒哭泣則肝與肺未必無預則不獨在心矣

地膽甘草散 治浮沮漏始發於頸如兩指使人寒熱欲卧此得之憂愁思慮其根在膽地膽主之甘草

為之佐方 地膽 雄黃 乾薑 續斷 石決明 菴藺根 龍膽草 各三 甘草 一分 細辛 二分

右十味治下篩傳瘡日四五度

衍義 本經言地膽治鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癰墮胎其破血辟毒之力最猛甘草之佐非助其

力解其毒耳其餘諸味雖寒熱錯雜不出解散之意以浮沮病不在裏僅用外敷足矣

雌黃芍藥丸

治瘰癧漏始發於頸有根初苦痛令人寒熱此得之因新沐濕結髮汗流於頭所致其根

在腎雌黃主之芍藥為之佐方

雌黃 芍藥 茯苓 續斷 乾地黄 空青 礬石 乾薑 桔

梗 蜀椒 恆山 虎腎 狸肉 烏腦 蟹螯 礬石 附子 一兩

五酒服十九日二

右十七味為末蜜丸如大

行義

新沐中風則為首風新沐受溼淫者於腦則為瘰癧日久不散失其陽和蘊毒而成其漏故用

雌黃陰毒之物以破陰毒之結佐以芍藥除血痺破堅積此本經主治專取養營之功以和失調之血則痹自開積自散矣其餘虎腎狸肉烏腦蟹螯截風解毒礬石空青附子恆山破結開痰專賴芍藥以固陽根之力

蟹螯白芷丸

治轉脈漏始發於頸濯濯脈轉若驚惕身振寒熱此得之因驚臥失枕其根在小腸

蟹螯主之白芷為之佐方

蟹螯 白芷 綠青 大黃 升麻 鍾乳 甘草 防風 地膽

續斷 麝香 礬石 路 人參 當歸 桂心 路 白木 麥冬 路 一

右十七味為末蜜丸如大豆

酒服十九日二勿食米慎房室百日

外臺無大黃桂心麥門冬白木鍾乳

行義 轉脈之漏因於驚臥失枕驚臥失枕有何太毒而用蟹螯地膽峻攻之味况有鍾乳白木之相

反大振格敵之威豈在白芷相佐之力歟其綠青與空青同出銅礦功專上涌風痰濟以礬石窮搜積

垢且得參朮彌助其雄如虎斯翼故略借大黃以通下泄之機而為毒邪開一去路也於是再推致病

之由苟非別有所觸而蘊毒但需和血榮筋便可向安又何必竭厥從事於峻攻耶

治九漏方

空青 商陸 知母 狸骨 桔梗 防風 荏子 礬石 黃芩 白芷 芍藥 甘草

雌黃 白木 礬石 地膽 蟹螯 雄黃 等分

右十八味為末蜜丸如大豆以酢服三九三十

日知四十日愈六十日平復百日內慎房室

一方為散酢服一刀圭日二服老小減半

行義

九漏者因患定名因名定治上雖瘰癧瘰癧辨晰第恐臨證致疑故又立統治諸法總以辟毒破堅

行義

九漏者因患定名因名定治上雖瘰癧瘰癧辨晰第恐臨證致疑故又立統治諸法總以辟毒破堅

為務所用藥味不出上方未遑逐一復贅

又方 蝟皮半枚 鯪魚甲一枚 樓雞各四枚 鶴骨六分 蜥蜴 蜈蚣各一枚 蜀椒 附子 當歸 蜂房 桂心

地榆 通草 乾漆 牡丹皮 薏苡仁 蒺藜子 漏蘆一作蘆 龍膽一作龍骨 土瓜各二分 蟹螯四分

蛇牀子 苦參 大黃 蛇蛻皮 雄黃 蘭茹 細辛各二分 右二十八味為末酒服五分七以知

為度日一服○又方 蟹螯七枚 蝟皮 真珠 雄黃各等分 右四味治下篩酒服半錢七日三○又

方 成煉松脂填瘡孔滿日三四度七日瘡有神驗○又方 蟹螯七枚 雄黃 桂心 犀角各一兩

右四味為末酒服一錢七日二服痛從小便出○又方 馬齒莧陰乾 臘月燭燼等分 右二味為末

以臘月猪脂和其瘡先以暖泔清洗淨拭乾後以藥敷日三○又方 乾牛屎 乾人屎等分 右二

味搗先以綿絮瘡上綿上著屎蟲聞屎氣即出若瘡即以絲去之更別取屎及綿著其上如前蟲盡乃

止○又方 苦匏四枚大如蠶者各穿一孔如指大置湯中煮數沸取一竹筒長一尺一頭內匏孔中

一頭注瘡孔冷則易之

治一切漏方 蟹螯四十枚 豉九枚 元青枚二十 生大豆黃 地膽各十枚 蜈蚣半寸 犀角 牛黃各一枚 右八

味為末蜜丸如梧子大飲服二丸須臾多作酸醬粥冷飲之病從小便出視尿盆中如有蟲形狀又似

膠汁乃病出也間日一服飲粥如常小弱者隔三四日候無蟲出瘡漸瘳持忌油膩一切器物皆須灰

洗乃作食崔氏云治九漏初服約夜少食明日服二丸至七日其虛悶可者食薑黃菜羹其餘脂膩○

又方 煮鹽花以麵攤病上內鹽花麵匡中厚二寸其下以桑葉三重藉鹽候冷熱得所可忍冷則無

益則傷肉一日一度候瘳瘳根株勢消則止若已作瘡者搗糝穀為末粉之○又方 檨北陰白皮三

十斤剉碎以水一石煮取一斗去滓煎如錫又取都廁上雄雌鼠屎各十四枚燒令汁為末內煎中又

溫酒一升投煎中合攪之蠲人服半升當有蟲出○又方 霜下匏花曝乾為末傳之○又方 搗土

瓜根傳之燥則易不限時節○又方 死蛇去皮肉取骨為末合和封瘡上大痛以杏仁膏摩之痛止

○又方 死蛇和臘月猪脂合燒為末內孔中○又方 燒死蛻螂為末醋和塗之又死蛇灰醋和傳之○又方 故布裹鹽如彈丸大燒令赤為末酒服之○又方 服白馬屎汁一升○又方 猪脂一升酒五合煎沸頓服之○又方 水研杏仁服之○又方 鹽麵和燒灰傳之○又方 正月雄狐屎陰乾搗末水和服

治漏作瘡孔方 用露蜂房為末以臘月猪脂和傳孔中

治漏發心胸以下者方 松脂 武都雄黃略三 右二味和為塊刀子刮為散飲服一方寸七日二不

瘥更合

治漏方 鍛落鐵屑 狗頰車連齒骨炙 虎屎 鹿皮帶毛為灰 右四味等分治下篩以猪脂和內瘡中

須臾即易日五六度

治一切冷瘻方 用人所吐蛔蟲燒灰先用甘草湯洗去瘡惡然後著灰無不瘥慎口味

治鼠瘻腫核痛未成膿者方 以柏葉傳腫上熬鹽著葉上熨之令熱氣下即消

治風漏及鼠漏方 赤小豆 白飯 黃芪 牡蠣等分 右四味為末酒服方寸七日三

治蟻蝨瘻方 先以泔清煮柵葉取汁洗瘡拭乾次以柵葉灰內瘡中

治蜂漏方論 初生狀如桃而瘡搔之則引大如雞子如覆手者熬鹽熨之三宿四日不瘥至百日成瘻

其狀大如四五寸硬廣三寸中生蜂作孔乃有數百以石硫黃隨多少燂燒令汁出著瘡孔中須臾間

見蜂數十蜂盡乃瘥

治蜂瘻方 以人屎蛇蛻灰臘月猪膏和傳之○又方 鷓鴣頭燒灰傳之○又方 取蜂巢燒灰臘月猪

脂和傳孔中

治蟻漏孔容鍼亦有三四孔者方 用蝟皮肝心燒灰為末酒服一錢七○又方 死蛇腹中鼠以蠟月

猪脂煎候焦去滓傳之○又方 取大黃鮮燒耕堡土令赤以苦酒浸堡土持合壁土乾熟以黃作膏

屋土上層朝今煎製瘡上○又方 鱖鮓甲二七枚燒末以猪脂和傅瘡上○又方 半夏一枚搗末以鴨脂和傅上

治瘰癧漏橫闊作頭狀若杏仁形亦作瘰癧方 雄雞糞燒灰臘月猪脂和封之

治蛇蟬漏方 用牛屎燒灰臘月猪脂和傅之○又方 蛇蟬丸即蛇蟬所食之屎為末傅之○又方 乾牛屎為末傅之瘡即撥却更厚封瘡乃止○又方 熱牛屎塗之數易應有蛇蟬出

治蚯蚓瘻方 雞屎 蚯蚓屎等分 右二味為末用壯猪下頷髓和傅之

治蠍蟻瘻五六孔皆相通者方 搗茅根汁著孔中

治蝦蟆瘻方 用五月五日蛇頭及野猪脂同水衣封之

治蛇瘻方 用蛇蛻皮燒灰臘月猪脂和封之

治蛙瘻方 用蛇腹中蛙燒灰封之

治顛當瘻方 搗土瓜根傅瘻慎口味

治雀瘻方 取母猪屎燒灰臘月猪脂和傅上當有蟲出如雀形

治膿瘻方 以桃花為末猪脂和封之

治石瘻兩頭出者其狀堅實令人寒熱方 以大鐵鉞破之次用鼠粘葉二分為末和雞子白一枚封之

○又方 搗槐子和井花水封之○又方 搗生商陸根捻作餅子如錢大厚三分安漏上以艾炙餅

上乾易之灸三四升艾瘡外臺灸瘰癧○又方 七月七日日未出時取麻花五月五日取艾等分合搗作

炷用灸瘡上百壯外臺灸瘰癧

灸法

九漏灸肩井二百壯 漏灸鳩尾骨下宛宛中七十壯 諸漏灸瘻周圍四畔瘡 諸惡漏中冷息肉灸

足內踝上各三壯二年六壯 寒熱胸滿頸痛四肢不舉腋下腫上氣胸中有音喉中鳴天池主之

寒熱頸腫後谿主之 寒熱酸痛四肢不舉腋腫馬刀瘰癧脾脾脰骨搖酸痺不仁陽輔主之 寒熱頸腋腫申脉主之 胸中滿腋腫馬刀瘰癧自嚙舌煩天牖中腫寒熱胸脇腰膝外廉痛臨泣主之 寒熱頸腫丘墟主之 腋下腫馬刀瘰癧傷太衝主之 寒熱頸瘰癧大迎主之

五白膏 治鼠漏及瘰癧方 白牛皮 白馬屎 白猪屎 白羊屎 白雞屎各一漏蘆二斤 右六味各

于石上燒作灰研篩以猪膏一升三合煎亂髮一兩半令極沸盡消乃肉諸末微火上煎五六沸約成去瘡痂以鹽湯洗淨帛拭乾傅此膏若無痂亦須湯洗日再敷若著膏當以帛裹上勿令中風冷神驗

曾青散 治寒熱瘰癧及鼠瘻方 曾青 荏子 礬石 礬石附子 各半 栝萸根 露蜂房 當歸 防

風 芎藭 黃芪 黃芩 狸骨 甘草 各二 細辛 乾薑 各一 斑貓 蜺青 各五 右十七味治下

篩酒服一方寸七日再○又方 治寒熱瘰癧方 土瓜根 連翹 龍膽 黃連 栝萸根 苦參

芍藥 恒山 各一 右八味為末酒服五分七日三 一莫方及外臺有狸骨一枚 黃連 黃芩 鼠李根皮 栝

萸根 治身體有熱瘰癧及常有細瘡并口中生瘡方 葛根 黃芩 黃連 黃芩 鼠李根皮 栝

萸根 芍藥 苦參 石龍芮 防風 防已 白斂 龍胆 各一 梔子仁 各四 右十二味為末蜜丸如

梧子大飲服十五丸日再 一莫方有黃 龍胆 各一 梔子仁 各四 右十二味為末蜜丸如

治瘰癧方 用白殭蠶治下篩水服五分七日三服十日瘥○又方 狸頭一枚炙搗篩飲服方寸七日

二○又方 故履內氈替燒末五七和酒一升平旦內日服之強行須臾吐鼠出三朝服○又方 狸

頭蹄骨等炙黃搗篩為散飲服一錢七日再○又方 貓兩眼陰乾燒灰并花水服方寸七日再○又

方 乾貓舌為末傅瘡上○又方 狼屎灰傳之○又方 狐頭狸頭灰傳之○又方 五月五日取

一切種種雜草煮取汁洗之○又方 貓腦 莽草 等分 右二味為末著瘰孔中

灸漏方 葶藶子 一合 豉 一升 右二味和搗令極熟作餅子如大錢厚二分許取一枚當瘡孔上作

大艾炷如小指大炙餅上三炷一易三餅九炷隔三日復一灸 可灸瘰癧等瘡入瘰癧人

灸瘰癧方

一切瘰癧在項上及解處但有肉結疑似作癰及癰癰者以獨蒜截兩頭留心大作艾炷稱蒜大小貼瘰癧上灸之勿令上破肉但取熱而已七壯一易蒜日灸之取消止一切瘰癧灸兩膈裏患瘰癧處宛宛中日一壯七日止神驗 又灸五里人迎各三十壯 又灸耳後髮際直脈七壯 又灸

患人背兩邊腋下後文上隨年壯

行義

治九漏方已下至此凡六十餘方無大小一一類次靡遺所謂牛溲馬勃皆可收之藥籠也

腸癰第二

論三首 灸法二首 方二十九首

論曰卒得腸癰而不曉其病候愚醫治之錯則殺人腸癰之為病小腹重而強抑之則痛小便數以淋時汗出復惡寒其身皮皆甲錯腹皮急如腫狀其脈數者小有膿也巢氏病源云數者已有膿也其脈遲緊者未有膿也甚者腹脹大轉側聞水聲或遠臍生瘡或膿從臍中出或大便秘出膿血 問曰官羽林婦病醫脈之何以知婦人腸中有膿為下之即愈師曰寸口脈滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮數則為衛衛數下降榮滑上升榮衛相干血為濁敗小腹居堅小便或澀或復汗出或復惡寒膿為已成設脈遲緊即為瘀血血下則愈

大黃牡丹湯

大黃 四兩 牡丹 三兩 芒硝 二兩 瓜子 一升 桃仁 五十粒

右五味咬咀以水五升煮取一升

頓服當下膿血

金匱方用牡丹一兩瓜子半升芒硝二合則藥方用瓜子半升芒硝半合劉涓子用硝石三合云腸癰之病小腹痛堅或在膀胱左右其色或白堅大如掌熱小便欲調時自汗出其脈遲堅者未成膿可下之當有膿

腸癰湯方

牡丹 甘草 敗醬 生薑 茯苓 各二 桔梗 薏苡仁 麥門冬 各三 丹參 芍藥 各四

右十一味咬咀以水一斗煮取三升分三服日三服 又方 薏苡仁 一升 牡丹 桃仁 生地黃 五兩

生地黃 五兩

右十一味咬咀以水一斗煮取三升分三服日三服 又方 薏苡仁 一升 牡丹 桃仁 各三 瓜瓣 二升

瓜瓣 二升

右四味咬咀以水六升煮取二升分二服 兩云腹中病痛煩滿不安或脹滿不下

飲食小使澀此病多是腸癰人多不識婦人產後虛熱者多是此証總非癰疽但是便服此方無傷損也

凡腸癰其狀兩耳輪文理甲錯初患腹中苦痛或繞臍有瘡如粟皮熱便膿血出似赤白下不治必死方

以馬蹄灰雞子白和塗即拔毒氣不過再塗瘡○又方 以瓜子三升搗末水三升煮取一升半分

三服○又方 以馬牙燒灰雞子白和金乾即易

行義

內癰癰證不早每多誤治之失嘗攷金匱大黃牡丹湯與千金無異者取大黃下瘀血而閉壯丹治瘀血留舍芒硝治五臟積熱滌去蓄結推陳致新之功較大黃尤銳桃仁治病疲邪氣下瘀血而閉之功亦與大黃不異甜瓜瓣別錄治腹內結聚成潰膿血專於開痰利氣為內癰脈遲緊膿未成之專藥 其後腸癰湯二方即金匱意以附子敗醬散之變方以治膿成膿數不可下之證金匱脈意以十分附子二分敗醬五分千金慮附子助熱易以牡丹又因敗醬難覓易以瓜瓣更加前方中桃仁以助牡丹之力又以小方之力雖專不若大方兼培津血故特立腸癰湯方已潰可以排膿未潰可以解毒良工苦心無以過之其餘丹方如馬蹄灰和雞子塗則有散血之功馬牙灰和雞子塗則有拔毒之用單服瓜瓣湯則有開痰利導之益故并存之

灸腸癰方 屈兩肘正灸肘頭銳骨各百壯則下膿血即瘥

論曰產後宜勤擠乳不宜令汁蓄積蓄積不去便結不復出惡汁於內引熱溫壯結堅牽掣痛大渴引飲乳急痛手不得近成如乳非癰也急灸兩手魚際各二十七壯斷癰脈也不復惡手近乳汁亦自出便可手助逆將之則乳汁大出皆如膿狀內服連翹湯外以小豆薄塗之便瘥 婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黃汁出浸淫為長百種治不瘥者動經年月名為如乳婦人飲兒者乳皆欲斷世謂剪抄乳是也宜以赤龍皮湯及天麻湯洗之傳二物飛烏膏及飛烏散佳若始作者可敷黃芩漏蘆散及黃連胡粉散並佳

赤龍皮湯方 槲皮切三升以水一斗煮取五升夏冷用之冬溫用之分洗乳亦洗諸敗爛久瘡洗竟傳

膏散

天麻湯方 用天麻草切五升以水一斗半煮取一斗隨寒熱分洗乳以殺瘡也此草葉如麻冬生夏著

花赤如鼠尾花也亦洗浸淫黃爛熱瘡瘰疽陰蝕小兒頭瘡洗竟傳膏散

飛鳥膏方

傾粉

是燒硃砂作水銀上

礬石

各三兩

右二味為末以甲煎和如脂傳乳瘡日三傳之作

散者不須和汁自著者可用散其諸熱瘡黃爛瘡浸淫汁瘡丈夫陰蝕瘡淫瘡小兒頭瘡月蝕口邊肥

瘡癰瘡等並皆主之

黃連胡粉散

黃連

二兩

胡粉

二兩

水銀

一兩

右三味為末相和要皮裏熟按之自能和合縱不得成

一家亦得水銀細散入粉中也以傳乳瘡諸淫瘡黃爛肥瘡等若乾者甲煎為膏

治如乳乳生瘡方

蜂房

猪甲中土

車轍中土

各等

右三味為末苦酒和傅之

鹿角散

治婦人乳生瘡頭汁出疼痛不可忍者方

鹿角

二分

甘草

一分

黃於銅器中置溫處灸上傅之日再即愈

治妒乳方

以葵莖灰搗篩飲服方寸七日三即愈

集驗方直搗為散不為灰

又方

燒自死蛇為灰以猪脂和塗

大良

衍義

婦人經斷則有軀生育則乳子乳母有故則乳汁蓄積不出壯熱結痛便宜服連翹湯分利其

熱外用赤龍皮湯及天麻草湯洗之飛鳥膏專祛膿垢黃連胡粉散兼收淫熱蜂房二王杜風解毒鹿

角甘草散熱行血葵莖利竅通津蛇反截風拔毒皆乳患小方之可採用者也

灸法

以蒲橫度口以度從乳上行灸度頭二七壯

論曰產後不自飲兒并失兒無兒飲乳乳蓄結癰不飲兒令乳上腫者以雞子白和小豆散傳乳房令消

結也若飲兒不泄者數捻去之亦可令大孩子含水使口中令為啞取滯乳汁吐去之不含水漱去熱喜

令乳頭作瘡乳孔塞也

凡婦人多患乳癰年四十已下治之多瘥年五十已上慎勿治治之多死不治

自得終天年

連翹湯

治妒乳乳癰方

連翹

芒硝

各二兩

芍藥

射干

升麻

防己

杏仁

黃芩

大黃

胡甘草各三 右十一味以水九升煮取二升五合分三服

行義 如乳乳癰總以清熱利竅解毒為主連翹治癰腫惡瘡甘草治臟腑邪氣黃芩治惡瘡疽蝕芍藥治血痹止痛射干治胸中結氣杏仁治產乳金瘡升麻治風腫諸毒柴胡治腸胃結氣防己行通十二經大黃下瘀血閉芒硝破五臟積熱上下宣通而乳癰解矣

治乳癰方 麥門冬一升黃芩芍藥茯苓各二桑寄生人參黃芪防風甘草各三粘糖八兩大棗五枚 右十一味以水一斗煮取三升去滓內糖一沸分四服

行義 連翹湯治乳癰全盛之實故用硝黃此方治乳癰潰後之虛故用參芪佐以苓防兼清風熱助以棗糖專資津氣門冬清膈上之熱茯苓調心下之虛芍藥和血斂陰寄生去風逐濕甘草治五臟六腑寒熱邪氣也

又方 先服前湯五月後服此丸即愈方 天門冬五兩澤蘭五分大黃十分升麻六分羌活桑寄生防風人參黃芪乾地黃白芷通草各二黃芩枳實五味子茯苓天雄芍藥當歸各一 右十九味為末蜜丸酒服二十丸日二加至四十九

行義 乳癰服湯不瘥元氣漸衰邪毒愈熾以故補瀉兼施益以天雄亟通乳竅蜜丸酒服緩行諸藥之力

治乳癰始作方 廣濟方云治乳癰大堅硬赤紫色衣不得近痛不可忍者大黃棟黃芍藥馬蹄各等 右四味治下篩飲服方寸匕取汗出瘥者覺後腫處最而不痛經宿乃消

行義 乳癰始作勢在啞攻故用棟黃佐大黃導溼熱下走芍藥助馬蹄以斂津使不隨毒邪散漫也

又方 黃芩白斂芍藥等分 右三味為末以漿水飲服半錢日七三若左乳汁結者可將去右乳汁若右乳汁結者可將去左乳汁治小品云

行義 黃芩清風熱白斂散結腫芍藥和營氣服用漿水以斂傷殘之氣

民國六年石印

又方 鹿角生剉為末服取其消腫散血乳癰用之最捷

行義

治婦人乳腫痛方 瘰癧子 大黃各一 敗醬三分 薏苡仁 桂心 人參 附子 黃芪

黃連

雞骨 當歸 芍藥 枳實 通草各二 右十四味為末蜜丸如梧子大未食飲服三丸不

知益至五九日三無所忌 一方無大黃敗醬黃連通草為散酒服方寸七

行義

方用大黃黃連解熱桂心附子散結人參黃芪固本當歸芍藥和營敗醬薏苡敗膿枳實通草

利數九楨瘰癧破除惡血雞骨引入厥陰也

排膿散

治乳癰除惡肉方 茯苓 鐵精 桂心 細辛 黃芩 芍藥 人參 防已一作防風 當歸

乾薑

各二 甘草五分 右十一味治下篩酒服方寸七日夜一服約十日膿血出多勿怪○又方

生地黃

三升 芒硝三合 鼓一升 右三味合搗傳上熱即易之取瘡止一切癰腫皆用之 一方單用

地黃傳之

行義

乳癰潰久不愈元氣大傷血氣凝滯致生惡肉故用茯苓歸芍人參甘草護持元氣細辛桂心

乾薑溫理伏邪防已通行經脈鐵精鎮攝虛火黃芩清解風熱并緩薑桂之性庶不隨膿外脫外用地

黃芒硝香豉傳之惡肉可漸化矣

治乳癰方

大黃 鼠屎新者各一分 黃連二分 右三味為末以黍米粥清和傳乳四圍痛止即愈無黍米

即粟米粳米亦可○又方 大黃 莽草 生薑各二 伏龍肝分二 右四味搗為末以酢和塗乳痛

即止

行義

大黃黃連辟除毒熱鼠屎通厥陰經為乳癰之藥 又方以大黃消腫熱莽草祛風毒生薑

消脹滿伏龍肝和營血醋和塗乳取其酸收即漿水服散之義

又方 取葱白搗傳之并經汁一升頓服即愈

治乳癰二三百日服療不瘥但堅紫色青柳根熨方

以柳根削取上皮搗令熟熬令溫盛者練囊中熨

乳上乾則易之一宿即愈

治妒乳乳癰腫方

取研米槌二枚炙令熱以絮及故帛搗乳上以槌更互熨之瘥止已用立效

治乳癰堅方

以水罐中盛醋消清燒石令熱內中沸止更燒如前少熱內乳清之及冷更燒石內漬不

過三度燒石愈

行義

葱白搗傳取其通竅

柳根溫熨取其解毒

焙槌熱熨取其溫散

醋泔溫漬取其酸斂各

有妙用鄉村無約處宜之

五痔第三

論一首

灸法二首 方二十六首

論曰夫五痔者一曰牡痔二曰牝痔三曰脈痔四曰腸痔五曰血痔牡痔者肛邊如鼠乳時時清膿血出

牝痔者肛腫痛生瘡脈痔者肛邊有瘡癢痛腸痔者肛邊核痛發寒熱血痔者大便圓血隨大便汚衣又

五痔有氣痔寒溫勞淫即發蛇蛻皮主之牡痔生肉如鼠乳在孔中頗出見外妨於更衣繫甲主之牝痔

集驗作酒痔

從孔中起外腫五六日自潰出膿血蛻皮主之腸痔更衣挺出久乃縮母指左足懸蹄甲主之脈

痔更衣出清血蜂房主之五約皆下篩等分隨其病倍其主藥為三分旦以井花水服半方寸七病甚者

旦暮服之亦可四五服禁寒冷食猪肉生魚菜房室惟食乾白肉病瘥之後百日乃可通房內又用約導

下部有瘡內約瘡中無瘡內孔中又用野葛燒末刀圭內藥中服藥五月知二十日若三十日愈痔痛通

忌葷菜

行義

痔漏皆由溼熱所致故昔人嘗以雨過溼蒸生菌譬之千金首取血肉之物分治五痔獨不及

血痔者以散血之藥頗多如犀角馬蹄牛腮蝨麝之屬皆可取用又以野葛燒灰略入劑中者專取毒

劣之性以攻贅疣獨專藥為痔家切禁者惡其傷殘陽氣而乏長養之功也

治五痔成醫所不能愈者方

秦艽

白芷

厚朴

紫參

亂髮

紫苑

雷丸

藥本

石南

廣靈略一貫眾 蟲蟲略八猪後懸蹄樹四

右十三味合搗下篩以羊髓脂煎和丸如梧子大空

腹飲下十五丸日二若劇者夜一服四日肛邊癢止八日膿血盡鼠乳悉瘳滿六十日終身不復發久服益善忌魚猪肉等

行義

草根木實之可以辟除淫熱者痔家恒取用之如秦艽白芷藁本紫參皆風熱藥紫苑實最厚

朴雷丸散結滯樂亂髮猪蹄燕廬破積血藥獨石南一味為腎家風藥約腎主二便特取以祛下焦風毒也

槐子散

治燥淫痔痔有雄雌皆主之方 槐子 乾漆 秦艽 吳茱萸根白皮 白芷 桂心 黃

芩 黃芪 白斂 牡蠣 龍骨 雷丸 丁香 木香 蒺藜子 附子 右十六味為末蜜丸如

梧子大飲服二十九日三千金翼無白斂深師無黃芪云治若暴有乾燥腫痛者有崩血無數者有鼠乳附核者有腸中煩癢者三五年皆殺人主忌飲酒及作勞犯之即發

行義

方中蒺藜白芷秦艽黃芪祛除風氣槐子白斂清解毒邪二香桂附吳茱萸根溫散結滯乾漆

雷丸攻逐瘀血牡蠣龍骨黃芪收斂津氣以其寒熱間錯氣血交攻斂散並列故牡痔牝痔氣痔血痔

乾痔淫痔咸可治之

小槐實丸

治五痔十年者方 槐子 三斤 白糖 二斤 礬石 硫黃 各一大黃 乾漆 龍骨 各十

七味以四味搗篩其三種石細切及糖內銅器中一石米下蒸之以綿絞取汁和約末併手丸如梧子

大陰乾酒服二十九日三稍增至三十丸

行義

味雖略減而寒熱斂散血氣之約靡不畢具不同蜂蜜而用飴糖者取其專滋穀藏也

槐子酒

治同前 槐子 二斗 槐東南枝 一石 槐東南根 三石 右三味內大釜中以十六斛水煮取五

斛澄取清更煎取一石六斗炊兩斛黍米上麴二十斤釀之攪令調封泥七日酒熟取清飲適性常令

小小醉合時更取滓煮取汁淘米及洗痔不得用水忌生水故也

行義

槐乃虛宿之精寒而不滑兼取三槐益腎清火為痔家之專約惟中氣虛寒慎用

又方 塗熊胆取瘰止神良一切方皆不及此○又方 七月七日多採槐子熟搗取汁內銅器中重縣密蓋著宅中高門上曝二十日已上煎成如鼠屎大內穀道中日三亦主瘰及百種瘡○又方 取生槐白皮十兩熟搗丸如彈丸綿裹內下部中此病宜常食篇竹葉及煮羹粥大佳○又方 取鯉魚腸三具以火炙令香縣裹內穀道一食久蟲當出食魚腸數數易之盡三具瘰○一方炙腸令香坐上蟲出經用有效○又方 虎頭 犀角 右二味為末和不中水猪脂大如雞子塗瘡上取瘰

治五痔及脫肛方 槐白皮 二兩 猪脂 半斤 榛子 桃仁 各十枚 巴豆 七粒 蕒草 一作辛夷 白芷 甘草 各半 野葛 六銖 右十味咬咀煎三上三下去滓以綿沾膏塞孔中日四五過蟲死瘰止瘡痛大佳

治五痔方 猬皮 方三指 蕒黃 大如雞父 子大 右三味穿地作孔調和取便熏之口中熏蕒烟氣為佳火氣消盡即停傳三日將息更熏之凡三度永瘰勿犯風冷羹臙將補慎猪雞等○又方 取槐根煮

洗之○又方 用桃根煮洗之

行義 熊膽辟垢清熱 槐子解毒滋腎 槐皮解熱散溼 鯉魚腸利水引蟲 虎頭犀角追風散

治五痔方散瘰祛毒 猬皮三味重痔透毒 槐根取其化蜜 桃根取其散血皆外治法也

蟬皮丸 治痔方 亦治 蟬皮 一具 礬石 當歸 連翹 乾薑 附子 續斷 黃芪 各二兩 槐子 三兩

乾地黃 五兩 右十味為末蜜丸如梧子大飲服十五丸日再加至四十丸 礬石地黃 礬石地黃

行義 痔漏經久氣血凝故用薑附溫散結滯歸芪續地調和血氣連翹槐子清解熱邪以助蟬皮

礬石滌除毒垢之力

又方 治崩中及痔方 蟬皮 人參 茯苓 白芪 禹餘糧 乾地黃 槐耳 續斷 各三兩 蒲黃

黃芪 當歸 艾葉 橘皮 白飯 甘草 各二兩 白馬蹄 酒浸一牛角 鰻魚頭 各二十 猪懸蹄

甲二十一 右十九味為末蜜丸如梧子大 西良二九 月 月 口