

雜證

外科之治法並藥方業已和盤托出尙有雜證亦藥到病療萬無一失者盡錄於左

調經種子方

當歸身川芎吳茱萸各一錢熟地香附各一錢五分白芍茯苓丹皮各八分延胡索廣陳皮各七分若經水先期者必色紫加條芩八分過期者必色淡加官桂乾薑熟艾各五分不論先期落後每服加生薑三片水一碗半煎八分俟經水至日空心服起渣再煎臨臥服一日一劑服至經止兩三日交接卽孕經期準而不孕者照後方服四劑下期再服而孕續斷沙蔕杜仲當

歸益母各二錢。川芎一錢。砂仁炒研五分。香附二錢。橘紅一錢。紅花三分。凡痛經不受胎者。取丹蘗曬乾磨粉。日以二錢溫陳酒送服。兩月內卽孕。無有不靈。

求嗣得嗣法

昔褚澄言。男精洩於先。而女精後至。則陰裏陽主。男孕。如女精洩於先。而男精後至。則陽裏陰主。女孕。又言。月信初盡。其濁氣未清。而交接。卽女務待經止兩足日。則女體虛。而濁氣盡。再男人保養月餘。陽勝於陰。定成男孕。又論子宮左右。如男精洩於婦人之左。生男。右則生女。此男清女濁。男左女右。陽壯陰衰之至論也。凡疾風暴雨。或醉飽。或服春藥。而受胎者。多天。必俟天

氣晴明日暖風和明星朗月而受胎者多富貴。儻時令不正或迷霧氣怒而受胎者多愚蠢貧賤。或雷電之後而受胎者定生怪狀一物。凡求嗣者須知。

黎洞凡

牛黃冰片各二錢。阿魏雄黃各一兩。大黃乳香沒藥兒茶天竺黃。蔓三七血竭各二兩。山羊血五錢。前藥各爲末。取山羊血拌曬乾。再磨爲末。加藤黃二兩。隔湯煎十餘滾。去淨浮膩。入末爲丸。如芡實大。儻藥乾少。加熟蜜可也。凡宜陰乾。以黃蠟包裹珍藏。臨用破蠟。取丸陳酒化服。專治腫毒跌打危重之證。內服外敷皆效。

祛風逐溼散

番木鱉甲尾各精製淨末二兩。川附一兩。共爲末。專治手足不仁。骨節麻木。每服七分。用好陳酒五鼓送下。醉蓋取汗。服至痛處更痛。麻處更麻。頭眩背汗。昏沉四五刻。卽定。定則全瘉。如服後不覺痛麻。必要日服。至知覺方止。

化痞膏

凡患痞癖之處。肌膚定無毫毛。須看準以筆圈記。用香油一片。密陀僧六兩。阿魏五錢。羌活一兩。水紅花子。麝香各三錢。熬膏退火。攤貼。近起一膏可消。年久兩張而瘉。內服尅堅酒。用水紅花子研末三錢。浸火酒二斤。時刻呷。至瘉乃止。

三日大瘡方

瘡未至之先用陽和解凝膏。布攤貼背心。用常山。雲苓。官桂。甘草。檳榔。各三錢。黑豆四十九粒。酒水各二碗。煎至二碗。當晚先服一碗。蓋暖而睡。留一碗。次日約瘡至兩箇時。前頓熱服。蓋暖臥。待瘡至。瘡至亦輕。亦有當日而瘡。瘡後忌房事。戒食生冷。勞碌。風霜。忌食鷄羊牛肉。雞子。鴨卵。白藕。豆半月。永截不發。

愈瘡棗

紅棗三斤。豬板油一斤。陳酒三斤。共入沙鍋內煮乾。加水三斤。煮至一半。不時取食。食完瘡瘡如暑天。分作五六次煮食。

黃疸立效方

凡患黃疸者。眼白黃。小便赤。身體軟倦。取黃豆生嚼。不惡心者。是用蒼耳子。薄荷。木通。縣茵陳。各三錢。要用無毫水之陳酒一斤。煎一碗。衝炒砂仁末三錢服。小便赤如血者。加川連一錢同煎。屢用。瘡人有曰癰瘕黃疸。皆溼證。應忌酒。殊不知酒本溼也。今做緝溼。捕善識溼穴。領藥戰溼。非酒不可。如經滴水不效者。何也。酒被水解。捕猶貳阻也。

紅白痢及痢息痢方

凡痢不拘紅白。忌服川連。服則倒胃不生。腹痛而痢者。後方一服立瘳。儻增減定不效。葦莖草炒研二錢。檳榔厚朴。山楂。陳皮。滑石。甘草。各一錢。紅麴三錢。炒澤蔞。枳實。各一錢。燈芯一撮同

煎。另以木香六分酒磨衝藥而服。有等腹不作痛。惟痢膿血。兼流黃漿。此係平素愛食冷茶水酒。乃滑腸痢。息痢積溼之證。取活鯽魚。去腸雜切段。放瓦上炙炭研粉。每服三錢。黃飴拌熱陳酒送下。數服全瘳。不拘老幼。滑腸久痢者神效。忌食水果水酒。生冷海參海蛇等性寒之菜。

癡癲證方

凡患癡癲。或羊頭風等證。緣心竅中痰迷所致。取橄欖十斤。敲損入沙鍋煮。數滾去核。入石臼搗爛。仍入原湯煎膩出汁。易水再煎。煎至無味去渣。以汁共歸一鍋。煎濃成膏。用白明礬八錢。研粉入膏攪和。每日早晚各取膏三錢。開水送服。或初起輕者。

外科諸症全書
取橄欖咬損一頭。蘸礬末入口嚼嚥。橄欖之味更美。至瘡乃止。
吐血立療方

凡吐血多者。覓三四兩重大當歸一隻。全用切細。取好陳酒一斤。漫火煎至一滿椀。頓於鍋中。以溫爲妙。候將要吐。尙未吐。口中。有血含住。取藥一口。連血嚥下。卽此一劑而瘡。後不再發。每有醫家阻云。吐血尙要戒酒。豈可酒煮當歸而服。服則血噴不止。如之何。殊不知當歸二字之解。當者當其時。歸者引血歸經也。全用定血。此方乃余家世傳。活人多多。從無一誤。

痰中有血方

活雄鴨一百隻。每日清晨空腹時。以一隻殺。血椀內。卽取呷嚥。

忌加鹽。百日而食百鴨之血。不可隔斷。食完全瘵。

溺血頭痛如裂方

當歸一兩。酒一升。煎成一椀。一服卽瘵。

遍身癱痛方

當歸。肉桂。延胡索。天麻。等分爲末。酒送五服瘵。

手足骨節癱痛方

熟地四兩。擣爛。浸入滴花燒酒二斤。隔湯頓熱。以竹筴攪勻。候冷。隨量日飲至瘵。取所浸熟地過酒。

箭風痛方

延胡索。桂心。五靈脂。木香。白芷。防風。各一錢。酒煎食遠服。三日。

三服療。

雷頭風方

諸藥不瘡之證。惟用山羊矢炒炭研粉。酒送二錢立效。

偏正頭風方

白芷三錢。天麻一錢。磨細。防風。荆芥錢半。煎水衝服。

疳膨食積方

雞裏金三十箇。忌經水。瓦上炙無臭氣。成炭存性磨粉。葷茄子四兩炒磨粉。二物和勻。以米餬鎔化與食。食完全瘡。忌食炒豆熬油結鞭等物。遲治傷目。

又方

田鷄曰。水煮熱。蘊末少許。淡食。至瘡乃止。

閃頸促腰方

礪砂研粉。以骨簪蘸津黏粉點兩目。淚出稍鬆。連點三次。立時全瘳。

赤眼淹纏方

杜仲。厚朴。桑白皮。檳榔。各一錢。取雄雞肺一箇。忌經水。去紅筋。入白酒釀六兩。隔湯頓熟。去渣。以湯肺食下。隔兩日再服。三次全瘳。

胃脘痛方

活乳汁草。卽蒲公英。放瓦上炙枯黑。存性研末。每取五分。燒酒

調凡口合。再以燒酒送嚥。痛息。接服五日。全瘉。戒食生冷。

又方

紅坊內好紅花四分。棗頭十枚。水二碗。煎至棗熟。去花。食湯。棗連服二十日。永遠除根。

夢遺方

六味地黃湯。減去澤蔞。增龍骨三錢。生研水飛。蓮鬚一兩。芡實二兩。線膠四兩。用牡蠣熟粉炒膠成珠。去蠣磨粉。同前藥蜜丸。每日早晚各取四錢。鹿含草煎湯送服。

白濁方

牛舌頭草根。卽野甜菜。又名禿菜根。近水池處最多。煎湯當茶。

飲。或。以。湯。煮。粥。喫。至。瘡。乃。止。

欬嗽神效方

杏仁一兩。泡去皮尖。內有雙仁者棄之。買新乳鉢。新研捶。將杏仁搗爛如泥。分爲三服。每內加冰糖三錢。共入蓋碗。用泉水煎滾。衝入蓋片。刻俟溫。連杏仁末服下。早晚各一次。三服而瘡如以杏仁同煎無效。

天絲入目方

捉肥蝨二十餘。將蝨用鍼戳破。令人仰卧。捏蝨血滴入眼內。少刻天絲灰抱蝨血而出。

塵屑入目方

吐津於石硯上。以人指甲磨濃汁。用骨簪蘸點眼內。不一刻。一
抹而出。

跌打骨斷方

綠礬一斤。煎湯粗紙浸透。裹傷處。手執燈芯。然火。不住紙上炙。
紙溫即易。火熄換然再炙。二者相際效速。斷骨處用竹片綁紮。
七日全癒。

冷哮方

淡豆豉一兩。白礬一錢。皆爲末。用飯三錢研爛。入末爲丸。如蘿
蔔子大。每取七粒。白湯送下。童子服可除根。有年者經寒。即發。
服可把定不哮。

腸紅方

取花椒子炒磨粉。每服三錢。用黃飴拌。白湯送下。服至痢止。

胃寒嘔吐黃水方

生薑一斤。擣取汁。椀許。入廣膠。乳香。沒藥末。各五錢。同煎膠化。離火。取藥攤作三四大膏。令貼胃脘痛處。以絹綁縛。三箇時。然後取周歲孩鞋兩隻。鑪土烘極熱。輪敷。敷至膏輒。再易膏貼。再綁三時。敷至瘡而止。後服慰胃丸。○厚朴三斤。切片。薑二斤。薑帶原皮。五升水。煮去薑。留朴焙乾。生甘草二兩。乾薑四兩。依前再煮。煮乾。去草。留薑朴炒燥。共爲細粉。黑棗薑湯煮。取棗擣爲丸。曬乾服。

翻胃初起方

陳皮上炒黃皮起彪爲粉。每空心服三錢。

烏沙瘰方

丁香。雄精。蒼朮。硃砂。各等分爲末。取蟾蜍亦等分切片。酒浸研漿。和前末搗爲丸。如芥子細。曬乾藏貯。每取七粒。溫茶送嚥。立甦。

水瀉立癒方

焦白朮。蒼朮。各二錢。山楂。厚朴。廣陳皮。土炒黃芩。各一錢。葶藶。二錢。焙搗同煎。

大麻瘋方