

卷七

傷寒典上

卷八

傷寒典下

景岳全書

景岳全書傷寒典目錄

須集

卷之七

傷寒上

經義一

傷寒總名二

初診傷寒法三

論脈四

風寒辨五

傷寒三證六

六經證七

傳經辨八

附合病并病

陽證陰證辨九

三陽陽明證十

兩感十一

表裏辨十二

寒熱辨 十三

論汗 十四

論吐 十五

論下 十六

看目 十七

舌色辨 十八

飲水 十九

三陽陰證辨 二十

再論陰證陽證及李子建傷寒十勸之害 二十一

論傷寒古治法 二十二

論古法通變 二十三

麻黃桂枝辨 二十四

論今時皆合病併病 二十五

治法 二十六

論虛邪治法 二十七

補中亦能散表 二十八

寒中亦能散表 二十九

傷寒三表法 三十

傷寒無補法辨 三十一

病宜速治 三十二

卷之八

傷寒下

溫病暑病 三十三

發斑 三十四

發黃 三十五

發狂 三十六

風濕 三十七

結胸 三十八

陰厥陽厥 三十九附
藏厥虵厥

識語鄭聲 四十

衄血 四十一

畜血 四十二

熱入血室 四十三

胸脇腹滿 四十四

嘔吐噦證 四十五

勞力感寒 四十六

虛證 四十七

動氣 四十八

戰汗 四十九

頭汗 五十

吐衄 五十一

腹痛 五十二

下利 五十三

協熱下利 五十四

小便 五十五

死證 五十六

傷寒逆證賦 五十七

傷寒治例 五十八

景岳全書卷之七

傷寒典

須集

會稽

張介賓

會卿著

會稽

魯超

謙菴訂

傷寒上

經義

一

水熱穴論帝曰人傷於寒而傳爲熱何也岐伯曰夫寒盛則生熱也○內經傷寒諸義并諸治法之未備者俱補載瘟疫門所當參閱

傷寒總名二

黃帝曰今夫熱病者皆傷寒之類也又曰凡病傷寒而成溫者先夏至日爲病溫後夏至日爲病暑此皆內經之明言也故凡病溫病熱而因於外感者皆本於寒卽今醫家皆謂之爲傷寒理宜然也近或有以溫病熱病謂非真傷寒者在未達其義耳

○初診傷寒法三

凡初診傷寒者以其寒從外入傷於表也寒邪自外而入必由淺漸深故先自皮毛次入經絡又次入筋骨而後及於藏府則病日甚矣故凡病傷寒者初必發熱憎寒無汗以邪閉皮毛病

在衛也。漸至筋脉拘急、頭背骨節疼痛、以邪入經絡、病在營也。夫人之衛行脉外、營行脉中、今以寒邪居之、則血氣混淆、經絡壅滯、故外證若此、此卽所謂傷寒證也。自此而漸至嘔吐不食、脹滿等證、則由外入內、由經入府、皆可因證而察其表裏矣。若或肌表無熱、亦不憎寒、身無疼痛、脉不緊數者、此其邪不在表、病必屬裏、凡察傷寒、此其法也。

○論脉 四

傷寒之邪、實無定體、或入陽經、氣分則太陽爲首、或入陰經、精分則少陰爲先、其脉以浮緊而有力、無力、可知表之虛實、沉緊

而有力無力可知裏之虛實中而有力無力可知陰陽之凶吉
診之之法當問證以知其外察脉以知其內先病爲本後病爲
標能參合脉證而知緩急先後者乃爲上工

一診法曰浮脉爲在表故凡脉見浮緊而數者卽表邪也再加
以頭項痛腰脊強等證此卽太陽經病當求本經輕重而解
散之

一脉見洪長有力而外兼陽明證者卽陽明在經之邪也宜求
本經之寒熱以散之

一脉見弦數而兼少陽之證者卽少陽經半表半裏之病宜和

解而散之

一沉脉爲在裏病屬三陰詳具後六經證辨中但沉數有力是卽熱邪傳裏也若表證深入而內見大滿大實陽邪熱結等證治當從下也

一沉緊無力而外無大熱內無煩渴等病此陰證也若或畏寒厥冷及嘔吐腹痛瀉痢者此卽陰寒直中治宜溫中也

一脉大者爲病進大因邪氣勝病日甚也脉漸緩者爲邪退緩則胃氣至病將愈也此以大爲病進固其然也然亦有宜大不宜大者又當詳辨如脉體本大而再加洪數此則病進之

脉不可當也。如脉體木小，因服藥後而漸見滑大有力者，此自陰轉陽，必將汗解，乃爲吉兆。蓋脉至不鼓者，由氣虛而然，無陽豈能作汗也。後論汗條中有按當益闕之。

仲景傷寒論曰：脉有陰陽者，何謂也？曰：凡脉浮大數動滑，皆陽也；沉濇弱弦微，皆陰也。○諸脉浮數而發熱惡寒身痛不欲飲食者，傷寒也。若洒淅惡寒，飲食如常而痛偏一處者，必血氣壅遏不通，成癰膿也。○寸口脉浮爲在表，沉爲在裏，數爲在府，遲爲在藏。○寸關尺三部浮沉大小遲數同等，雖有寒熱不解者，此脉陰陽爲和平，雖劇必愈。○其脉浮而汗出如

流珠者陽氣衰也○脉瞥瞥如羹上珠者陽氣微也○脉縈
縈如蜘蛛絲者陽氣衰也○脉綿綿如瀉漆之絕者亡其血
也○其脉沉者榮氣微也○若脉浮大者氣實血虛也○脉
微緩者爲欲愈也○陽脉浮陰脉弱者爲血虛血虛則筋急
也○脉微弱而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更吐更下
也○陰證無脉溫之而脉微續者生暴出者死○陰病見陽
脉者生陽病見陰脉者死

論曰寸脉微名曰陽不足陰氣上入於陽中則灑淅惡寒也尺
脉微名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也○寸口脉微

而瀉微者衛氣不行瀉者榮氣不足衛氣衰面色黃榮氣不足面色青榮爲根衛爲葉榮衛俱微則根葉枯槁而寒慄欬逆唾腥吐涎沫也

論曰緊脉從何而來曰假令亡汗若吐以肺裏寒故令脉緊也

○假令欬者坐飲冷水故令脉緊也○假令下利以胃中虛冷故令脉緊也○按此言緊者卽弦搏不軟之謂蓋單言其緊而無滑數之意乃陽明胃氣受傷之脉故主爲陰寒之證若緊而兼數則必以外邪所致

○愚按浮爲在表沉爲在裏此古今相傳之法也然沉脉亦有表

證此陰實陽虛寒勝者然也浮脉亦有裏證此陽實陰虛水
虧者然也故凡欲察表邪者不宜單據浮沉只當以緊數與
否爲辨方爲的確蓋寒邪在表脉皆緊數緊數甚者邪亦甚
緊數微者邪亦微緊數浮洪有力者邪在陽分卽陽證也緊
數浮沉無力者邪在陰分卽陰證也以緊數之脉而兼見表
證者其爲外感無疑卽當治從解散然內傷之脉亦有緊數
者但內傷之緊其來有漸外感之緊發於陡然以此辨之最
爲切當其有似緊非緊但較之平昔稍見滑疾而不甚者亦
有外感之證此其邪之輕者或以初感而未甚者亦多見此

脉是又不可不兼證而察之也。若其和緩而全無緊疾之意，則脉雖浮大，自非外邪之證。

按陶節菴曰：夫脉浮當汗，脉沉當下，固其宜也。然其脉雖浮，亦有可下者，謂邪熱入府，大便難也。設使大便不難，豈敢下乎？其脉雖沉，亦有可汗者，謂少陰病身有熱也。設使身不發熱，豈敢汗乎？若此之說，可見沉有表而浮亦有裏也。

風寒辨五

凡病傷寒者，本由寒氣所傷，而風即寒之帥也。第以風寒分氣，令則風主春而東，寒主冬而北，以風寒分微甚，則風屬陽而淺。

寒屬陰而深然風送寒來寒隨風入透骨侵肌本爲同氣故凡
寒之淺者卽爲傷風風之深者卽爲傷寒而不淺不深半正半
邪之間者卽爲瘧疾其有留於經絡而肢體疼痛者則爲風痺
然則傷風也傷寒也瘧疾風痺也皆風寒之所爲也觀靈樞九
宮八風篇及歲露論所載俱甚言虛邪賊風之爲害口問篇言
風成爲寒熱此皆指風爲寒邪也卽如冬傷於寒者宜乎其爲
傷寒也若春夏秋三時之感冒則孰非因寒亦孰非因風而入
之故仲景曰凡傷寒之病多從風寒得之始因表中風寒入裏
則不消矣未有溫覆而當不消散者豈非風寒本爲同氣乎內

經曰謹候虛風而避之故聖人日避虛邪之道如避矢石然邪弗能害此之謂也此杜漸防微之道也

傷寒三證六

夫傷寒爲病蓋由冬令嚴寒以水冰地裂之時最多殺厲之氣人觸犯之而卽時病者是爲正傷寒此卽陰寒直中之證也然惟流離窮困之世多有之若時當治平民安飽煖則直中之病少見此傷寒之一也○其有冬時感寒不卽病者寒毒藏於營衛之間至春夏時又遇風寒則邪氣應時而動故在春則爲溫病在夏則爲暑病是以辛苦之人春夏多溫熱病者皆由冬時