

張氏醫通卷十六

長洲石頑張璐路玉父纂述

男

以柔安世

叅訂

訥遜言

夫字有字母。方有方祖。自伊尹湯岐脈相傳與
釋氏傳燈無異。苟能推源於此。自然心手合。諒
非時師所能測識也。

桂枝湯

玉函

治風傷衛氣。脈浮緩發熱自汗。營衛

不和

桂枝 三錢

白芍 三錢

甘草 炙 二錢

生薑 五片

大棗 四枚

右五味水煎溫服。啜熱稀粥一盞以助藥力。覆煖取微汗。効不汗少頃再服。

小建中湯

玉函

治風木乘脾。寒熱腹痛。

桂枝湯倍芍藥加膠飴三錢。

黃耆建中湯

金匱

治虛勞感寒發熱自汗。

桂枝湯加黃耆錢半。膠飴一合。千金多人參二錢。

桂枝湯和營表藥倍芍藥加膠飴便能建立中氣以芍藥之酸歛護營血膠飴之甘培養中土更加黃耆以實衛氣營衛藏府俱和而受益多矣千金於小建中方加入當歸名曰內補建中其調和中外之力可知。

陽旦湯

千金

治冬溫脈浮發熱項強頭痛

桂枝湯加黃芩錢半

陰旦湯

千金

治冬溫內寒外熱肢節疼痛中挾寒

食。

桂枝湯加黃芩錢半乾薑五分

陰。癘。四。塞。非。平。旦。之。氣。無。以。開。啟。陽。和。桂。枝。湯。原。
名。陽。旦。開。啟。陽。邪。之。藥。也。干。金。於。中。加。人。黃。芩。之。
苦。寒。性。輕。以。治。冬。溫。在。表。之。邪。熱。仍。以。陽。旦。稱。之。
若。兼。挾。寒。食。再。加。乾。薑。之。辛。溫。散。結。以。治。中。土。之。
停。滯。遂。因。之。曰。陰。旦。與。經。絡。之。陰。陽。風。馬。牛。不。相。
涉。也。

獨活湯干金

治風懿奄忽不知人咽中閉塞不能

言四肢不收手足彈曳

桂枝湯桂枝易桂心去大棗加獨活枯蓼根生薑發其汗不得汗去獨活枯蓼根生薑加防已防風麻黃瘡癰不語並皆治之

當歸四逆湯

玉函

治陽邪入犯厥陰四肢厥逆

桂枝湯去生薑加當歸三錢細辛通草各一錢邪犯厥陰之界有入無出雖有熱邪勢必從陰而爲厥逆故厥陰篇中有厥深熱深之例以振發傳經之變端病邪至此最爲緊迫醫者苟無成識於胸中臨病將何措指南陽先師乃毫不以厥逆爲

意仍取太陽例中桂枝湯方加入當歸協濟芍藥以護厥陰之營。細辛引領桂枝以爲厥陰嚮導。通草通利膀胱以疏厥陰出路。與桂枝平分力量爲分解之捷徑。雖厥陰與太陽兩經接壤。邪既入陰。斷無復傳陽經之理。先輩六經例有不罷再傳之說。大可噴飯。而桂枝方中獨去生薑者。恐辛辣性暴。不待氣味入陰。便從太陽開發。轉虛其衛。再有何力以振驅邪之任歟。由是廣推大小青龍大小柴胡和解營衛兩岐。表裏交界之邪。必用薑棗爲

一定之法。若麻黃湯則專主寒傷營證。便與生薑
無預逮。至三陰等治。從無一方泛用生薑者。生薑
爲手頭常用之物。尚爾若此之慎。況有不察厥深
熱深之旨。一見四肢厥冷。漫投薑附。四逆於此能
無戚戚乎。

內補當歸建中湯

千金

治產後血虛。虛羸不足。腹

中刺痛。少腹中急。或感寒發熱。

桂枝湯。桂枝易肉桂。加當歸二錢。膠飴六錢。

崩傷內衄不止。加地黃六錢。阿膠二錢。產後一月。

服四五劑令人強壯。

桂枝龍骨牡蠣湯

玉函

治虛勞夢泄惡寒發熱。

桂枝湯加龍骨

煨

牡蠣

熬

各錢半

桂枝大黃湯

玉函

治太陰中風誤下引邪入內腹

滿痛。

桂枝湯加大黃一錢

桂枝湯表藥也。以其誤下引邪內賊而腹滿痛。渾是表邪在內不解之故。故仍用桂枝湯。畧加大黃。因勢利導。病既變則藥亦不得不隨之而變也。

桂枝葛根湯

玉函

治太陽經柔痙自汗脈浮

桂枝湯加葛根二錢

栝蒌桂枝湯

金匱

治痙太陽證備身體強凡凡然

脈沉遲

桂枝湯加栝蒌根二錢

桂枝加附子湯

玉函

治亡陽漏風肢體屈伸不和

桂枝湯加熟附子一錢

桂枝加黃耆湯

金匱

治黃汗發熱脛冷腰以上汗

出下無汗

桂枝湯加黃耆二錢

耆芍桂酒湯

金匱

治汗如瀉。肢體腫。發熱汗出。

而渴。

桂枝湯去甘草薑棗加黃耆五錢。苦酒和水煎。

黃耆桂枝五物湯

金匱

治血痺。身體不仁如風狀。

桂枝湯去甘草加黃耆等分。千金桂枝易桂
心。加人參。名黃耆湯。

茯苓甘草湯

玉函

治風邪入犯膀胱氣分。小便不

利。

桂枝湯去芍藥大棗加茯苓二錢

苓桂朮甘湯

玉雨

治心下有支飲胸腹支滿目眩

桂枝湯去芍藥薑棗加茯苓二錢白朮一錢

此僅用桂枝湯之半以流動中外之支滿兼四君子之半以運行在裏之痰氣也

桂枝去芍藥加皂莢湯

金匱

治肺癰吐涎沫初起

有表邪者

桂枝湯去芍藥加皂莢一枚

去皮煨酥炙

桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

金匱

治氣分心

下如盤。

桂枝湯去芍藥加麻黃附子各一錢細辛半錢。病在氣分非麻桂不能分解病氣盤錯非辛附不能破結去芍藥者惡其酸收也。

小青龍湯

玉函

治溢飲喘欬自利發熱當發其汗。

桂枝湯去薑棗加麻黃三錢半夏二錢炮薑細辛五味子各半錢。

小青龍加石膏湯

金匱

治喘欬上氣煩躁心下有

水氣。

小青龍湯加石膏雞子大一枚碎

桂枝麻黃各半湯

玉函

治太陽證脈微惡寒

桂枝湯加麻黃杏仁

桂枝二越婢一湯

玉函

治營衛俱傷風多寒少而

煩滿

桂枝湯本方各二錢加麻黃二錢石膏三錢

桂枝芍藥知母湯

金匱

治肢節痛脚腫如脫

桂枝湯去大棗加麻黃二錢白朮半兩知母防

風各四錢熟附子二錢

炙甘草湯

玉函

治傷寒脈結代心動悸及肺痿唾

多。心中溫溫液液。虛勞不足。汗出而悶。

桂枝湯去芍藥倍甘草。加人參二錢。生地三錢。

麥門冬二錢。麻子仁一錢。阿膠二錢。

混是清潤調補藥中。但用桂枝一味。以流動經脈之滯。麻仁一味。以滋潤腸胃之結。而脈虛結代。心虛動悸。一切虛勞不足。得以榮養。則脈虛自復。心悸自寧矣。

芍藥甘草湯

玉函

治營血受傷熱不止。

桂枝湯去桂枝薑棗

芍藥甘草附子湯。治發汗病不解反惡寒及瘡家發汗成瘰。

桂枝湯去桂枝薑棗加附子一錢。

炮

黃芩湯

玉函一名黃芩芍藥湯

治伏氣發溫太陽少陽合病

自利

桂枝湯去桂枝生薑加黃芩三錢

黃芩加半夏湯

玉函

治伏氣發溫內挾痰飲痞滿

欬逆

桂枝湯去桂枝加黃芩三錢半夏二錢

黃芩湯本治春夏溫熱熱自內發故於桂枝湯中
除桂枝生薑之辛溫易以黃芩之苦燥轉溫散
爲涼解大匠運斤妙用不可思議後世借以治下
利身熱亦不出此其黃芩加半夏湯治自利而喘
與夏秋下利白沫若合符節異病同治總不出南
陽之繩墨也

麻黃湯

玉函

治寒傷營氣脈浮發熱無汗而喘骨

節痛