

金生集 三

陶節菴傷寒全生集目錄卷三

辨傷寒呃逆例第一

瀉心湯

加味小柴胡湯

橘皮半夏生姜湯

羌活附子湯

丁附理中湯

橘皮乾姜湯

乳香硫黃散

丁香柿蒂散

灸期門法

辨傷寒胸脇滿例第二

辨傷寒結胸例第三

大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯

加味柴胡桂枝湯

柴胡桂枝湯

柴胡枳桔湯

枳實理中湯

三物白散

茯苓半夏湯

加味二陳湯

加味犀角地黄湯

辨傷寒心下痞例第四

半夏瀉心湯

甘草瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

五苓散

開別條

十棗湯

柴胡枳桔湯

旋覆代赭湯

桂枝人參湯

瓜蒂散

枳實理中湯

木香理中湯

辨傷寒白利例第五

葛根黃芩黃連湯

黃芩湯

小柴胡湯

猪苓湯

防風芍藥湯

白頭翁湯

理中湯

人參白朮散

附子湯

真武湯

通脉四逆湯

四逆散

白通湯

大承氣湯

八桂湯

三黃熟艾湯

辨傷寒便膿血例第六

黃連湯

四物阿膠湯

黃連阿膠湯

鷄子黃連湯

大黃酒

三黃補血湯

黃連胃風湯

阿膠湯

加減芍藥湯

桃花湯

當歸附子湯

桂枝六合湯

辨傷寒謔語例第七

辨傷寒鄭聲例第八

辨傷寒懊憹例第九

梔子豉湯

梔子厚朴湯

梔子乾姜湯

辨傷寒發斑例第十

升麻葛根湯

加味羌活散

人參化斑湯

加味小柴胡湯

消毒犀角湯

大青升麻湯

犀角元參湯

元參升麻湯

梔子杏仁湯

黃連一物湯

黃連解毒湯

加減三黃石膏湯

通脈四逆湯

調中湯

大建中湯

人參三白湯

青黛一物湯

苦酒鷄子湯

辨傷寒發黃例第十一

茵陳湯

梔子升麻湯

龍膽湯

得効方

茵陳犀角湯

茵陳五苓散

一方

瓜蒂散

茵陳四逆湯

茵陳茱萸湯

茵陳理中湯

擦黃法

辨傷寒發狂第十二

陽毒升麻湯

升麻湯

升麻六物湯

加味升麻湯

梔子升麻湯

元參升麻湯

梔子仁湯

三黃石膏湯

猪苓散吐法

奪命丹

辨傷寒心下滿例第十三

辨傷寒咳嗽例第十四

人參杏仁湯

三物湯

辨傷寒喘例第十五

麻黃石膏湯

葛根黃芩湯

五味湯

加減五味湯

蘇陳九寶湯

辨傷寒心下悸例第十六

小建中湯

桂枝湯

桂苓甘草湯

辨傷寒身振例第十七

辨傷寒戰慄例第十八

辨傷寒腹滿例第十九

辨傷寒腹痛例第二十

辨傷寒小腹滿例第二十一

辨傷寒小便不通例第二十二

清肺飲

黃芩湯

八正散

清心蓮子飲

滋陰化氣湯

滋腎丸

滋陰益氣湯

辨傷寒小便數例第二十三

辨傷寒小便難少例第二十四

辨傷寒小便自利例第二十五

辨傷寒不大便例第二十六

調胃承氣湯

小承氣湯

大柴胡湯

蜜導法

製大黃法

解大黃芒硝法

四物麻仁湯

當歸潤燥湯

麻仁脾約丸

辨傷寒無表裏証第二十七

小柴胡湯

傷寒全生集卷三目錄終

陶節菴傷寒全生集卷三

長洲葉天士評本

曾孫鍾肇康

朱心傳

元孫潮青來

讀本

門人

顧景文
張亮撰

小門人鍾南紀校讀

吳厚存

門下後學鍾孝存校讀

○辨傷寒呃逆例第一

夫呃逆者俗謂呃忒是也、纔發聲於咽喉則遽止、軋然連續數聲、其聲短促不長、古謂之噦、非也、噦與乾嘔無異、但其聲濁惡而長、比之呃忒大有徑庭矣、若將呃逆紊爲噦、與咳逆悞人尤多、然呃逆有因胃

先君云此症必有頭疼而起

中實熱失下而作、有因胃中痰飲而作、有因過服寒
涼之藥、胃中虛冷而作、且其氣皆從胃中起、至胸噎
之間、而爲呃忒矣、胃熱失下、大便不通者、承氣湯下
之、便軟者、以瀉心湯主之、有潮熱、小柴胡湯、胃虛有
熱者、橘皮竹茹湯主之、有痰飲者、橘皮半夏生薑湯
主之、加茯苓枳實陳皮桔梗、若胃冷者、橘皮乾薑湯
主之、甚者、丁附理中湯、加吳茱萸主之、若過服寒涼
藥、多胃寒呃忒者、丁附理中湯、加吳茱萸、木香、薑汁
主之、凡其氣自臍下直冲於胸噎間呃忒者、此陰症

先君子云此症難

看

大羌活湯在此參

出

三字可疑

呃忒也其病不在胃矣其病下虛內伏陰火或悞服
寒藥遂至冷極於下迫其相火上冲卒集於胸中而
為呃忒亦欲盡也病人煩躁自覺熱甚他人以手按

其肌膚則冷此為無根失守之火散亂為熱非實熱

也乃水極反似火陰症類似陽也若不識此悞用凉

藥下咽即死當用羌活附子湯加官桂人參木香陳

皮半夏砂仁急温其下令其陽回陰火降呃忒乃止

也若陰証及因胃寒呃忒不止者外用乳香硫黃散

嗅法內用丁香柿蒂散服之則止再灸期門中脘氣

呃症大都陰寒居多如誤服冷藥者十有一二然胃熱呃忒甚少

海關元此良法也但手足溫煖脈重者為有生矣又有瘀血而疙瘀有形之物壅塞其間雖柿蒂亦不應

瀉心湯

治胃熱呃逆而便軟者

半夏下黃芩中乾薑下人參下黃連上甘草中

下加茯苓 陳皮。水薑煎服

加味小柴胡湯 本方自有加減法

治陽症口苦脈弦發熱呃忒者或潮熱呃忒者

軟柴胡上黃芩中半夏下炙甘草下人參中

心下痞加枳實黃連。渴加天花粉知母。

心煩加姜汁黃連。水姜煎溫服。

橘皮半夏生姜湯。本方自有加減法。

治伏痰飲呃忒者。

陳皮半夏生姜加茯苓枳實。

桔梗砂仁心煩加姜汁黃連。水姜煎。

加姜汁服。

○羌活附子湯。本方自有加減法。

治陰症寒極嘔逆呃忒者。