

〔校勘影印本〕

中國醫學大成續集

〔二十二乙〕

上海科學技術出版社

〔校勘影印本〕

中國醫學大成續集

〔二十五乙〕

上海科學技術出版社

出版說明

近代中醫學家，江南名醫曹炳章（一八七七—一九五六），字赤電，浙江明人。醫名鼎盛，謙遜好學，診餘廣集醫書，名聞海內。自語「常蓄醫藥革命之決心」，為振興中醫，奔走呼號，不遺餘力。平生著述甚豐，僅撰述和評校之書，即達三十餘種（不包括《中國醫學大成》），實踐了一條「從臨床中來，而歸宿于著作」的醫學家之路。

正因為曹氏具有豐富的臨證經驗，又有廣博的學識，三十年代，上海大東書局（為上海科學技術出版社前身之一）特聘其主纂當時被譽為醫學淵府之《中國醫學大成》，實為國內中醫界一大盛事。

《中國醫學大成》分十三類，凡三百六十五種：醫經十五種，藥物十九種，診斷十六種，方劑十九種，通治六十種，外感病四十三種，內科二十七種，外科五十二種，婦科二十四種，兒科三十三種，鍼灸十六種，醫案十六種，醫論醫話、醫史二十五種。因其搜羅至廣、版本選擇至精而稱譽醫壇。《中國醫學大辭典》主編謝利恆氏贊此書「吾道精華，咸集于此」；醫史學家宋大仁稱：「茲書一旦問世，人人皆有獲讀秘籍之機會，必不似從前為少數人私有物矣。不僅有沾溉學人之益，且維我國數千年醫學文獻于不墜也。」浙江中醫學院徐榮齋教授在紀念曹炳章先生誕生一百周年的專文中，歸納此書對中醫之發展具備八大價值：一、保存和流通古醫籍；二、有系統可循；三、打破保守；四、公開禁方；五、統一中醫學術；六、奠定習醫之參考書；七、造就中醫高深人才；八、便利圖書館之採貯。

中醫藥學歷數千年變化而長盛不衰，雖受西洋醫學之衝擊，又生存于現代科學技術突飛猛進之今日，但至今猶屹立于世界醫學之林，並日益受到各國人士歡迎，此不可不謂人類文明史上的一大奇跡。中醫藥學之發展，除因其獨特的理論體系和卓越之臨床療效外，亦賴于中醫文獻之流傳、保存、搜集、整理及刊行，才使其理論著述、臨床經驗、臨床資料、珍貴典籍得以存世，並不斷擴充完善。《中國醫學大成》之結集刊行，無疑大有益于振興中醫、發展中醫。

《中國醫學大成》雖因戰火蔓延，僅刊印一百三十六種而中止，且已刊行者，至今已散佚不全，但我社于前幾年重刊《中國醫學大成》之一百三十六種，結集成五十冊發行，震動了海內外，可見關心、支持、熱愛中醫藥事業者遍及亞洲，乃至世界。曹炳章先生未及刊行完成之《中國醫學大成》後續部分，被列入國家八五、九五重點出書項目，此亦可告慰于九泉之下的曹先生。

此次刊行之《中國醫學大成》續集，計一百一十八種，結集成四十九冊；大部分為原刻本，部分為木刻本。為保持原書之風貌，一概未于原書上改字校注，遇錯訛、脫漏、缺字者，均于書後校注中另勘，以便為讀者留出研究和斟酌之餘地。每種書後修有後記，介紹該書作者生平、簡歷、學術觀點，及是書版本概況、成書年代等，簡明扼要。

是書之校勘者和編輯，為覓一原刻本，南下北上，不辭辛勞；為一字之勘定，常殫精竭慮，如履薄冰。如此歷數載以成，奉獻于讀者，期能集有志者完成先輩未竟之事業，光大我中醫于世界。

醫學綱目卷之十一

肝膽部

眩

癩癩

子癩

大法

成無已云。眩者。非眩而見其眩。謂眼黑眩也。運者。運為運轉之運。世謂之頭旋是也。

內經論眩。皆屬肝木。屬上虛。丹溪論眩。主於補虛。治痰降火。仲景治眩。亦以痰飲為先也。

眩 肝木作

諸風掉眩。皆屬於肝。全文見

河掉。搖也。眩。昏亂旋運也。風主動故也。所謂風氣動而頭目眩運者。由風木旺。必是金衰不能制木。而木復生火。風火皆屬陽。多為兼化。陽主乎動。兩動相搏。則頭目為之眩。運而旋轉。故火本動也。燭得風則自旋轉。人或乘舟車。及作環舞而眩運者。其動不止。而左右紆曲。故經曰。曲直動搖。風之用也。眩運而嘔吐者。風熱甚故也。

狗蒙招尤。目瞑耳聾。下實上虛。過在足少陽厥陰。甚則入

肝。全文見治虛實法。

本治肝厥頭暈。清頭目。釣藤散。

釣藤

陳皮

半夏

麥門冬

茯苓

各半兩

石膏

人參

甘菊

防風

各半兩

甘草

一分

右為麤末。每服四錢。水一鍾半。生薑七片。煎至八分。溫服。

治肝厥狀如癇疾不醒。嘔吐。醒後頭虛運發熱方。

麻黃

釣藤取皮

石膏

乾葛

半夏麴

柴胡

甘草

枳殼

甘菊

右為麤末。每服四錢。水一鍾半。生薑二片。棗一枚。同煎。

至八分。去查温服。

婦人患頭風者。十居其半。每發必掉眩如在車上。盖因血虛。肝有風邪熱故耳。素問云。狗蒙招搖。目眩耳聾。上虛下實。過在足少陽厥陰。甚則歸肝。盖謂此也。余常取此方以授人。比他藥捷而效速。芎藭散

川芎兩

當歸三

羌活

旋覆花

蔓荆子

細辛

石膏

藁本

荆芥穗

半夏麩

防風

熟地

甘草各半

右為末。每服二錢。水一大鍾。生薑三片。同煎至七分。去查温服。不拘時服。

右甘寒瀉風木。

羅風痰治驗

叅政楊公。七旬有二。有風痰。於至元戊辰

春忽病頭旋眼黑。目不見物。心神煩亂。兀兀欲吐復不吐。心中如懊懷之狀。頭偏痛微腫。面赤色。腮頰亦赤色。足胛冷。命予治之。余料之。此少壯之時喜飲酒。久積濕熱於內。風痰內作。上熱下寒。是陰陽不得交通。否之象也。經云。治熱以寒。雖良工不敢廢其繩墨。而更其道也。然而病有遠近。治有輕重。參政今年高氣弱。上熱雖盛。豈敢用寒涼之劑。損其脾胃。經云。熱則砭之。又云。高巔之上。射而取之。余以三稜針約二十處刺之。其血紫黑如露珠之狀。少頃頭目便覺清利。諸症悉減。遂處方云。眼黑頭旋。虛風內作。非天麻不能除。天麻苗謂之定風草。此草獨不爲風所搖。故以爲君。偏頭痛者。乃少陽也。非柴胡。黃芩酒製不能治。黃連苦寒。酒炒以治上熱。又爲因用。故以爲臣。橘皮苦辛溫。炙甘草甘溫。補中益氣爲佐。生薑半夏辛溫。能治風痰。茯

苓甘草利小便。導濕熱引而下行。故以為使。服之數劑。邪氣平。生氣復而安矣。

天麻半夏湯。治風痰內作。胸膈不利。頭旋眼黑。兀兀欲吐。上熱下寒。不得安臥。

天麻

半夏

橘皮

柴胡

黃芩酒浸炒

甘草炙

白茯苓皮去

前胡各五分

黃連三分

右咬咀。作一服。水二鍾。薑三片。煎至一鍾。溫服。食後。忌

酒麪生冷物。

垣羌活湯。治風熱壅盛。上攻頭目昏眩。

羌活

防風

黃芩各洗兩

柴胡七錢

黃連酒煮一兩

黃柏酒炒半兩

瓜蒌酒洗半兩

甘草分七

白茯苓錢五

澤瀉錢六

右為麓末。每服五錢。水煎取清。食後或先臥通口熱服之日二服。

右苦寒瀉風木。

外感風邪眩

靈筋骨血氣之精。而與脉并為目系。上屬於腦。後出於項中。故邪中於項。因逢其身之虛。其入深則隨眼系以入於腦。入於腦則腦轉。腦轉則引目系急。目系急則目眩以轉矣。大惑篇

本治一切頭旋。本因體虛。風邪乘於陽明經。上注頭面。遂入於腦。亦因痰水在於胸膈。上犯大寒。使陽氣不行。痰水結聚。上衝於頭目。令頭轉旋。羚羊角散。

羚羊角

茯神各一

芎藭

防風

白芷

半夏

湯洗七次

枳殼

附子

各一分

甘草錢三

右為麤末。每服四錢。水一鍾半。生薑五分。慢火煎至七分。去查。不拘時候溫服。

百一都梁丸。治風吹項背。頭目昏黑眩痛。

香白芷 大塊者用沸湯泡洗四五次焙乾

右為末。煉蜜為丸如彈子大。每服一丸。細嚼。用荊芥湯

點茶下。

無大豆紫湯。治中風頭眩惡風。自吐冷。水有汗。方見症門。

聖治風頭旋。用蝉殼二兩。微炒為末。非時下。溫酒一鍾。七

上虛眩

針經胃風篇云。上虛則眩。又五臟生成篇云。狗蒙招尤。目

瞑耳聾。下實上虛。蓋蒙昏胃也。招搖掉也。瞑黑眩也。皆謂

昏冒。搖掉眼黑眩。屬下實上虛也。丹陳客婦人。近五十。頭痛麻木眩暈。脉甚虛。宜補氣益血。

去風行濕。

天麻酒乙

人參錢半

白朮錢一

黃芩錢半

歸身尾酒半

川芎錢半

陳皮錢半

甘草炙三

黃芪分三

半夏分五

生薑片三

右作一劑水煎服。

賈舅因勞役眼眩倦怠頭不爽肚帶溏滑。

黃芪錢半

人參錢半

當歸錢一

黃栢炒三

白朮酒浸

陳皮錢半

蔓荊子粒五

甘草炙三

煎稍熱飲之。丑卯時各一次。去枕眠少時。巳申時又各

一次。瘥。

男子因作勞成病發熱脚酸口苦頭暈。

白朮

茯苓

黃連

川芎兩半

白芍藥

人參

生地

陳皮

當歸各一兩

甘草錢一

杜仲炒六兩

分十八貼。食前。熱下。抑青丸二十二粒。
丈夫患熱。頭眩。脉大而散。此是辛苦中來。

陳皮錢三

柴胡錢三

人參錢二

白木錢二

黃芪錢三

木通錢一

甘草些

分三貼服。

本治風眩頭運。川芎散。

山茱萸兩一

山藥

甘菊花

人參

川芎兩各半

茯神兩半

為末。每服二錢。酒調下。不拘時候。日三服。不可誤用野

菊花。

血虛眩。三因芎歸湯。治產後去血過多。眩運不省。及傷胎去血多。

崩中去血多。金瘡去血多。拔牙齒去血多不止。懸虛心煩。

眩運頭重目暗。舉頭欲倒。方見婦人

補虛降火治痰

丹頭眩屬氣虛挾痰。無痰作眩不得。治痰為主。挾補氣藥。

并降火藥。濕痰多者。用二陳湯。痰多因火動者。二陳湯加酒芩。眩運。火動其痰。二陳湯加黃芩。蒼朮。羌活。散風行

濕。水煮金花丸。治頭眩。方見痰飲。

丹眩運不可當者。大黃三次酒炒。乾為末。茶調下。每服一錢至二錢。一男子。年七十九歲。頭目昏眩而重。手足無力。吐痰口口相續。左手脉散大而緩。右手緩而脉大。不及於左。重按皆無力。飲食畧減而微渴。大便三四日一行。衆人皆與風藥。至春深必死。予曰。此皆大虛證。當以補藥作大劑服之。衆怒而去。余教用人參。黃芪。當歸身。芍藥。白朮。陳皮。濃煎作湯。使下連栢丸三十粒。如此者服一年半。而精力如少壯時。連栢丸。冬加乾薑少許。餘三時皆依本法。連栢皆薑汁炒為細末。又以薑汁煮糊為丸。

本治虛風頭旋。吐痰涎不已。養正丹。

黑鉛

水銀

硫黃

硃砂各一兩

右用鐵盞一隻。火上溶鉛成汁。次下水銀。用柳杖子打勻。取下放少時。下二味末。令冷。研為粉。用米飲丸。或用棗肉丸如梧子大。每服三十九丸。鹽湯下。

此藥升降陰陽。補接真氣。非止頭旋而已。

虛者宜
補中

垣范天駭之內。素有脾胃之病。時顯煩躁。胃中不利。大便不通。初冬出外而晚歸。為寒氣怫鬱。悶亂大作。火不得伸。故也。醫疑有熱。治以疎風丸。大便行而病不減。又疑藥力少。復加七八十九丸。下兩行。前症仍不減。復添吐逆。食不能停。痰唾稠粘。湧出不止。眼黑頭旋。惡心煩悶。氣短促。上喘無力。不欲言。心神顛倒。兀兀不止。目不敢開。如在風雲中。頭苦痛如裂。身重如山。四肢厥冷。不得安臥。予謂前症乃胃氣已損。復下兩次。則重損其胃。而痰厥頭痛作矣。製半

夏白木天麻湯治之而愈。

天麻分五

半夏湯洗一分

人參分五

白木錢一

蒼朮分五

橘皮

黃芪

澤瀉

白茯苓各五分

神麴炒一錢

大麥蘖一錢半

乾薑分三

黃栢分二

右件咬咀。每服半兩。水二盞。煎至一盞。去渣。帶熱服。食前。此頭痛苦甚。謂之足太陰痰厥頭疼。非半夏不能療。眼黑頭旋。風虛內作。非天麻不能除。其苗為定風草。亦治內風之神藥也。內風者。虛風是也。黃芪甘溫。瀉火補元氣。人參甘溫。瀉火補中益氣。二朮俱甘苦溫。除濕補中益氣。澤瀉茯苓。利小便導濕。橘皮苦溫。益氣調中升陽。神麴消食。滂胃中滯氣。大麥蘖寬中助胃氣。乾薑辛熱。以滌中寒。黃栢苦大寒。酒洗以主冬天少火在泉發。

躁也。

右氣虛挾痰眩暈。余嘗治一人。臥則稍輕。但舉足則頭旋眼黑。以天麻半夏茯苓陳皮白附僵蚕參芪草歸生薑黃芩煎湯服之。五六日愈。蓋做此方加減之也。

濟芎朮湯。治胃中濕痰眩暈嘔逆頭重不食。

川芎

半夏酒洗

白木各一兩

甘草炙半兩

右咬咀。每服四錢。水一盞。生薑七片。煎服。不拘時。有附

子。桂心。無半夏。

巖旋覆花湯。治中脘伏痰。嘔逆眩暈。

旋覆花

半夏

橘紅

乾薑各一兩

枳榔

人參

甘草

白木各半兩

右剉碎。每服一兩。薑水煎服。

悸者煮行水

仲卒嘔吐。心下痞。膈間有水。眩悸者。半夏加茯苓湯主之。