

續名醫類案卷四

錢塘魏之琇編集

海昌王士雄孟英
定州楊照藜素園 同校

傷風

孫文垣治王祖泉乃眷朝飯後稍寒惡風發熱傷風惡風遍身疼

痛汗大出不止傷風則有汗口中熱腹中不知饑小水短肺金不利

而汗多也六脉皆濇營衛不和投以白芍五錢白朮二錢桂枝黃芩

各一錢甘草八分二帖汗止寒熱除去白朮加當歸身痛

亦愈

6

費一吾六弟婦遍身痛發熱汗大出昏昏如醉卧不能起孫

診之兩寸短弱六脉皆數而無力此勞倦之餘故汗大走

也

身痛發熱
不僅傷風

黃耆三錢白芍四錢甘草一錢五分桂皮八

分當歸一錢石斛二錢

與前藥俱就建中加減
孫於雜症多用此方

一帖熱除

痛汗皆止惟倦不能起前方加人參陳皮兩帖而痊

一婦人先傷風發熱咳嗽二月乃分娩熱尚未退食雞汁肉

等太早嗽熱愈盛已八日矣胸膈脹痛頭痛口渴大便秘

肺氣壅而
血液燥也

咳出之痰色黑而臭小水短少脇下扯痛氣逆

而喘不得卧左脇不能着蓆汗出不止症甚危以瓜蒌五

錢蘇子一錢枳殼酒芩各六分前胡桔梗各五分甘草三

分薑三片製方甚妙服之胸膈之痛減半喘少定再進藥大便

用蜜導下就方加減服之熱盡退諸症尋愈

8

胡鏡陽尊堂年七十二脾泄十五年不愈近加吐紅咳嗽痰

多不易出

肺金壅滯可知

申酉時潮熱胸膈壅塞不能就枕飲食

大減且惡風終日坐幔中諸醫謂發熱吐紅法當寒涼脾

泄多年氣虛老邁法當溫補二症矛盾難於投劑身熱脉

大又血家所忌束手無策皆辭去孫診之兩手脉皆浮洪

而數皆帶滑據脉洪數為熱滑為痰浮為風邪在表以傷

風故惡風法當清解可無恙也謂二病矛盾者暗於先後

也夫脾泄已久未嘗為害新病熱熾宜當速去所謂急則

治標。俟邪去後補脾未晚。且潮熱爲風邪所致之熱。非陰虛火動之熱。吐血乃當汗不汗之血。非陰虛火動之血。經云奪血者無汗。奪汗者無血。當汗不汗。邪鼓血動。但得表解。斯熱退血止矣。胡曰。昔老母過錢塘。遇風濤受驚。因發熱咳嗽。血出痰多。今以公言質之。誠由風邪起病也。用蘇子麻黃薄荷。解表爲君。枳殼桔梗桑白皮瓜蒌紫苑貝母。消痰治嗽爲臣。酒芩甘草爲佐。二帖五更微汗而熱退。胸膈不壅。嗽亦少減。血止大半。始進粥。次日減麻黃加茯苓。夜服七制化痰丸。嗽亦減半。自是不惡風而去。慢矣。前方減枳殼加苡仁調理而安。

黃履素曰、予弱冠患傷風、不謹床第、每晨起卽鼻中流涕、竟日痰不絕口、留連月餘、遂見痰中縷血、遺害無窮、諺云、傷風不醒、結成勞、蓋金水二藏情關子母、金傷則不能生水、子瀉則其母愈虛、水不能制火、火乘金而金益敗、此虛嗽之症所由成耳、信乎傷風雖小病、最不可不慎者、故補脾保腎、乃養生家第一義、而肺病極宜斷色慾、相關相應、掙於影響也。

又曰、予臨場慮不耐風寒、合玉屏風散服之、反自汗津津不止、蓋防風與黃耆各等分之謬也、本草云、黃耆得防風其功愈大、用黃耆七分、配防風三分、斯得之矣、凡傷風未經和解、此方斷

不可服
慎之

喻嘉言治石開曉傷風咳嗽未嘗發熱自覺急迫欲死呼吸

不能相續診之見其頭面赤紅躁擾不歇脉亦豁大而空

謂曰此症頗奇全似傷寒戴陽症何以傷風小恙亦有之

急宜用人參附子等溫補下元以收回陽氣不然子丑時

一身大汗脫陽而死矣渠不以爲然及日落陽不用事愈

慌亂不能少支忙服前藥服後稍寧片刻又爲牀側添同

寢一人逼出其汗如雨再服一劑汗止身安咳嗽俱不作

詢其所由云連服麻黃藥四帖遂爾躁急欲死然後知傷

風亦有戴陽症與傷寒無別總因其人平素下虛是以真

陽易於上走矣

傷風而服麻黃至四劑即壯實人亦不能無害矧下虛者哉

雄按原有一種

雖似風實非傷風乃下元根久虧腎水泛濫以為痰浮陽衝激而成嗽也今夏余偶診高石泉之脈左關尺浮絃而空因謂其仲郎雋生曰令尊之脈甚可慮也既而無恙迨雋生舉于鄉計偕有日而石泉陡患傷風馮某為之解散次日便瀉多次黃某為之分清第三日痰升氣逆自覺唇腫不能吸飲速余視之脣何嘗腫而舌色晦黯無津脈似蛛絲欲絕乃陰脫於下陽越於上也藥不能追已而果逝洪張伯孝廉令堂病同此余一視而決其不治蓋雖似傷風而脈先虛促難尋也旬日果貽皆十二月春前事也聞許吉齋山長秋分後傷風數日而亡諒亦此類耳

盧不遠治嚴忍公內人病發熱無汗

傷風亦多無汗

嘔吐不止脈反

沉弱

傷風脈當浮今沉故曰反

人皆以為少陰症盧脈之沉弱中獨右

關表弦而中滑蓋風邪挾胃中水飲停積所致用乾葛半

夏吳萸黃連急煎緩服嘔吐遂止而熱轉盛復診視脈勢

欲淨。命其進粥。皆不敢。再三強之。呷濃米飲半杯。遂有汗而熱平。再進薄粥。汗多而熱退。乃問曰。風寒之邪。世俗大禁飲食。今啜粥而熱退。何也。曰。風之與寒。原自有別。世蓋溷之耳。仲景桂枝湯治風。服已啜粥。古人之精義也。蓋風者木也。木尅土。脾胃受之。仲景治法。妙在不治風。木但令濕土氣行。而風木之邪自散。今熱轉盛而脈勢欲淨。是風邪欲散也。非穀氣揚溢。則胃力孱弱。汗何從來。是借桂枝之義。以除風邪之不能汗者。

○按傷寒及感症。日久津液既枯。不能行汗。得大三才一氣湯一服。乃蒸變爲汗而愈矣。若多服風藥及香燥等。

玉屏風

藥入必大作脹一二時許。然後來蘇。後賢以此爲內託之奇。予謂仍是仲景啜粥法耳。後人安能越古人之範圍哉。

吳孚先治盧敬菴暑月感寒服羌防發散汗出已愈。後復感冒。又用發散。旋愈。旋感。前藥不應。吳曰。屢散不愈。肺氣已虛。徒攻表而不救表。風邪乘虛而入。無已時矣。方用君黃芪五錢。實肺氣以固衛。佐防風一錢。助芪力以祛邪。玉屏風散如是則舊邪無所容。而新邪無可入也。二帖而痊。

愚謂傷風一症。殊非小恙。有寒燠不時。衣被失節而成者。此必鼻塞聲重。咳嗽多痰。在元氣平和之人。卽弗藥

自愈。若在腎水素虧，肝火自旺者，不過因一時風寒所束，遂作乾咳、喉痛。此外邪本輕，內傷實重。醫者不察，肆行表散，致鼓其風木之火上炎，反令發熱、頭痛。繼又寒熱往來，益與清解，不至十劑，肝腎與肺三藏已傷，損無遺久者周年，近者百日，溘然逝矣。而世俗談者，咸以傷風不醒便成勞爲言。噫，彼勞者，豈真由傷風而成也耶？愚哉言也。當易之曰：傷風誤表，必成勞耳。雄按：損由外感而成者甚多。雍乾間，歙人吳澄字師朗，著不居集一書，專論外損自成一家，惜用藥未盡善耳。

△ 柴嶼青曰：乙丑新正，張妹婿家人之婿董四患傷風來寓求診，卽決其不治。內人曰：彼少年驕人，傷風小病，何遽若此？

柴曰脉象已敗不可爲也後果然。此必肝腎大傷之候也

張三錫治一人傷風自汗發熱不止自以爲虛服補中益氣

湯熱轉劇診之脉弦而長實有力與升麻葛根湯倍白芍

加桂枝少許一劑汗止熱退。治法彙

一人瀉而左脉浮急自汗鼻塞乃傷風作瀉也與五苓散加

防風白芷升麻葛根薑葱煎服。全上

陸肖愚治吳遜齋夫人年六旬外素有脾泄之症三月間患

咳嗽吐血痰多而咯之不易出日潮熱胸膈支結不能就

枕畏風寒或以脉數吐紅身熱咳嗽皆血虛火盛也與養

血清涼泄未已而痰壅益加更醫以高年久瀉用六君子

君臣佐使
與孫文惠
治胡氏陽
古史案相

瀉未已而痰壅殊甚二醫商治一以吐血不宜身熱脉大
一以泄瀉不宜身熱脉大俱辭不治脉之左寸關浮洪右
寸關滑數兩尺弱此表邪不清也蓋脾泄乃宿疾吐血乃
表氣之鬱矣詢之果受風數日後而病作用炒黑麻黃蘇
葉前胡解表爲君杏仁蘇子陳皮利氣爲臣桑皮片芩花
粉石膏清熱爲佐甘草桔梗散膈和中爲使二劑後微汗
症頓減去麻黃蘇葉石膏加白芍茯苓二劑症如失與丸
方治其脾瀉人參白朮茯苓爲君白芍霞天麴爲臣炙草
乾薑砂仁爲佐棗肉神麴糊丸以爲使服數旬而痊

陸祖愚治陳理刑因勞頓後頭疼鼻塞咳嗽胸膈不利咽乾

誤表致損
理當濟補

身熱行動卽有微汗、有痰不能咯出、兩寸浮弦而數、左關弦緊、右關弦滑、兩尺平和、先用疎解和氣二劑、繼入養血二劑、二三日間諸症頓愈、

薛立齋治一婦人、素清苦、勤於女工、因感風邪、自用表散之劑、反朝寒暮熱、自汗盜汗、形氣甚虛、其脉或浮洪、或微細、其面或青白、或痿黃、此邪去而氣血愈虛也、用十全大補湯三十餘劑、漸愈、又用加味逍遙散兼治、半載而痊、

○琇按傷風誤表多成勞損、觀此可鑒、

○林觀子治一婦人、浴後被風、遂自汗出身熱、然無頭痛體痛惡風諸症、旬日來雜治皆不效、其胸以上痞隔、漸至湯飲

探吐法

虛伴感邪
邪虛而不
邪去表

到喉而止脉之關以上微浮此仄蒂散症也其人素虛與
桔梗蘆一兩煎服到咽一吐悉涎濁酸穢之物又與一服
再得吐始快然熱除調理數日而安

毛氏子傷風喘嗽復以飲食起居失調遷延轉劇診之面色
枯白夢泄不禁飲食減少喘嗽發熱兩脉虛微知其喘爲
真氣上脫熱爲陽氣外散不與陰氣純虛者同面色枯白
脾肺氣虛而不榮也飲食減少脾胃氣弱而不化也夢泄
不禁腎藏氣衰而不固也此皆本氣爲病用人參二錢黃
耆三錢肉桂五分炙草五分茯苓一錢牛麴一錢橘紅八
分服數劑喘漸平熱漸退隨與大造膏調理飲食進而神

旺如視

麻黃不可
妄用

朱翰文偶患風寒小疾、或以麻黃大發其汗、汗出不止、遂致
語言短怯、神氣不收、面色枯白、時有寒熱、已瀕危、診其兩
脉微瀼而虛、虛則氣少、瀼則陰傷、此元氣津液兩傷之候
也、傷風小症、何遽至此、蓋以麻黃辛甘氣溫、為傷寒發汗
重劑、今不當用而用之、不特劫其津液外亡、并元氣亦因
而脫矣、治法宜陰陽兩補、用人參、製首烏、茯苓、白芍、丹皮、
甘草、廣皮、半夏、麴等三劑、脉象有神、諸症漸已、漸加耆朮
而安、與喻嘉言
案合參

○劉雲密曰、丁酉臘、人病頭痛惡風、鼻出清涕、兼以咳嗽痰甚、

一時多患此用冬時傷風之劑而愈者固多然殊治者亦不少蓋是年君火在泉終之氣乃君火客氣爲主氣寒水所勝經曰主勝客者逆夫火乃氣之主雖不同於傷寒之邪入經然寒氣已逆而上行反居火位火氣不得達矣所以雖同於風投以風劑如羌活輩則反劇蓋耗氣而火愈虛也至於桂枝湯之有白芍固不得當卽桂枝僅泄表實而不能如麻黃能透水中之真陽以出也故愚先治其標用乾薑理中湯佐五苓散退寒痰寒水之上逆乃治其本用麻黃湯去杏仁佐以乾薑人參川芎半夏微微取汗守此方因病進退而稍加減之皆未脫麻黃但有補劑不取