

醫家
秘本

傷寒論大全

上海千頃堂書局發行

傷寒六書卷四

餘杭節菴陶華述

吾專傷寒深明奧旨脉正則道合神機用藥則隨手取應的本續論全備發明殺車槌法世之罕有永為養生之寶矣今將秘驗三十七方就注三十七槌法二十條煎法二十條却病並製解法名殺車槌也實為我肺腑不傳之妙我後子孫一字不可輕露莫與俗人言莫使庸醫見爾宜謹慎珍藏毋違我之致囑也

却病法

一傷寒發狂奔走人難制伏先於病人處生火一盆用醋一碗傾於火上其烟冲鼻入內卽安方可察其陽狂陰躁親切用藥無差若初起頭疼發熱惡寒方除已後登高而歌棄衣而走踰垣上屋罵詈叫喊大渴欲死脉來有力乃因邪熱傳裏陽盛發狂當用寒藥下之此為陽狂凡見古卷囊縮者不治若病起無頭疼身微熱面赤戴陽煩躁脉來沉微無力欲坐卧於泥水中乃因寒熱而發躁卽陰證似陽當用熱藥溫之此為陰躁凡見

厥冷下利譫語者不治醫者不看脉以虛陽上隔而躁誤為實熱反與涼藥使渴盛躁急則氣消成大害矣須詳脉來有力無力此為良法

一傷寒腹中痛甚將涼水一盞與病人飲之其痛稍可者屬熱痛當用涼藥清之清之不已而或遠臍硬痛大便結實煩渴屬燥屎痛急用寒藥下之若食積痛同治法若小腹硬痛小水自利大便黑身目黃者屬蓄血痛亦用寒劑加行血藥下盡黑物則愈此三者皆痛隨利減之法也

若飲水愈加作痛屬寒痛當用溫藥和之和之不已而或四肢厥冷腹痛嘔吐瀉利急用熱藥救之須詳脉來有力無力此為良法

一傷寒直中陰經真寒證甚重而無脉或吐瀉脫元而無脉將好酒姜汁各半盞與病人服之其脉來者可治當察其陰用藥不拘脉浮沉大小但指下出見者生如用此法脉不至者必死又當問病人有何疼痛處若有痛證要知痛甚者脉必伏宜隨病制宜如無痛證用此法而脉至者此為吉兆尤當問病人若平素原無正取脉須用覆手取之脉必見也此屬反關脉診法與正取法同若平素正取有脉後因病診之無脉者亦當覆手

取之

取之而脉出者陰陽錯亂也宜和合陰陽如覆取正取俱無脉者必死矣此為良法

一傷寒舌上生胎不拘滑白黃黑俱用井水浸青布片於舌上洗淨後用生姜片子時時浸水刮之其胎自退凡見舌上黑胎芒刺者必死此熱毒入深十有九死是腎水尅心火也若發黃者用生姜時時週身擦之其黃自退若心胸脇下有邪氣結實滿悶硬痛又法用生姜一觔搗渣去汁炒微燥帶潤用絹包於患處款款熨之稍可又將渣和勻前汁炒乾再熨許久豁然寬快俱為良法

一傷寒鼻衄成流久不止者將山梔炒黑色為細末吹入鼻內外將水紙搭於鼻中其血自止若點滴不成流者其邪在經未解照後秘方用藥不在此法

一傷寒熱邪傳裏服轉藥後鹽炒麩皮一升將絹包於病人腹上欸欸熨之使藥氣得熱則行大便秘通矣

一傷寒吐血不止用薤汁磨京墨呷下其血見黑必止如無薤汁用雞子清亦可正謂赤屬火而黑屬水也

一傷寒直中陰經真寒證或陰毒證身如被杖腹中絞痛嘔逆沉重不知人事四體堅冷如石手指甲唇青藥不得入口六脉沉細或無脉欲絕者將葱縛一握切去根葉取白三寸許搗如餅先用射香半分填於臍中後放葱餅臍上以火熨之連換二三次稍醒確入生姜汁煎服回陽救急湯如不醒再灸關元氣海二三十壯使熱氣通其內逼邪出於外以復陽氣如用此法手足溫出汗出即醒者為有生也如用此法手足不溫汗出不省人事者必死也此為良法

一傷寒熱病熱邪傳裏亢極無解用黃連煎水一盞放井中頓冷浸青布搭在胸中徐徐換之待熱勢稍退即除不可久漬夏天用此法冬天不宜用

一傷寒服藥轉吐出不納者隨用竹管重捺內關後將生姜自然汁半盞熱飲其吐即止大凡服寒藥熱飲熱藥寒飲中和之劑溫和服之如要取

汗雖辛苦之劑亦宜熱服如要止汗雖辛甘溫之劑亦宜溫服此為良法
一中風痰厥昏迷卒倒不省人事欲絕者先用皂莢末燃紙燒烟冲入鼻
中有嚏可治隨用吐痰法將皂莢末五分半夏白礬各三分為細末姜汁
調服探吐後服導痰湯加減治之無嚏不可治此為良法

一治乾霍亂不得吐者用滾湯一碗入皂莢末三分鹽一撮調服探吐莫
與米湯設若與之卽死是穀氣反助邪氣也

一中寒卒倒昏迷不省者先用熱酒姜汁各半盞灌入稍醒後服加味理
中飲為效如不飲酒人止用姜汁灌之依法調治此證冬月甚有之餘月
幾希矣

製藥法

一用附子去皮臍先將鹽水姜汁各半盞用沙鍋煮七沸後入黃連甘草
各半兩再加童便半盞再煮七沸佳火良久撈起入磁器盛貯伏地氣一
晝夜取出曬乾以備後用庶無毒害頂圓臍正一兩一枚者佳此為良法
一用川大黃須錦紋者佳剉成飲片用酒拌勻燥乾以備後用不傷陰血

如年壯實熟者生用不須製之此為良法

一用麻黃去節先滾醋湯略浸片時撈起以備後用庶免太發如冬月嚴寒膝理至密當生用者不須製之此為良法

一用茱萸將鹽水拌勻炒燥以備後用庶無小毒此為良法

解藥法

一用附子後身目紅者乃附毒之過用蘿蔔搗水濾汁二大盞入黃連甘草各半兩犀角三錢煎至八分飲之以解附毒其紅即除如解遲必血從耳目口鼻出者必死無蘿蔔用蘿蔔子搗水取汁亦可此為良法如無蘿蔔子用澄清泥漿水亦可也

一用大黃後瀉利不止者用烏梅二箇炒粳米一撮乾姜三錢人參炒白朮各半兩生附子皮一錢半甘草一錢升麻少許燈心一握水二大鍾去滓後入炒陳壁土一匙調服即止取土氣以助胃氣也此為良法

一用麻黃後汗出不止者將病人髮披水盆中足露出外用炒糯米半升龍骨牡蠣藁本防風各一兩研為細末週身撲之隨後秘方用藥免致亡

陽而死此為良法

煎藥法

一用發汗藥先煎麻黃一二沸後入餘藥同煎

一用止汗藥先煎桂枝一二沸後入餘藥同煎

一用和解藥先煎柴胡一二沸後入餘藥同煎

一用下藥先煎滾水入枳實一二沸後入餘藥同煎

一用溫藥先煎乾姜一二沸後入餘藥同煎

一用行血藥先煎桃仁一二沸後入餘藥同煎

一用利水藥先煎猪苓一二沸後入餘藥同煎

一用止瀉藥先煎炒白朮一二沸後入餘藥同煎

一用消渴藥先煎天花粉一二沸後入餘藥同煎

一用止痛藥先煎白芍藥一二沸後入餘藥同煎

一用發黃藥先煎茵陳一二沸後入餘藥同煎

一用發斑藥先煎青黛一二沸後入餘藥同煎

一用發狂藥先煎石膏一二沸後入餘藥同煎

一用嘔吐藥先煎半夏一二沸後入餘藥同煎

一用勞力感寒藥先煎黃耆一二沸後入餘藥同煎

一用感冒傷寒藥先煎羌活一二沸後入餘藥同煎

一用暑證藥先煎香薷一二沸後入餘藥同煎

一用風病藥先煎防風一二沸後入餘藥同煎

一用腹如雷鳴藥先煎煨生姜一二沸後入餘藥同煎

一用濕證藥先煎蒼朮一二沸後入餘藥同煎

秘用三十七方就註三十七槌法

升麻發表湯 卽麻黃湯自有加減法

治冬月正傷寒頭痛發熱惡寒脊強脉浮緊無汗為表證此足太陽膀胱

經受邪當發汗以頭如斧劈身如火熾者宜用此湯

麻黃

桂枝

甘草

杏仁

升麻

川芎

防風

白芷

羌活

本經發熱惡寒頭痛無汗而喘者本方加乾葛去升麻

本經發熱惡寒身體痛者本方加蒼朮芍藥去杏仁

本經惡寒發熱身痒面赤者以其不得小汗出故也本方去白芷杏仁加柴胡芍藥

本經頭痛發熱惡寒胸中飽悶者本方加枳殼桔梗

本經感寒深重服湯不作汗者宜再服至二三劑而汗不出者死

本經汗後不解者宜再服量證輕重用麻黃升麻分多寡為當

水二鍾姜三片葱白二莖槌法加江西豆豉一撮煎之熱服取汗如神宜厚被覆首凡中病即止不得多服多則反加別病矣

疎邪實表湯 卽桂枝湯自有加減法

治冬月正傷風頭痛發熱惡寒脊強脉浮緩自汗為表證此足太陽膀胱經受邪當實表散邪無汗者不可服

桂枝

赤芍藥

甘草

防風

羌活

白朮

如汗不止加黃耆 喘加柴胡杏仁 胸中飽悶加枳殼桔梗

水二鍾姜三片棗二枚槌法加膠飴二匙煎之溫服

羌活冲和湯 以代桂枝麻黃青龍各半等湯此太陽經之神藥也

治春夏秋非時感冒暴寒頭痛發熱惡寒脊強無汗脉浮緊此足太陽膀胱經受邪是表證宜發散不與冬時正傷寒同治法此湯非獨治三時暴寒春可治溫夏可治熱秋可治濕治雜證亦有神也秘之不與庸俗知此奇妙耳本方自有加減法備開於後

羌活

半錢

防風

一錢

蒼朮

半錢

黃芩

一錢

川芎

一錢

白芷

一錢

甘草

一錢

生地黃

二錢

細辛

五分不

如胸中飽悶加枳殼桔梗去生地黃

夏月本方加石膏知母名神木湯如服此湯後不作汗本方加蘇葉喘而

惡寒身熱本方加杏仁生地黃汗後不解宜再服汗下兼行加大黃釜底

抽薪之法其春夏秋感冒非時傷風亦有頭痛惡寒身熱脉浮緩自汗宜

實表本方去蒼朮加白朮汗不止加黃耆即加減冲和湯再不止以小柴

胡加桂枝芍藥一錢如神 水二鍾姜三片棗二枚煎至一鍾槌法加葱白搗汁五匙入藥再煎一二沸如發汗用熱服止汗用溫服

柴葛解肌湯 即葛根湯本湯自有加減法

治足陽明胃經受證目痛鼻乾不眠頭痛眼眶痛脉來微洪宜解肌屬陽明經病其正陽明腑病別有治法

柴胡

乾葛

甘草

黃芩

芍藥

羌活

白芷

桔梗

本經無汗惡寒甚者去黃芩加麻黃冬月宜加春宜少夏秋去之加蘇葉本經有汗而渴者治法開在如神白虎湯下

水二鍾姜三片棗二枚槌法加石膏末一錢煎之熱服

柴胡雙解飲 即小柴胡湯本方自有加減法

治足少陽膽經受證耳聾脇痛寒熱嘔而口苦脉來弦數屬半表半裏宜和解此經膽無出入有三禁不可汗下吐也止有小柴胡一湯隨病加減再無別湯

柴胡

黃芩

半夏

甘草

人參

陳皮

芍藥

本經證小便不利者加茯苓

本經嘔者入姜汁竹茹

脇痛加青皮

痰多加瓜蒌仁貝母寒熱似瘧

者加桂枝

渴者加天花粉知母

齒燥無津液加石膏

嗽者加五味

金沸草壞證加鱉甲

本經證心下飽悶未經下者非結胸乃表邪傳至胸中未入乎腑證雖滿

悶尚為在表只消小柴胡加枳桔未效就以本方對小陷胸加枳桔一服

豁然其妙如神秘之不與俗人言之耳虛煩類傷寒證本方加竹葉炒粳米

本經與陽明合病本方加葛根芍藥如拾芥 婦人熱入血室加當歸紅

花 男子熱入血室加生地黃 老婦人傷寒無表證其熱勝者本方加

大黃甚者加芒硝

水二鍾姜一片棗二枚槌法入生艾汁三匙煎之溫服

桂枝大黃湯

卽桂枝湯內加大黃本方自有加減法

治足太陰脾經受證腹滿而痛咽乾而渴手足溫脉來沉而有力此因邪

熱從陽經傳入陰經也

桂枝

赤芍藥

甘草

大黃

枳實

柴胡

本經腹滿不惡寒而喘者加大腹皮去甘草
之臨服槌法入枳榔磨水二匙熱服

加味理中飲 即理中湯本方自有加減法

治足太陰脾經受證自利不渴手足溫身無熱脉來沉而無力此屬臟寒

乾姜

白朮

人參

甘草

肉桂

陳皮

茯苓

厥陰消渴氣上衝心飢不欲食食即吐魛腹痛大便實者加大黃蜜少許
利之

本經腹濡滿時減者依本方去甘草

本經嘔吐者入半夏姜汁

本經蹇卧沉重利不止少加附子 利後身體痛者急溫之加附子

自利腹痛者入木香磨姜汁調服和之 水二鍾姜一片棗二枚煎之臨

服槌法入炒陳壁土一匙調服取土氣以助胃氣

茵陳將軍湯 即茵陳湯本方自有加減法

治足太陰脾經腹滿身目發黃小水不利大便實發渴或頭汗至頸節還脉來沉重者宜用

大黃

茵陳

山梔

甘草

厚朴

黃芩

枳實

大便自調者去大黃厚朴加大腹皮利小便清為效水二鍾姜一片槌法加燈心一握煎之熱服

導赤散

即五苓散本方自有加減法

治小水不利小腹滿或下焦蓄熱或引飲過多或小水短赤而渴脉沉數者以利小便為先惟汗後亡津液與陽明汗多者則以利小便為戒

茯苓

猪苓

澤瀉

桂枝

白朮

甘草

滑石

山梔

中濕身目黃者加茵陳 水結胸證加木通燈心如小水不利而見頭汗出者乃陽脫也 得病起無熱但譫語煩燥不安精采不與人相當此湯治之 水二鍾姜一片燈心二十莖槌法入鹽二字調服

六乙順氣湯

以代大承氣小承氣調胃承氣大柴胡三乙承氣湯大陷胸等湯之神藥也舉世無人知此竒妙耳秘之莫與俗人言本方自有加減法備開此湯治傷寒熱邪傳裏大便結實口燥咽乾怕熱譫語揭衣狂妄揚手擲足班黃陽厥潮熱自汗胸腹滿硬遶臍疼痛等證悉皆治之效不盡述

大黃

枳實

黃芩

厚朴

甘草

柴胡

芒硝

芍藥

潮熱自汗譫語發渴揚手擲足揭去衣被狂妄斑黃大便實者俱屬正陽明胃腑病依本方

口燥咽乾大便實者屬少陰依本方

下利純清心下硬痛而渴者屬少陰依本方

怕熱發渴譫妄手足乍冷乍溫大便實者陽厥證屬厥陰依本方舌卷囊縮者難治須急下之

譫語發渴大便實遶臍硬痛者有燥屎依本方

熱病目不明謂胃水已竭不能照物病已篤矣惟宜急下依本方目中不

了了即目不明也

轉尿氣者謂下泄也有燥屎焉當下之依本方如更衣者止後服不必盡劑不更衣者宜再少與大便通者愈

結胸證心下硬痛手不可近燥渴譫語大便實者依本方去甘草加甘遂桔梗凡傷寒過經及老弱并血氣兩虛之人或婦人產後有下證或有下後不解或有表證尚未除而裏證又急不得不下者用此湯去芒硝下之則吉蓋恐轉藥硝性燥急故有此戒大凡傷寒邪熱傳裏結實須看熱氣淺深用藥今之庸醫與俗醫不分當急下可少與宜微和胃氣之論一概用大黃芒硝亂投湯劑下之因茲枉死者多矣余謂傷寒之邪傳來非一治之則殊耳病有三焦俱傷者則痞滿燥實堅全俱宜大承氣湯厚朴苦溫以去痞枳實苦寒以泄滿芒硝鹹寒以潤燥軟堅大黃苦寒以泄實去熱病斯愈矣邪在中焦則有燥實堅三證故用調胃承氣湯以甘草和中芒硝潤燥大黃泄實不用枳朴恐傷上焦虛無氤氲之元氣調胃之名自此然矣上焦受傷則痞而實用小承氣湯枳實厚朴之能除痞大黃之泄