

果部

02726

菜部

穀部

本草從新

卷十一  
十二

本草從新卷十目錄

果部 五果類六種

杏仁 巴旦杏仁

烏梅

桃仁

栗

大棗

山果類十五種

梨

柿

木瓜

山楂

橘皮

青皮

香櫞

香櫞

花紅

枇杷葉

楊梅

石榴皮

銀杏

胡桃

榛

夷果類九種

荔枝核

龍眼肉

橄欖

榧子

海松子

檳榔

大腹皮 枳枳子 落花生

味類五種

川椒 秦椒 胡椒 吳茱萸 茶

蓏類五種

瓜蒂 西瓜 甘蔗 白沙糖 紫沙糖

水果類十種

蓮子 石蓮子 蓮蕊鬚 藕節 藕 荷葉

蕷 芙實 勃臍 慈姑

本草從新卷十

果部 五果 山果 夷果 味類 蔬類

李梨

杏仁 滉肺解肌潤燥

辛苦甘溫而利。有小毒。瀉肺降氣。行痰解肌。除風散寒。利胸

膈氣逆通大腸氣秘

東垣曰。杏仁下喘治氣。桃仁療狂治血。俱治大便秘。當分氣血脈浮屬氣晝便

難而陽氣秘者用杏仁。陳皮脈沉屬血夜便難而陰血秘者

用桃仁。陳皮肺與大腸相表裏。賁門在上。魄門在下。爲氣之通道。故並以陳皮佐之。

杏潤燥消積

索麵豆粉近之則爛。

治時行頭

痛。上焦風燥欬逆上氣

炒研蜜丸含嚥。

煩熱喘促。其毒性又能殺蟲

治瘡。制錫毒狗毒

消狗肉積。

因虛而欬嗽便閉者忌之。雙仁者

殺人。去皮尖炒研發散。連皮尖研得火良惡葛根黃芩

生人去皮尖炒研發散連皮尖研得火良惡葛根黃芩

耆。杏子酸熱有小毒損人孕婦忌。

亡旦杏仁潤肺下氣

甘平止欬下氣消心腹逆悶。有溼痰者勿服。

以其性潤也。凡仁皆潤。

形扁皮白尖彎如鸚哥嘴者真。

形圓皮黃尖直者名甜杏仁出山東河南不入藥。

烏梅瀉腸斂肺

酸澀而溫脾肺血分之果瀉腸斂肺。

肺欲收急食酸以收之。

止血涌痰

消腫解毒生津止渴。

時珍曰梅花於冬而實於夏得木之全氣故最酸膽爲甲木肝爲乙木人舌下

有四竅兩通膽液。

故食酸則津生。

醒酒殺蟲治久嗽瀉痢。

血痢尤良。梁莊肅公血痢陳應之

用烏梅胡黃連竈下土等分爲末茶調服而愈曾魯公血痢百餘日國醫不能療應之用鹽梅肉一枚研爛合臘茶入醋

服一啜而安。

瘡瘍霍亂吐逆反胃下血血崩安蛇厥。

蛇蟲上攻而吃止蟲得酸

則伏

去黑痣蝕惡肉疽愈後有肉尖起燒存性研末敷之一日減半兩日而平。

病有當發

表者大忌酸收誤食必爲害。

青梅薰黑爲烏梅

稻灰汁淋蒸則肥澤

不蠹○大便不通氣奔欲死者烏梅十顆湯浸去核丸棗大納入下部少時卽通。

產安吉者肉厚多

脂最佳

合溪者次之長沙梅福建梅肉薄無脂不堪用

白梅

酸澀鹹平功用略同烏梅治痰厥僵仆牙關緊閉取

揩擦牙齦涎出卽開蓋酸先人筋齒驚癇喉痺梅核膈氣取

輒卽易開若用鐵器攬開恐傷其齒青半黃梅子每箇用鹽一兩淹一日夜曬乾又浸又曬至水

盡乃止用青錢三箇夾二梅麻線縛定通裝磁罐內封理地下百日取出每用一枚含之喉汁入喉卽消

收一年者治一人收二年者治二人神效

敷乳癰腫毒刺

入肉中

搗爛罨之卽出瘡中刀箭傷膚搗敷血卽止

多食損齒

傷筋

經曰酸走筋筋病無多食酸若過食而齒隣者嚼胡桃肉以解之

鹽漬爲白梅

取大青梅

以鹽汁漬之日曬夜漬十日成矣。久乃上霜故又名鹽梅。  
衣生蠶點者梅葉煎湯洗之卽去。清水揉梅葉洗蕉葛衣經  
夏不脆。有驗。

### 根葉治休息痢及霍亂煮濃汁飲之

桃仁

瀉破血潤燥入肝經血分

苦平微甘苦以泄血滯甘以緩肝氣而生新血。成無己曰：肝聚則肝氣燥。肝苦通大腸。血秘治熱入血室。衝脈血燥血痞損急急食甘以緩之。傷積血。血痢經閉。欬逆上氣。血和則氣降皮膚燥癩。肌有發熱如

狂若小腹滿痛小便不利者爲畜血

若非血瘀而誤用之。大傷陰氣。

泡

去皮尖炒研碎雙仁者有毒不可用。香附爲使。

婦人陰癢。桃仁杵爛綿裹

塞之產後陰腫。桃仁搗研傳之俱妙。

凡行血連皮尖去用

活血潤燥去皮尖炒用

桃花

通大瀉

苦平下宿水除痰飲消積聚利二便療風狂

蘇顥杜陽編載范純佑女喪夫發狂閉之室中夜斷窗櫺登桃樹食花幾盡自是遂愈以能瀉痰飲滯血也○儒門事親載一婦滑瀉數年百治不效或言此瀉飲有積也桃花落時以棘鍼刺取數十萼勿犯人手以麪和作餅煨熟食之米飲送下一二時瀉下如傾六日行至數百行昏困唯飲涼水而平

以攻決爲用但可施於

氣實有餘之證若無故而因除百病美顏色諸謬說而服之

爲害不小三月三日採花揀淨以絹袋盛懸簷下陰乾

葉者勿用

桃葉宣發汗

苦平殺蟲發汗

凡傷寒風痹發汗不出以火燒地用水灑之布乾桃葉於

上厚二三寸席臥溫覆取大汗被中敷粉極燥便瘥凡麥麴蠶沙皆可如此法用

采嫩者名桃心

入藥尤勝

桃子辛酸甘熱微毒多食令人有熱生癰癧損

無益五果列桃爲下以此與齧同食患心痛服尤人尤忌之

桃梶

是桃子在樹經冬苦不落者正月採之

微溫有小毒辟邪祛祟。白禿頭瘡乾桃一兩黑丑一合爲末臘豬脂調搽。

栗補腎

鹹溫厚腸胃補腎氣能解羊羶

小兒不可多食生則難化熟則

滯氣小兒疳瘡生嚼栗子敷之

大棗

補脾胃潤心肺調營衛和百藥

甘溫補中益氣滋脾土潤心肺調營衛緩陰血生津液悅顏色通九竅助十二經和百藥傷寒及補劑中加用之以發脾

胃升騰之氣

須與薑並行

紅棗功用相倣差不及爾

雖補中

而味過於甘中滿者忌之

甘令人滿大建中湯心下痞者減  
餳棗與甘草同例○經言棗爲脾

果脾病宜食之又曰脾病人毋多食甘毋乃相戾耶不知言

宜食者指不足之脾也如脾虛泄瀉之類毋多食者指有餘

之脾也。如實滿腫脹之類，凡用藥者能隨其虛實而變通之。  
雖尋常品味必獲神功。苟執而泥之，雖有良劑莫展其長。故  
學者以格致爲亟也。凡風疾痰熱及齒痛俱非所宜。小兒疳病亦禁生  
者尤爲不利。北產肥潤堅實者佳。

金華南棗及徽寧所產皮薄而皺，花紋甚細，而

可愛味雖甘美而微帶酸且脂少於北棗，止可充食用，皆不堪入藥。八藥宏景曰：南棗大惡，不堪啖。蘇頌曰：江南出者堅燥少脂，不可殺烏附毒，忌葱魚同食。諸瘡久壞不愈者，棗膏三升煎水，頻洗取愈。○食椒閉氣

食棗

○以上五果類

梨 涼心潤肺利大小腸

梨

甘寒微酸涼心潤肺利大小腸

丹溪曰：梨者利也。流利下行之謂也。

止嗽消痰

清喉降火

生之可清六腑之熱，熟之可滋五臟之陰。

實火宜生，虛火宜熟。除煩解渴，潤燥消

風。人知其清火消痰，不知其散風之妙。

醒酒解毒

經疏曰：膏梨之家，厚味醕酒，縱肆無節，必多痰火，癰疽卒

中之患。唯數食梨能轉重爲輕。變危爲安。治傷寒發熱。熱嗽痰喘。中風失音。

搗汁  
煩服

聖惠方梨汁煮粥治小兒心臟風熱昏躁。

切片貼湯火傷。脾虛泄瀉。乳婦及金

瘡忌用。

搗汁用熬膏亦良。加薑汁蜂蜜佳。清痰止嗽與萊

菔相間收藏則不爛。

柿

潤肺寧嗽瀉腸

生用甘冷潤肺止欬嗽。清胃理焦煩。乾柿甘寒而澀。瀉腸止反胃。

有人三世病反胃至孫以柿乾同飯常食不飲水愈。

腸風下血痔漏。

肺與大腸相表裏。臟清則

腑熱亦除。方勺泊宅編柿乾燒灰飲服二錢治下血。

柿霜乃其津液。生津化痰。清上

焦心肺之熱。爲尤佳。治咽喉口舌瘡痛。柿性頗寒。肺經無

火證

母丁香  
竹葉湯  
治言  
三方今  
此治  
陽证呃逆

修

火及風寒作嗽冷痢滑洩者息之

若與蟹同食令人腹痛

作瀉

柿蒂止呃逆

古方單用取其苦溫降氣濟生加工  
香生薑取其開鬱散痰亦從治之法

木瓜

和脾舒筋瀆斂肺

酸澀而溫和脾理胃斂肺伐肝化食

酸能斂斂則止渴  
化與山楂同

酸能生津

氣脫能收氣滯能和調營衛利筋骨

筋急者得之卽舒筋緩者遇之卽利

去溼

熱消水脹治霍亂轉筋

邪傷脾胃清濁不分揮霍擾亂上吐下瀉甚則肝木乘脾而筋爲之轉也

時珍曰肝雖主筋而轉筋則因風寒溼熱襲傷脾胃所致轉筋必起於足腓腓及宗筋皆屬陽明木瓜治轉筋取其理脾

以伐肝也土病則金衰而木盛故用酸溫以收肺脾之耗散而藉其走筋以平肝脾乃土中瀉木以助金也

瀉痢

腳氣脾主四肢或寒溼傷于足絡或胃受溼熱之物上輸於

舟見舟中一袋以足倚之比及登岸足已善步矣詢袋中何

物乃木腰足無力。多食損齒及骨病瘻閉。

酸收太甚鄭奠  
一曰木瓜乃酸

牆之品世用治水腫腹脹誤矣。有大察舟過金陵愛其芬馥  
購數百顆置之舟中。舉舟人皆病溺不得出。醫以通利罔效。  
迎予視之聞四面皆木瓜香。笑謂諸人曰撤去此物溺  
卽出矣不必用藥也。于是盡投江中。頃之溺卽如舊。

者良忌鐵。

反花痔瘡木瓜爲末以鱈魚身土涎調貼之。  
以紙護住辟除壁蟲。木瓜切片鋪於席上。

山楂

古字作楂○瀉破氣消食化痰散瘀

陳

酸甘微溫健脾行氣消食磨積。

善去腥羶油膩之積與麥芽  
消穀積者不同。凡煮老雞硬

肉投數枚則易爛。其消肉積可知。

散瘀化痰發小兒痘疹行乳食停留止兒

枕作痛。

惡露積於太陰少腹作痛。名見枕痛砂糖調服。

療小腸疝氣。

茴香佐之

多食令

人嘈煩易飢反伐脾胃生發之氣。

凡服人參不相宜者服山楂卽解。一補氣一瀉氣也。

胃中無積及脾虛惡食者忌服。有大小二種小者入藥一

名棠毬子去皮核核亦有用化食

宣理氣調中瀉燥溼消痰

### 橘皮

宣理氣調中瀉燥溼消痰

辛能散溫能和苦能燥能瀉爲脾肺氣分之藥

脾爲氣母肺爲氣竈。凡用橘皮以利氣者。

補藥滷藥有宜佐調中快膈導滯消痰

大法治痰以健脾順氣爲主潔古曰陳皮

枳殼利其氣而痰自下

定嘔止嗽利水破癥宣通五臟統治百病皆取

其理氣燥溼之功入和中藥則留白入疏通藥則去白去白

名橘紅兼能除寒發表

皮能發散皮膚

氣雖中和亦損真元無滯

勿用

廣產爲勝皮厚不脆有豬棕紋

福建產者名建皮力薄浙江衢州出者名

衢皮更惡劣矣陳久者良故又名陳皮

陳則烈氣消無燥散之患半夏亦然故同用名二陳湯

治痰欬喘便浸曬治痰積薑汁炒入下焦鹽水炒

化州陳皮消痰甚靈

然消伐太峻不宜輕用況此  
物真者絕少無非柚皮而已

青皮 瀉肝破氣散積

辛苦而溫色青氣烈入肝膽氣分疏肝瀉肺

凡瀉氣藥皆瀉肺引諸

藥至厥陰之分

柴胡疏上焦肝氣平下焦肝氣

下飲食入太陰之倉破滯

削堅消痰散痞治肝氣鬱積肠痛多怒久瘧結癥

入肝散邪入脾除痰

故清脾飲以之爲君胸膈氣逆疝痛乳腫

丹溪曰乳房屬陽明乳頭屬厥陰乳母或因忿怒鬱悶厚味釀積致厥陰之氣不行故竅不得出陽明之血膽沸故熱

甚而化膿或因其子有帶疾膈熱含乳而腫虛氣致生結核

者初起便須忍痛採輕吮令汁透自可消散治法俱宜以青皮疏肝滯爲主再加石膏清胃熱括樓消腫甘草節解毒餘如沒藥橘葉金銀花蒲公英皂角刺當歸皆可隨宜用之少佐以酒久則凹陷名乳巖不可治矣

最能發汗

皮能達皮辛善發散

氣虛及有汗者忌用

性頗猛銳如人年少壯未免躁暴及長大而爲禦皮

如人至老年烈性慚減經久而爲

陳皮則多歷寒暑躁氣全消也

古方

者宋以後始

與陳皮分用

去瓤切片醋拌炒

陳皮升浮入肺治高青皮沉降入肝膽治低炒之以醋

所謂肝欲散急食辛以散之以酸泄之以苦降之也

葉治乳癰脇癰肺癰

皆能入厥陰行肝氣

清腫散毒絞汁飲之

內生痰聚氣

時珍曰橘皮下氣消痰其肉生痰聚飲表裏之異如此

核

治疝痛腰腎冷痛去皮炒

香櫟

俗作圓一名佛手柑古名枸櫞音矩員

理氣止嘔健脾

進食

辛苦酸溫入肺脾二經理上焦之氣而止嘔進中州之食而

健脾除心頭痰水治痰氣欬嗽

煮酒飲

心下氣痛性雖中和

單用多用亦損正氣須與參朮並行乃有相成之益爾

陳

久者良根葉功用略同

香欒下氣消食快膈化痰

苦甘酸辛而平。下氣消食。快膈化痰。解酒毒。治飲酒人口氣。  
去腸胃中惡氣。散憤懣之氣。療妊娠不思食。口淡愈痰。氣欒  
嗽。用香欒去核切砂餅內浸酒封固一夜煮爛蜜拌勻時時含嚥。能去濁惡之氣。無滯而  
固。

虛者禁之。孕婦氣虛者勿與。此柚之屬也。其黃而小者爲  
密筩。其大者謂之朱欒。最大者謂之香欒。今人誤稱爲香圓。  
不知香圓卽佛手相也。香欒夏初生白花。六月成實。至冬黃  
熟。今人於六七月間採其小實曬乾。至十月僞枳實枳殼。

花紅卽林檎○澗生津

酸澗甘溫。生津。治消渴。洩精水痢。小兒閃癖。頭髮豎黃瘰癧瘦弱者乾末和