

卷肆

徐靈胎先生醫書十六種

錦文堂印行

傷寒論類方

王吳江徐大椿靈胎編輯

桂枝湯類一

桂枝湯一

桂枝三兩

去皮芍藥二兩

甘草二兩

生薑二兩

大棗十二

枚

放摩

右五味

㕮咀

以水七升

微火煮去三升

去滓適寒溫

服一升

服已須臾

散熱稀粥一升

餘以助藥力

傳於肺

肺主皮毛

汗所從出

散粥充胃

氣以達於肺也

觀此可知傷

寒不禁食矣

溫覆令一時許

遍身熱熱微似有汗者

益佳不可令如水流瀉

病不必除

此解肌之法也

動榮氣衛

邪仍在

若一服汗出

病瘥停後服

不必盡劑

若不汗更服依前法

又不汗後服小促其間半日許今

三服盡

若病重者

一日一夜服

周時觀之

服一劑盡

病證猶在者

更作服

若汗不出

乃服至二三

劑

桂枝

桂枝</p

桂枝法
陽仍不離

下也

太陽病外症未解者不可下也

此禁下
標訣

下之為逆欲解外者宜服

言雖有當下之症而外症未除亦不可下仍宜解外

須解外則愈宜服

脉浮而下此為誤下後仍浮則邪不因誤下而陷人仍在太陽不得因已汗下而不復用桂枝也

病嘗自汗出者此謂榮氣和榮氣

和者外不諧以衛氣不共榮氣和諧氣和者言榮氣不病非

和者外不諧以衛氣不共榮氣和諧故爾調和之和故又申言之

以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮

衛和則愈宜桂枝湯

自汗與發汗迥別自汗乃榮衛相離發汗使榮衛相合自汗傷正

病人藏無他病

桂枝湯發汗驅邪復發者因其自汗而更發之則榮衛和而自汗反止矣

無他病太陽諸症不必

時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時未熟

而惟發熱自汗故亦

其小便清者知不在裡仍在表也便亦為

裡有熱當須發汗若頭痛者必衄蓋在經而血動矣

宜桂枝湯傷

寒發汗解半日許復煩脉浮數者可更發汗

發汗未透故煩乃宜桂枝湯太陽症仍在不得以日久不便而下也

按未二字從金匱增入傷寒論失此字

不正症身疼痛者急當救裡此誤下之症邪在外而引之入陰故便清穀陽氣下脫可危雖表症未除

症急當救裡而救裏為急傷寒論不可下篇云誤下寒多者便清穀熱多者便躁血

後身疼痛清便自調者急當救表清穀已止疼痛未除仍從表治蓋凡病皆當先表後裏惟下利清穀則

桂枝湯桂枝為驅風聖藥

救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯扶陽為急而表症為緩也表裏分治而序不亂後人欲以一方治數

桂枝湯桂枝為驅風聖藥

太陽病發熱汗出者此謂榮弱衛強故使汗出欲救邪風者宜

人煩熱汗出則解又如瘧狀

陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜此方

陽明本自多汗但不惡寒而惡熱今

虛浮者宜發汗一症而治法迥別全以脉為下之興大承氣湯發汗宜桂枝湯

太陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯太陰本無汗法因其脉獨浮則邪仍病

多汗而猶惡寒則仍在太陽

矣雖陽明病而治從太陽此亦從脉而不從症之法也

桂枝湯此節屬厥陰症未必由誤治

桂枝湯先溫其裏乃攻其表溫裡宜四逆湯攻表宜桂枝湯而得然既見表症亦宜兼治

不休者當消息和解其外宜桂枝湯小和之桂法輕其劑而加減之可也

桂枝湯傷寒大下後復發汗再誤心

下痞邪人惡寒者表未解也。不可攻痞。當先解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜大黃黃連湯。

湯苦寒開降之

去詳見後

桂枝加附子湯

二

桂枝湯原方加附子

一枚泡去皮破八片

右六味以水七升煮取三升去渣溫服一升。

太陽病發汗遂漏不止

此發汗太過如水流洩或藥不對症之故。中風本惡風汗後當愈今小便難少津液

四體微急

難以屈伸

四肢為諸陽之本急難屈伸乃津脫陽虛之象但不至亡陽耳若更甚而厥冷惡寒則有陽脫之慮當用四逆湯矣

桂枝加附子湯主之

桂枝同附子服治症迥別古聖立方之嚴如此

桂枝加桂湯

三桂枝原方加桂二兩即另立湯名治症迥別古聖立方之嚴如此

桂枝原方加桂

二兩

右五味以水七升煮取三升去渣溫服一升。

燒針今其汗針處被寒

復感新寒核起而赤者必發奔豚氣從小腹上衝心者灸其核上各一壯

不止一針故云各一壯

與桂枝加桂湯

重加桂不特禦寒且制腎氣又藥味重則能達下凡奔豚症此方可增減用之

桂枝去芍藥湯

四

桂枝湯原方去芍藥

五

右四味以水七升煮取三升溫服一升。

桂枝去芍藥加附子湯

五

即前方加附子一枚泡去皮破八片

餘依前法

太陽病下之後脉促胸滿

考中虛而表邪仍在

藥方中加附子湯主之

微惡寒者則陽亦虛矣故加附子

桂枝加厚朴杏仁湯

六

桂枝湯原方加厚朴

二兩

杏仁五十

右七味以水七升微火煮取三升溫服一升覆取微似汗。

喘家作桂枝湯加厚朴杏仁佳
乃本然之喘此乃設下之喘因殊而法一

本經杏仁主咳逆上氣

太陽病下之危喘者表未解故也此湯主之前

小建中湯

桂枝湯原方加膠飴一升右六味以水七升煮去三升去滓納飴更上微火消解溫服一升日二服

嘔家不可用建中湯以甜故也

傷寒陽脉濇陰脉弦中宮之陽氣虛則木來乘土故陽濇而陰弦也

法當腹中急痛先與小建中湯以助中宮不差者與小柴胡治太陰不愈變而治少陽所以陳土中之本也以脉弦故用此法

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之煩可知故用建中湯以補心脾之氣蓋施子湯治有熱之虛煩此治無熱之虛煩也

桂枝加芍藥生薑人參新加湯八

桂枝湯原方芍藥生薑各增一兩加人參三兩

右六味以水一斗二升煮取三升去滓溫服一升此

啜煎為妙取其味厚入腹地

發汗後身疼痛表未脉沉遲氣虛此湯主之

邪未盡宜表而氣虛不能勝散藥故用人參凡素體虛而過汗者方可用

桂枝甘草湯九

桂枝四兩甘草二兩

右二味以水三升煮取一升頓服此以一劑

發汗過多其人叉手自冒心下悸欲得按者此湯主之

發汗不誤誤在過多汗為心之液多則心氣虛辨地則用真武湯矣一症而輕重不同用方迥異其義精矣

茯苓桂枝甘草大棗湯十

茯苓半斤桂枝四兩甘草二兩

大棗十二

右四味以甘爛水一斗

以水二斗搗之萬遍取用

按甘先

煮茯苓凡方中專重之減二升納諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服。

發汗後其人脣下悸者欲作奔豚此湯主之心下悸是擾胸中之陽脾下悸則因發汗太過上焦乾

涸腎水上救故重用茯苓以制腎水桂枝以制奔豚

桂枝麻黃各半湯十一

桂枝一兩十六
去皮芍藥 生薑

甘草炙
去節各一兩

麻黃一兩

去節各一兩杏仁二十四枚去皮及雙仁者

大棗四枚

右七味以水

五升先煮麻黃一二沸去上沫

欲去沫故先煮

納諸藥煮取一升八合

減去三分去滓溫服六合

一云桂枝湯三合麻黃湯三合頓服將患如上法

太陽病得之八九日

遇如虐狀發熱惡寒熱多寒少

邪已漸輕其人不嘔非少陽

清便欲自可無裏一日二三度

熱退之象氣微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也

明上文欲愈之故蓋由病氣雖除而正氣亦衰當靜以養之使胃氣漸充則

榮衛自和若更用汗吐下之法益虛其氣則病從藥增醫者不審誤人多矣

面有熱色則微邪已在皮膚中欲自出不得故身痒以此湯取其小汗足

餘邪尚鬱三方分兩甚輕計共約六兩合今之秤僅一兩三四錢分

服紙服四服零乃治邪退後至輕之劑猶勿藥也

桂枝二麻黃一湯十二

桂枝一兩十七
去皮芍藥一兩

杏仁十六枚

去皮尖頭

甘草二錢生薑一兩

大棗五枚

右七味以水五升

先煮麻黃一二沸去上沫納諸藥煮取二升去滓溫服一升日再服一本云桂枝湯二升麻黃湯一升

合為三升分再服

服桂枝湯大汗出脉洪大者

汗雖出而邪未盡

與桂枝湯如前法此所謂邪不盡

行復如法者也

若形如癓日再發者汗出必解

桂枝二麻黃一湯主之

此與麻黃桂枝各半湯意畧同但此因

大汗出之後故桂枝重而麻黃畧輕

桂枝二越婢一湯十三

桂枝湯加麻黃石羔二味

桂枝去皮芍藥

甘草

麻黃去節各十八昧

大棗四

生薑二昧

右七味以水五升

石羔碎綿裏

二兩

煮麻黃一二沸去上沫納諸藥煮取二升去渣溫服一升

附越婢方

麻黃六兩

甘草二兩

石羔

羊半助生薑三兩

大棗十五枚

桂枝去桂加茯苓白朮湯十四

桂枝去桂加芍藥

桂枝去桂加芍藥

太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者此無陽也不可更汗。此無陽與亡陽不同並與他處之陽虛亦別而脉微弱若發其汗必至有火手冒心膽下悸等症故以此湯清陳榮衛令得似汗而解况熱多寒少熱在氣分尤與石羔為宜古聖用藥之審如此按以上三方所謂一二各半之說照方計算並不對準未何說或云將本方各煎或一分或二分相和服此亦一法但方中又各藥注明分兩則何也考存

桂枝去桂加茯苓白朮湯十四

芍藥三兩甘草二兩

生薑

茯苓

白朮各三

大棗十二

右六味以水八升煮取三升去滓溫

服一升小便利則愈

此方專於利小便也

服桂枝湯或下之仍頭頂強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者此湯主之。頭痛發熱桂枝症仍在也以其無汗則不宣更用桂枝心下滿則用白朮小便不利則用茯苓此症乃亡津液而有停飲者也。凡方中有加減法皆佐使之藥若去其君藥則另立方名今去桂枝而仍以桂枝為名所不可解殆以此方雖去桂枝而意

桂枝也

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯十五

桂枝湯原方去芍藥加蜀漆

三兩洗去腥

牡蠣五兩

龍骨四兩

右七味以水一斗二升先煮蜀漆減二升

納諸藥煮取三升去滓溫服一升

傷寒脉浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂以火劫其起卧不安者此湯主之。此與少陰汗出之亡陽迥別蓋用四逆輩回其陽於腎中今乃以火逼汗亡其陽中之陽故用安神之品鎮其陽於心中各

有至理不可易也去芍藥因陽虛不復助陰也蜀漆去心服邪積龍骨牡蠣治驚癇熱氣桂枝甘草龍骨牡蠣湯十六

桂枝去皮甘草二兩牡蠣二兩龍骨二兩

右四味以水五升煮取二升半去渣溫服八合日三服

脈浮宜以汗解此治脉浮下則陰氣獨治於下故重而癆

火逆下之又誤用火灸之誤因燒針煩躁者更誤治下之虛其陰燒針又益火反病從腰以下必重而癆名火逆也火氣

主之鎮其陰氣散其火邪上下同治前方驚狂治重在心故

用蜀漆此無驚狂象故蜀漆不用其症藥大段相同

桂枝加葛根湯十七

此湯成無已本有麻黃則葛根湯矣

有麻黃則葛根湯非

桂枝湯原方加葛根四兩桂枝芍藥各減一兩餘同

諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須啜粥

太陽病項背強八八反汗出惡風者氣漸深故加葛根桂枝加葛根湯主之

桂枝湯原方加芍藥加一倍右五味以水七升煮取三升溫服一升日三服

桂枝加大黃湯十九

此二方俱治太陰症而法不離乎桂枝

桂枝湯原方加大黃一兩芍藥一倍

右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

本大陽病醫反下之

因而腹滿時痛屬太陰也

引邪人於太陰故桂枝加芍藥湯主之雖見太陰症而現皆太陰之症

罷故仍用桂枝湯只加芍藥一倍以斂太陰之症

大實痛者此句承上文腹滿時痛言腹滿時痛不過桂枝加芍藥湯主之

傷太陰之氣太陰之實痛則邪氣結於太陰矣

前桂枝症可加黃芩一分謂之陽旦湯夏至後可加知母半兩石羔一兩或加升麻一分若病人素虛寒者不必加減

麻黃湯類二

麻黃湯一

桂枝湯

麻黃湯

麻黃三兩桂枝二兩甘草一兩杏仁七十個

右四味以水九升先煮麻黃減二升

此須多煮取其力專不僅為去上沫

止煮

二沸矣

去上沫納諸藥煮取二升半去滓溫服

八合覆取微似汗不須啜粥

以其易發汗也餘如桂枝將息法

羔黃芩蓋麻黃性熱恐有發黃斑出之慮

活人書云夏至後用麻黃湯量加知母石

仁治喘桂枝甘草治太陽諸症無一味不驗切所以謂之經方

喘而胸滿者不可下病俱在上焦宜麻黃湯主之

喘而胸滿比麻黃症

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛重因藥術俱受傷故也

惡風無汗而喘者此二症乃肺氣不舒之症麻黃治無汗杏仁治喘桂枝甘草治太陽諸症甚多如身熱不惡寒口苦鼻乾之類但無一味不驗切所以謂之經方

太陽與陽明合病見一二症即是不必全具也太陽病即上文所指者

太陽病十日以去過脉浮細邪已而

嗜卧者正漸復外已解也設胸滿腸痛者與小柴胡湯邪留少陽故與此湯

太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛此乃太陽傷寒的

用麻黃湯此亦從脉不從症之法

太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛此乃太陽合陽明也

證仍在表證即上此當發其汗

太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛此乃太陽傷寒的

清道而出與汗從皮毛而洩同故熱邪亦解俗語所云

太陽病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄所以然者陽氣重故也

紅汗也經云陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄

太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛此乃太陽合陽明也

類麻黃湯主之此言未衄之前可用麻黃湯

太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛此乃太陽合陽明也

汗宜麻黃湯數爲陽明病治失因致衄者麻黃湯主之

前段衄後而解則不必復用麻黃湯

麻黃杏仁甘草石膏湯二加杏仁也

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫納諸藥

煮取二升去滓溫服一升

麻黃四兩杏仁五十個甘草二兩石羔半助碎

此即越婢湯

發汗後不可更行桂枝湯既汗不可再汗汗出而喘尚有留邪在肺無大熱者邪已可與此湯

汗出故用石羔喘故

杏發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘此二句明致喘之所由蓋喘未必皆由於水而飲水則無有不喘者戒之

下後不可更行桂枝

湯既下不可復汗。若汗出而喘無大熱者可與此湯。

大青龍湯

三此合麻黃桂枝越婢三

方為一方而無芍藥

麻黃六兩

去節桂枝去皮

甘草二兩

炙杏仁四十枚

去皮尖生薑三兩

切大棗十二枚

石膏碎如雞子

大一塊

右七味

以水九升

溫粉方明理論載白朮蕷本川芎白芷各等分入米粉和勻撲之無

本亦得後人用牡蠣麻黃根船粉龍骨亦可

一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩燥

不得眠也

太陽中風脉浮緊。緊為陰脉故

汗不易出。發熱惡寒

非惡身疼痛汗不出而煩躁者

邪深大青龍湯主之

若脉微弱

汗出惡風者不可服

之則厥逆筋惕肉瞤

此為逆也

惡風乃桂枝症誤服此則汗不止而有亡陽之象

麻桂而用石羔何以發汗如是之烈

蓋麻黃湯麻黃用二兩而此用六兩越婢湯石羔用半

子大一塊一劑之藥除大棗約共十六兩以今秤計之亦重

三兩有餘則發汗之重劑矣雖少加石羔終

而此用雖

不足以相制也

少陰篇云脉

傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時

無少陰症者大青龍湯主之

按此條不沉緊

必有誤服浮緩邪輕易散身不疼外邪已退乍有輕時病未入陰又別無少陰等症此病之最輕者何必

投以青龍險峻之劑此必另有

身有輕時為無少陰外症不厥利吐逆為無少陰裏症此邪氣俱在外也故以大青龍發其汗

按此條必另有所誤而誤以大青龍當之者也

小青龍湯

四

麻黃去節

芍藥

細辛

乾薑

甘草

桂枝去皮各

三兩

五味子半兩

半夏半升

湯洗

右八味以

水一斗先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升

若微利者去

麻黃加茺蔚如雞

子大熬令赤色

利屬下焦陰分

不可更發其陽

茺蔚明理論作茺蔚恐誤

本草茺蔚花

葉相近而茺蔚不常用

當時已不可得故改用茺蔚以其皆有去水之功也

若渴者去

茺蔚

古作飼

論云寒氣相搏則為腸鳴醫乃不知而反飲冷水

半夏加桔梗根三兩

本草桔梗

根主消渴若噎者

噎古作飼

論云寒氣冷必相搏其人即飲

桔梗內經無噎字疑即令

呃逆之去麻黃加附子一枚

炮本草附

溫中若小便不利少腹滿

去麻黃加茯苓四兩

則水

小便不利而少腹滿

而在下矣

滿滿即令

裡者去麻黃加附子一枚

炮本草附

溫中若小便不利少腹滿

去麻黃加茯苓四兩

則水

小便不利而少腹滿

而在下矣

滿滿即令

效用
若喘者去麻黃。加杏仁半升去皮尖。
無微不到
真神劑也。

傷寒表不解。
發汗心下有水氣。即未出未透心之汗。乾嘔發熱而咳或渴或痢或噎或小便不利少腹滿或喘者。小青龍湯主之。
以上皆水停心下現症。其每症治法皆在加減中。
傷寒心下有水氣。欬而微喘發熱不渴。凡水停心下。則傷寒欲解也。
寒欲去。小青龍湯主之。
此倒筆法。即指服湯已三字。非謂欲解之後更服小青龍湯也。

麻黃附子細辛湯

五

麻黃去節二兩細辛二兩附子一枚泡

右三味先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升。日

少陰病始得之。反發熱脉沉者。此湯主之。
少陰病熱知為病。少陰發熱否則何以知其非太陽陽明之發熱耶。又必候其脉象之沉然後益知其為少陰無疑也。凡審症皆當如此。附子細辛為少陰溫裏。故陰經諸藥皆用之。麻黃則專於發表。今欲散少陰始入之邪。非麻黃不可。況已有附子足以溫少陰之經矣。

麻黃附子甘草湯

六

麻黃去節二兩甘草炙二兩附子一枚泡

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸。
少煮去上沫納諸藥煮取三升。

去滓溫服一升。日三服。

少陰病得之二三日。麻黃附子甘草湯微發汗。以二三日無裏症。故微發汗也。
三陰經惟少陰與太陽為解之理。况二三日而無裏症。則其邪未深入。此方較麻黃附子細辛少輕以其無裏症也。

葛根湯類

三

葛根湯一
此即桂枝湯加麻黃。

葛根

四兩

麻黃三兩

桂枝二兩

芍藥二兩

生薑三兩

甘草二兩

桂枝二兩

大棗十二枚

葛根

四兩

葛黃三兩

葛根四兩

桂枝三兩

芍藥三兩

生薑三兩

甘草二兩

桂枝二兩

大棗十二枚

葛根

四兩

葛黃三兩

葛根四兩

桂枝二兩

芍藥三兩

生薑三兩

甘草二兩

桂枝二兩

大棗十二枚

葛根

四兩

葛黃三兩

葛根四兩

桂枝二兩

芍藥三兩

生薑三兩

甘草二兩

桂枝二兩

大棗十二枚

葛根

四兩

葛黃三兩

葛根四兩

桂枝二兩

芍藥三兩

生薑三兩

甘草二兩

桂枝二兩

大棗十二枚

葛根

黃葛根

主藥先煮

減二升。去上沫。納諸藥煮取三升。去渣。溫服一升。覆取微似汗。不須啜粥。已能發汗矣

餘如桂枝法。將息及禁忌。

太陽病。項背強几几。無汗惡風。葛根湯主之。

前桂枝加葛根湯一條。其現症亦同。但彼云反汗出故無麻黃也。陽明症汗出而惡熱。今無汗而

惡風則未全入陽明。故曰太陽病。

按葛根本草治身大熱乃陽明之証也。以太陽將入陽明之經。故加此藥。

太陽與陽明合病者。必自下利。葛根湯主之。

葛根黃芩黃連湯

半助

葛根

二兩

甘草

二兩

黃芩

三兩

黃連

三兩

渣分溫再服。

葛根湯原方加半夏半斤。先煎服法同。

右四味以水八升先煮葛根減二升。約諸藥煮取二升。去

太陽病桂枝症。

桂枝症即太陽傷風之正病也。醫反下之。誤利遂不止。

邪下陷則利無止時。脉促者。表未解也。

促有數意。邪猶在外尚未陷入三陰而見

太陽與陽明合病。不下利。

前條因下利而知太陽陽明合病。今既不下利。則合病何從而

知。必湏從而經本症一一對勘。即不下利而亦可定為合病矣。

但嘔者葛根加芩連治利因其本屬桂枝症而脉促故止加葛根一味以解陽

半夏湯主之。

前條太陽誤下而成利。則用芩連治利。因其本屬桂枝症而脉促故止加葛根一味。以解陽明合病。故用葛根湯全方。因其但嘔加半夏一味。以止嘔。隨病

之。芩連甘草為治病之主藥。

葛根湯全方。因其但嘔加半夏一味。以止嘔。隨病

立方各
有法度

葛根加半夏湯

三

葛根

半助

半夏

半助

葛根湯類四

柴胡湯類四

小柴胡湯一

柴胡

半助

黃芩

二兩

人參

二兩

甘草

炙

生薑

各三

半夏

半助

大棗

十二

右七味以水一斗二升煮

柴胡

半助

黃芩

二兩

人參

二兩

生薑

二兩

半夏

半助

大棗

十二

右七味以水一斗二升煮

柴胡

半助

黃芩

二兩

人參

二兩

生薑

二兩

半夏

半助

大棗

十二

右七味以水一斗二升煮

柴胡

半助

黃芩

二兩

人參

二兩

生薑

二兩

半夏

半助

大棗

十二

右七味以水一斗二升煮

柴胡

半助

黃芩

二兩

人參

二兩

生薑

二兩

半夏

半助

大棗

十二

右七味以水一斗二升煮

柴胡

半助

黃芩

二兩

人參

二兩

生薑

二兩

半夏

半助

大棗

十二

右七味以水一斗二升煮

柴胡

半助

黃芩

二兩

人參

二兩

生薑

二兩

半夏

半助

大棗

十二

右七味以水一斗二升煮

柴胡

半助

黃芩

二兩

人參

二兩

生薑

二兩

半夏

半助

大棗

十二

右七味以水一斗二升煮

柴胡

半助

黃芩

二兩

人參

二兩

生薑

二兩

半夏

半助

大棗

十二

不
煩
不必用半夏
人參

加
括
薑
實

除
胸
病

此
治

若
渴
者

去
半
夏

即
能
耗
津
液

加
人
參

生
津
液

加
人
參

脾
胃
加

人
參

合
前
人
參

人
參

成
四
兩
半
括
薑
根
四
兩
湯
治
消
若
腹
中
痛
者
去
黃
芩
寒
加
芍
藥
三
兩
利
小
便
若
腸
中
痞
硬
去
大
棗
味
與
生
薑
加
乾
薑
政
加
五
味
子

牡
蠣
四
兩
別
錄
云
治
症
下
痞
熱
若
心
下
悸
小
便
不
利
者
去
黃
芩
加
茯
苓
四
兩
利
小
便
若
不
渴
外
有
微
熱
去
人
參
不
渴

半
升
乾
薑
二
兩
古
方
治
嗽
五
味
甘
薑
必
同
用
一
以
散
寒
邪
一
以
散
正
氣
從
無
單
用
五
味
治
嗽
之
法
後
人
多
能
深
求
其
義
則
變
化
心
生
矣
論
中
凡
可
通
用
之
方
必
有
加
減
法

傷
寒
五
六
日
正
當
傳
少
陽
之
期

中
風
往
來
寒
熱
寒
往
來
者
寒
已
而
熱
熱
已
而
寒
也

胸
脇
苦
滿

胸
脇
為
少
陽
之
意

默
默
不
欲
飲

食

飲
木
邪
心
煩
喜
嘔

木
氣
上
逆

或
胸
中
煩
而
不
嘔

少
陽

或
腹
中
痛

木
土

或
脇
下
痞

硬

填
鬱

或
心
下
悸

有
痰

血
弱

氣
盡
腠
理
開
邪
氣
因
入
與
正
氣
相
搏
結
於
脇
下
正
邪
分
爭
往
來
寒
熱
休
作
有
時
默
默
不
欲
飲

食

未
盡

或
欲
者

肺
有
留
飲

此
湯
主
之

少
陽
所
現
之
症

甚
多
柴
胡
湯
所
治

之
症

亦
不
加
減
法

具
柴
胡
湯
方
末

意
可
推
而
知
矣

服
柴
胡
湯
已
渴
者
屬
陽
明
也
以
法
治
之

湯
服
後
而
渴
則
轉
屬
陽
明
矣

此
是
太
陽
陽
明
相
為
出
入

一
凡
柴
胡
湯
證
而
下
之

誤
若
柴
胡
證
不
罷
者

復
與
柴
胡

治
不
可

兼
治
矣

他
証
可
據
難
有

本
証
可
兼
治

不
獨
柴
胡
証
也

脉
弦
法
當
腹
中
急
痛
先
與
小
建
中
湯
不
差
者
與
小
柴
胡
湯
主
之

詳
見
桂
枝
類
中

傷
寒
中
風
有
柴
胡
症
但
見
一
證

便
是
不
必
悉
具
少
陽
與
太
陽
陽
明
相
為
出
入

一
凡
柴
胡
湯
證
而
下
之

治
不
可

接
難
有

本
証
可
據
難
有

他
証
可
據
難
有

本
証
可
據
難
有

本
証
可
據
難
有

本
証
可
據
難
有

本
証
可
據
難
有

本
証
可
據
難
有

本
証
可
據
難
有

本
証
可
據
難
有

湯
凡
誤
治
而
本
証
可
據
難
有

他
經
盡
同
不
獨
柴
胡
証
也

必
蒸
蒸
而
振
却
發
熱
汗
出
而
解

脉
法
篇
云
戰
而
汗
出
者

此
少
陽
之
方
始
發
熱
汗
出

仍
從
少
陽
而
出

傷
寒
十
三
日
不
解

過
經
二
候
的
病

胸
脇
滿
而
嘔

日
晡
所
發

潮
熱
者

以
湯
利
之
不
應
復
以
利
病
亂

九
藥
利
之
是
為
重
傷

實也。先宜小柴胡湯以解外。

雖潮熱本屬少陽之邪故仍以柴胡解外

後以柴胡加芒硝湯主之。

解在後加芒硝湯下

傷寒五六日頭

出微惡寒。手足冷。心下滿。口不欲食。大便硬。脈細者。

此為陽微結。陽氣不能隨經而散

故鬱結不舒。非必

有表復有理也。

以上諸症有表有理

柴胡湯兼治表裡

脉沈亦在裡也。

脉沈為裡。脉雖沈緊。細即有

外證。陰則無汗。此為半在裡半在表也。

汗出為表。脉沈為裡。汗出為陽微

以汗為微。假令純陰結不得復有

不得為少陰病。所以然者陰不得有汗。此

要訣。舌胎白雖不大便。

通小便自可。則裏症未具。又胸膈嘔

滿則邪留少陽。無疑用此方和解之。

此所以諸症得之皆愈也。按少陽之外為太陽裏為陽明者內中見少陽一症即可用小柴胡湯。

陽明病發潮熱。大便溏。小便自可。胸膈滿而不去者。

小柴胡湯主之。陽明潮熱乃當

下之症。因大便

陽明病。腸下硬滿少陽症。不大便可而嘔亦少陽症。舌上白胎者。邪未結

此所以下此要訣也。

按少陽之外為太陽裏為陽明者內中見少陽一症即可用小柴胡湯。

陽明病。但浮無餘症者與麻黃湯。

二條明陽明中風之症。有裏邪用小柴胡。無裏邪則用

風脉弦浮大。弦屬少陽。浮

大屬陽明

而短氣腹都滿。腸下及心痛。

此少陰久按之氣不通。鼻乾不得汗。嗜卧。似少陰一

身面目悉黃。小便難似太陽。

又有潮熱。此似耳前後腫刺之小差。外不解。病過十日。

脉續浮者與小柴胡

論中陽篇中云陽明病不能攻其熱。必嗽。所以然者。微喘也。又云大

胡湯。脉浮雖有裏症。

胡邪仍欲外出。此為傳經。腸下硬滿乾嘔不能食。住來寒熱。

以上皆少陽者。此邪也。

尚未吐下。脉沉緊者。未吐下不經誤治也。

本太陽病不解轉入

本太陽病不解。轉入

陽病。十日以去。脉浮細而嗜卧者。外已解也。設胸滿腸痛者與小柴胡湯。

解見麻黃湯。黃湯。

傷寒差以後。更發熱者。

小柴胡主之。此復症也。非勞復。非女勞復。乃正氣不充。餘邪未盡。留在半表半裡。

之間故亦用小柴胡復病治法。明著於此。後世議論不一。皆非正治。

太

脉浮者以汗解之。脉沉實者以下解之。復症之中更當考此二脉。如果脉見浮數則邪留太陽當用汗法。之法不一。醫者於麻黃桂枝及承氣大柴胡等方對症之輕重擇而用之。則無不中病矣。

婦人中風七八日續得寒熱發作有時。謂如瘧也。

又

適斷者此為熱入血室。其血未結。血因熱結而成瘀矣。故使如瘧狀發作有時。

經水

云婦人中風發熱惡寒。經水適來。彼云斷得之七八日熱除而脉遲身涼。

外邪胸脇下滿如結胸狀。讖語

此云來得之七八日熱除而脉遲身涼。血室為中焦營氣之所聚。肝藏血心主血。榮血結

見沈實則裏邪未盡當用下法。但汗下不著方名者因汗下第

二肋端去乳頭約四寸。肝募也。厥陰陰維之會刺入四分。血結則為有形之症。湯劑一時難效。刺期門以溫厥陰。有餘之熱則尤親切而易散。

又云婦人傷寒發熱經水適來

畫日明了。暮則讖語。如見鬼狀者。此為熱入血室。屬陰病在陰經也。

又云婦人傷寒發熱經水適來

燒氣之疾。汗下二法皆非所宜。小柴胡湯刺期門則其治也。

又云婦人傷寒發熱經水適來

狀此二條為最詳。婦人傷寒此症最多。前條症稍輕後二條尤重。男子亦有之。

大柴胡湯半斤半夏半斤黃芩三兩芍藥三兩

生薑五兩枳實四枚大棗十二枚

右七味以水一斗二升。

煮取六升。再煎取三升。溫服一升。日三服。

此方本有大黃二兩。王叔和云若不加大黃恐不為大柴

胡也。太陽病過經十餘日。反二三下之。一誤後二三日柴胡症仍在者。

如寒熱嘔

先與小柴胡湯嘔

不止。心下急鬱鬱微煩者。猶有未解也。與大柴胡湯下之則愈。

前雖已下非下法也。

熱結在裡。此大黃之對症。復往來寒熱。此柴胡與大柴胡湯。

之對症。

後後者過經之後諸症。

脈沈沈者內實也。

在裏下解之宜大柴胡湯。

柴胡加桂枝湯半夏大黃

實半夏大黃

方乃大陽少陽合病之方

此小柴胡與桂枝湯併為一

柴胡四兩黃芩人參桂枝芍藥生薑各一兩半夏二合甘草一兩大棗六枚右九味。

水七升。煮取三升。去滓溫服一升。

傷寒六七日發熱微惡寒。支節疼痛。以上太微嘔心下支結。以上少外症未去者。外症為外症。柴胡桂枝湯主之。發汗多亡陽譴語者。此亡陽之輕者也。不可下。勿誤以為有燥屎。陽症。二湯合用之功效而陽亡可復矣。

柴胡加龍骨牡蠣湯

四

柴胡 龍骨

生薑

人參

茯苓

鉛丹

黃芩

牡礪

桂枝各一
桂枝兩半

半夏二合

大棗六枚

大黃二兩

右十二味以水八升煮取四升納大黃更煮一二沸。大黃只煮一沸。二沸取其生

利而去滓溫服一升。

傷寒八九日下之。

即陷胸滿

柴胡煩驚。龍骨牡蠣小便不利。

大黃小便不利。身盡重不能轉側者。

此湯主之。大黃只煮一

此乃正氣虛耗已入裏而復外擾三陽故現症錯雜藥亦隨症施治。

真神化無方者也。按此方能下肝膽之驚痰以之治癲癇必效。

柴胡桂枝乾薑湯五

柴胡半斤桂枝三兩乾薑

牡礪熬

甘草

各二兩黃芩三兩

梔子根

右七味以水一斗二升煮

取六升去渣再煎取三升溫服一升。日三服初服微煩復服汗出便愈。

邪氣已深一時不能即出如蒸

蒸而振發熱汗出而解之類

傷寒五六日已發汗而復下之。

一誤胸脇滿屬微結小便不利渴。以上皆少陽症。

渴故用梔子根而不出汗。故去半夏生薑但頭

汗出。

陽氣上逆往來寒熱。

用柴胡心下煩者。柴胡此為末解也。柴胡桂枝乾薑湯主之。

柴胡加芒硝湯六

柴胡六錢十黃芩

硝分兩各不同

柴胡湯原方加芒硝

甘草

人參 生薑各一

半夏二十

大棗四十

芒硝二兩

右八味以水四升煮取二升去渣納芒硝更者微沸分溫再服不解更作。

不解不大便也

此藥劑之最輕者以

水四升煮取二升去渣納芒硝更者微沸分溫再服不解更作。

不解不大便也

此藥劑之最輕者以

加芒硝

及合用調胃承氣也

皆少陽陽明同治之方

柴胡湯

太陽症

柴胡桂枝湯主

外症為外症

柴胡桂枝湯主

傷寒十三日不解。胸脇滿而嘔。日晡所發潮熱已而微利。此本柴胡證下之而不得利。今反利者。知醫以丸藥下之。非其治也。潮熱者實也。先宜小柴胡湯以解外。後以此柴胡加芒硝湯主之。本草柴胡硝治六府積聚。因其利而復下之。
所謂通因通用之法也。潮熱而利則邪。不併結故較之。大柴胡症用藥稍輕邪。

梔子湯類五

梔子豉湯一

梔子枝十四 香豉綿四合

右二味水四升。先煮梔子得二升半。納豉煮取升半。去滓。分為二服。溫進一

服。得吐止後服。

此劑分兩上焦之藥皆然。

發汗吐下後。諸濁俱用。未必皆

誤而正氣已傷矣。寫病狀何等詳切。凡醫者之於病人。必事體貼。如若身受之。而後用藥無誤。

者。必反覆顛倒心中懊惓。

反覆顛倒身不得靈也。邪因正氣不充。留於上焦。故陽氣擾動而不得眠也。

心中小懊惓心不得安也。

梔子豉湯吐之。此非汗下之所能除者。吐之而痰涎結

盡。則不在經。而在肺胃之間。為有形之物。故必吐而出之。

反覆顛倒心中懊惓。摩

摩。發汗若下之。而煩熱胸

中室者。煩熱且室較前虛

煩等象為稍寢

梔子豉湯主之。

傷寒五六日。大下之後。誤身熱不去。心中結痛者。欲未解也。

內外不失毫釐。即上下亦不踰分寸也。

以上皆陽明本症。

外之邪俱未解。結痛更甚於室矣。

梔子豉湯主之。

按胸中室結痛。何以不用小陷胸。蓋小陷胸症乃心下痛。胸中在心之

非因誤治而得者。

陽明病。脉浮而緊。咽噪口苦。胸滿而喘。發熱汗出。不惡寒反惡

熱。身重。以上皆陽明本症。

意若下之。則胃中空虛。客氣動膈。心中懊惓。以前因用三法未必合度。表邪

之。若下之。則陽明病下之。其外有熱。未盡。舌苔如

吐法。否則邪尚未可吐也。

恐無物可吐也。

梔子豉湯主之。

陽明病。脉浮而緊。咽噪口苦。胸滿而喘。發熱汗出。不惡寒反惡

熱。身重。以上皆陽明本症。

意若下之。則陽明病下之。其外有熱。未盡。舌苔如

吐法。否則邪尚未可吐也。

梔子豉湯主之。

但頭汗出。陽邪在上。

欲洩不洩。梔子豉湯主之。

下利後更煩。按之心下濡者。濡者濕滯之象。

為虛煩也。宜

梔子豉湯。

停結食。停結但

頭汗出。陽邪在上。

欲洩不洩。梔子豉湯主之。