

本草求真卷六 第十一冊

3

瀉熱內經帝曰人傷於

氣不宣通濕氣內結中

知熱之由作悉皆外邪

為邪所遏一步一步而

然不乘勢以除則熱而

人有用三黃石膏及

之謂余按熱病用瀉

在肺則止以黃芩知

黃林硝在止則止用以

則止用以青黛龍膽在

脾則止用以石斛白芍



在肺又有他劑以瀉蓋以熱邪初成未盛則或用
 以百合百部馬兜鈴毒氣兼見則或用沙參脚氣兼見則或
 牛勞子久嗽肺癆則或用以沙參脚氣兼見則或
 用以薏苡仁咽瘡痔漏則或用以沙參脚氣兼見則或
 氣攻則或用以牽牛三焦熱併則或用以柿乾楠霜熱挾
 渴而嘔則或用以竹茹熱而有痰則或用以貝母
 熱而氣逆不舒則或用以青木香熱而溺閉則或
 用以車前石菖久嗽兼脫則或用以五倍子百草
 煎乳水不通則或用以通草若更兼有血熱則又
 當用生地紫菀此瀉肺熱之大概也在胃又有他
 劑以瀉蓋以熱兼血燥犀角宜矣毒盛熱熾綠豆
 宜矣中虛煩起梗米宜矣暑熱渴生西瓜宜矣時
 行不正貫眾宜矣疫熱毒盛人中黃金汁雪水宜
 矣咽瘡痔漏柿蒂柿乾宜矣便結不軟玄明粉宜
 矣乳癰便閉漏蘆宜矣腸毒不消雷丸宜矣熱盛
 呃逆竹茹蘆根宜矣腸毒不消白頭翁刺蝟皮宜
 矣口渴不止竹葉宜矣若更兼有血熱則又宜於
 地榆槐角槐花蘇木三漆乾漆此瀉胃熱之大概

瀉大腸
熱

瀉心熱

也而大腸熱結仍不外乎硝黃白頭翁黃芩綠豆
蝸牛生地之藥矣在心又有他劑以瀉則或因其
溺閉而用瞿麥木通氣逆而用赭石痰閉而用貝
母天竺黃暑渴而用西瓜精遺而用連鬚抽掣而
用鉤藤咳嗽而用百合疝瘕而用川練與夫血熱
而更用以犀角射干童便血餘紅花辰砂紫草生
地鬱金桃仁茜草蘇木丹參沒藥蓮藕益母草熊
膽等藥又可按味以瀉則如肝經氣逆宜用赭石以
在肝又有他劑以瀉則如肝經氣逆宜用赭石以
鎮之腎氣不固則用石南葉以堅之溺閉不通則
用車前子以導之痰閉不醒則用牛黃以開之目
翳不明則用秦皮空青蒙花石燕青箱子石決明
以治之咳嗽痰逆則用全胡以降之壅積不消則
用蘆薈以殺之濕鬱驚恐宜用琥珀以鎮之神志
昏冒宜用棗仁以清之若使熱在於血其藥衆多
大約入肝以血則有赤芍赭石蒲公英青魚膽紅
花地榆槐花槐角側柏葉卷柏無名異凌霄花猪
尾血紫草夜明砂兔肉旱蓮草茅根蛇山甲琥

胃肝熱

瀉膽熱

瀉脾熱

熱瀉脾脫

珀芙蓉茂苦酒熊膽之類入肝破血則有莪朮紫
 貝靈芝紫參益母草蒲黃血竭蓮藕古又錢皂礬
 歸尾鱉甲貫衆茜草桃仁之類入肝敗血則有三
 漆蠱虫廬虫螞蟥瓦楞子水蛭花蕊香之類皆當
 審實以投此瀉肝熱之大槪也而瀉膽熱之味又
 豈有外空青銅綠銅青熊膽礬礬前胡等藥者乎
 在腎又有他劑以瀉如龍膽防已為腎熱盛溺閉
 者所宜用也秋石為腎熱盛虛咳嗽溺閉者所必
 用也寒水石為腎熱盛口渴水腫者所必用也地
 骨皮為腎熱盛有汗骨蒸者所必用也食塩為腎
 熱盛便閉者所必用也琥珀海石為腎熱盛血痰
 溺秘者所必用也若使熱在於血則藥亦不出乎
 童便地骨皮血餘銀柴胡蒲公英英生牛膝旱蓮草
 赤石脂自然銅古文錢青龍之類而瀉脾脫熱結
 其用猪苓澤瀉地膚子茵陳黃蘗黃芩龍膽川練
 子藥者又可按其症治以考求矣此瀉腎熱之大
 概也脾熱瀉藥無多惟有脾經血熱考書有用郁
 李射干紫貝薑黃蓮藕皂礬蚯蚓然亦須辨藥症

以治要之治。病用藥須當分其臟腑。然其是上。是下。毫微之處。未可盡拘。如藥既入於肺者。未有不入於心。入於肝者。未有不入於脾。入於腎者。未有不入於膀胱。且藥氣質輕清者。上浮。重濁者。下降。豈有浮左而不浮右。重此而不重彼者乎。但於形色氣味。重處比較明確。則藥自有圓通之趣。又奚必拘拘於毫茫間。互為較衡。而致踳其神智者乎。

牽牛

蔓草

牽牛

入肺兼入大小腸

有白有黑。白者其性入肺。耑於上。

焦氣分除其濕熱。故氣逆壅滯。及大腸風秘者。得此以治。黑者其性兼入右腎。能於下焦通其遏鬱。故腫滿脚氣。及大小便秘。俱得以治。但下焦血分。

入肺濕
氣分濕

濕熱濕自下受。宜用苦寒以折。牽牛氣味辛辣。大
嚼雄烈。服之最能泄肺。若以下焦血病而於氣分
有損之藥。以為投治。是以血病瀉氣。不使氣血俱
損乎。杲曰。牽牛少則動大便。多則泄下如水。乃瀉
氣之味。其味辛辣。久嚼猛烈。雄壯。所謂苦寒
安在哉。故腫受濕氣。不得施化。致大小便不通。斯
宜用之。若濕從下受。下焦主血。血中之濕。宜苦寒
之味。反以辛藥。惟是水氣在肺。喘滿腫脹等症。暫
泄之。傷人元氣。用以為開泄。俾氣自上達下。而使二便頓開。以快
一時。時珍曰。一宗室大人。年幾六十。平生苦腸結
病旬日。一行甚於生產。服養血潤劑。則泥膈
不快。服硝黃通和藥。則若罔知。如此三十餘年矣。
時珍診其人體肥膏粱。而多憂鬱。日吐酸鹹盈盆。

許乃寬又多火病此乃三焦之氣壅滯有升無降
津液胃化為痰飲不能下滋臟腑非血燥比也潤
劑留滯硝黃徒入血分不能通氣俱為痰阻故無
效也乃用牽牛末皂莢膏丸與服即便通利自是
但覺腸結一服就順亦若果下焦虛腫虛字還當
不妨食且復精爽也

佐以沉香補骨脂等味以為調補俾補瀉兼施而

無偏啖損泄之害矣時珍曰外甥柳喬素多酒色

坐臥立哭呻吟者七晝夜醫用通利藥不效遣人

叩予予思此乃濕熱之邪在精道壅脹隧路病在

二陰之間故前阻小便後阻大便病不在太陽膀

胱也乃用揀實茴香穿山甲諸藥入牽牛加倍水

煎服一服而取子淘去浮者春去皮得水香乾薑

減三服而平

良

大黃

音七
毒草

大黃

崑入
脾胃

大苦大寒。性沉不降。用走不守。入陽

明胃府大腸大瀉陽邪內結宿食不消。

三承氣湯
皆有大黃

內入仲景治傷寒邪由太陽而入陽明之府者。則

用調胃承氣。取其內有甘草之緩。不令有傷胃府

之意也。治邪由陽明之經直入陽明之府者。則用

大承氣。取其其中有枳實之急。得以破氣氣之壅也。

治邪由少陽之經而入陽明之府者。則用小承氣。故

氣取其無芒硝之鹹。致令泄下以傷其胃也。故

凡傷寒邪入胃府。而見曰晡潮熱。陽明旺。譫語。班

狂。便秘硬痛。手不可近。喜按屬虛。及瘟熱瘴瘧。下

痢赤白。腹痛裡急。黃疸水腫。積聚。留飲宿食。心腹

入胃
熱攻滯

痞滿二便不通與熱結血分一切癥瘕血燥血秘

實熱等症用此皆能推陳致新定亂致治故昔人

云有將軍之號涉無已曰熱滯所勝以苦泄之大

胃然苦則傷氣寒則傷胃下則亡陰故必邪熱實

結宿食不下用之得宜宗奭曰有是證者用之無

須曰梁武帝因發熱欲服大黃姚僧坦曰大黃乃

是劫藥至尊年高不可輕用帝勿從幾至委頓梁

武帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通

僧坦曰脈洪而實此有宿妨非用大黃無瘥理帝

從之遂愈今醫用一毒藥而攻眾病偶中若使病
便謂之神不中不語用藥之失可不戒哉
在上腕雖或宿食不消及見發熱只須枳實黃連

以消痞熱宿食自通若誤用大黃推蕩不下反致

熱結不消爲害不淺時珍曰大黃病在五經血分

謂誅伐無過瀉心湯有大黃治心氣不足吐血衄

血者乃真心之氣不足而心包肝脾胃之邪火有

餘也雖曰瀉心實瀉四經血中之伏火也又仲景

治心下痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯主之

此亦瀉脾胃之濕熱非瀉心也病發於陰而反下

之則作痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結於上焦胃

之所致爲痞滿又曰濁氣在上則生填脹是也病發

於陽而反下之則成結胸乃熱邪陷入血分亦在

上腕分野仲景大陷胸丸皆用大黃亦瀉脾胃血

分邪而降其濁氣也若結胸在氣分則只用小

陷胸湯痞滿在氣分則用半夏瀉心湯足矣或曰

心氣不足而吐衄何以不用補心而反瀉心震亨

曰心陰不足肺與肝俱各受火而病作故黃芩救

之沉案

不可下

肺黃連救肝。肺者陰之主。肝者心之母。血之合也。肝肺之火既退。則陰復其舊矣。仲景傷寒論云。太陽病外症未解。不可下。脈浮大。不可下。惡寒不可下。嘔多。有陽明症。不可下。陽明病。不能食。攻其熱必嘔。陽明病。應汗。反下之。此為大逆。太陽陽明合病。喘而胸滿。不可下。少陰病。陽虛尺脈弱者。不可下。脈數。不可下。惡水者。不可下。頭痛目黃者。不可下。虛家不可下。陽微不可下。諸四逆厥者。不可下。況先輩立藥治病。原有成則。如大黃芒硝。則瀉腸胃之燥熱。牽牛甘遂。則瀉腸胃之濕熱。巴豆硫黃。則瀉胃之寒結也。雖其所通則一。而性實有不同。當為分視。至於老人虛秘。腹脹少食。婦人血枯。陰虛寒熱。脾氣痞積。腎虛動氣。及陰疸色白不起等。

症不可妄用、以取虛虛之禍、川產錦紋者良、生用

峻、熟用純、忌進穀食、得穀食不能通利、黃芩為使、

連翹 音七 濕草

連翹 崑入 味苦微寒、質輕而浮、書雖載瀉六經鬱

火、然其輕清氣浮、實為瀉心要劑、連翹形像似心、

為火主、心清則諸臟與之皆清矣、然濕熱不除、病

症百出、是以癰毒、五淋、寒熱、鼠疫、瘰癧、惡瘡、熱結

蠱毒等症、書載皆能以治、汪昂曰、凡癰而痛者為實邪、腫而不痛為虛邪、

腫而赤者為熱結、腫而不結者為留氣痰飲、而且經有言、諸痛瘡瘍皆屬

知 癰症當 解心經 熱邪

心火連翹實為瘡家聖藥也。然多用胃虛食少脾胃不足者慎之。況清而無補。癰疽潰後勿服。火熱由於虛者忌投。

前胡

音三
山草

前胡

端入
肝膽

味苦微寒。功端下氣。凡因風入肝膽火

盛痰結。暨氣實哮喘。

氣有餘
便是火

咳嗽嘔逆。痞膈藿亂。

及小兒疳氣等症。升藥難投。須當用此苦泄。俾邪

去正復。不似柴胡性主上升。引邪外出。而無實痰

實氣固結於其中也。按二胡均是風藥。一升一降。

降肝膽
外感風
邪痰火
實結

用各不同。若使兼有外感風邪，與痰火實結，而用柴胡上升，不亦如火益熱乎？故必用此下降。但症外感絕少，祇屬陰虛火動，並氣不歸元，胸脇逆滿者，切忌。泄以其苦，故也。皮白肉黑，味甘氣香者良。半夏為使，惡皂莢，忌火。今有劑片以混，當歸片料可恨。

白微 音古 山草

白微 音古 入肺 味苦而鹹，性寒無毒。凡人陰虛火動，則

內熱生風，火氣焚灼，身體壯熱，支滿痰湧，忽不知人，與夫汗出血厥，酸痛淋閉，其在婦人，則或廷孔

熱 濕肺燥

鬱結廷孔婦人神無所依而見淋露不淨並血枯

熱勝而見虛煩上嘔非不用此苦泄鹹降利水使

陰氣自上而下則熱何由泄乎是以金匱安中益

氣竹皮丸用此以治婦人產中虛煩嘔逆經疏云

經種子往往用之益不孕緣於血熱而少其源起於真陰不足陽勝而內熱故營血日枯也益陰清

熱則自生旺而有子矣須佐以歸地芍藥杜仲菴蓉等藥千金萎蕤湯用此以

治風溫身熱汗出身重又有白微芍藥湯以治婦

人遺尿白微芍藥等分酒調服不拘胎前產後皆能補陰平

陽而兼行肺以清膀胱上源並非虛寒不禁之比

本草求真 卷六 瀉熱白微

也。但胃虛泄瀉。陽氣外越者。禁用。似牛膝而短小柔軟。去鬚酒洗用。惡大黃、大戟、山茱、薑、棗。

白欬

音七五
蔓草

白蘇

耑入
肝脾

敷腫瘡瘍。清熱解毒。散結止痛。久為外科所用要藥。然目赤驚癇。溫瘧陰腫。滯下淋濁。失

精。金瘡失血。凡因濕熱濕毒而成者。何一不可以

為內科之用。如金匱薯蕷丸。用此以解風氣百疾。

蘊蓄。

張璐曰。其湯全以桂枝湯和營散邪。合理中湯兼理藥誤。君以薯蕷。大理脾肺。毫不及乎

散肝脾
濕熱內
結

補益
腎肝。文書載同地膚子。則可以治淋濁失精。同白