

醫統正脈全書

六九

鉤金

元匱

金匱鉤玄目錄

卷第一

中風

六鬱

癰

寒

傷寒

暑

注夏

暑風

濕

內傷

火

傷風

發斑

疹

溫病

瘧

咳嗽

痰

喘

哮

痢

禁口痢

泄瀉

脾泄

霍亂

乾霍亂

嘔吐

惡心

翻胃

傷食

痞

噯氣

吞酸

嘈雜

五疸

消渴泄瀉

水腫

鼓脹

自汗

盜汗

吃逆

頭風

頭痛

頭眩

眩暈

眉痛

耳聾

卷第二

心痛

腰疼

脇痛

腹痛

痛風

勞瘵

咳血

嘔血

咯血

衄血

溺血

下血

腸風

夢遺

精滑

濁

淋

小便不通

關格

小便不禁

癰

健忘

怔忡

驚悸

疰

血塊

吐蟲

癥瘕

疝

脚氣

痿

發熱

陽虛惡寒

手心熱

手麻

手木

厥

面寒面熱

喉痺

纏喉風

咽喉生瘡

口瘡

酒查鼻

肺癰

肺痿

天庖瘡

漏瘡

痔瘡

腸癰

結核

脫肛

卷第三

婦人科

經水

血崩

帶下赤白

白帶并痛風

子嗣

胎前

胎動

惡阻

束胎

安胎

胎漏

子腫

難產

催生方

產後

血暈

補虛

消血塊

泄

惡露不盡

中風

發熱惡寒

小兒科

吐瀉黃疸

急慢驚風

疳病

痘瘡

腹脹

夜啼

口糜

脫囊

脫肛

木舌

癰疹

咯紅

喫泥

痢疾食積

解顱

虬蟲

口噤

風痰

癰頭

赤瘤

鼻赤

金匱鉤玄卷一

江陰朱氏校刊本

元 丹溪朱震亨著 門人戴元禮錄

中風

大率主血虛有痰以治痰爲先或虛挾火與濕亦有
死血留滯者外中於風者亦有中氣者當從痰治順
氣化痰若口開手撒眼合遺尿吐沫直視喉如鼾睡
肉脫筋痛者皆不治

半身不遂大率多痰在左屬死血無血在右屬痰有
熱氣虛

病若在左者四物湯等加桃仁紅花竹瀝薑汁在右者二陳湯四君子等加竹瀝薑汁

痰壅盛者口眼喎斜者不能言者皆當吐

吐法輕用瓜蒂鯁汁皂角重用藜蘆半錢或三分加麝香灌入鼻內或口內吐痰出一吐不已再吐之亦有虛而不可吐者

氣虛卒倒參芪補之

氣虛有痰濃參湯合竹瀝薑汁

血虛宜四物湯俱用薑汁炒恐泥痰再加竹瀝薑汁

人內服能食者去竹瀝加荆瀝

又法以猪牙皂角白礬等分爲末薑湯調下名稀涎散

血虛者四物湯補之 挾痰者亦用薑汁竹瀝

脈訣內言諸不治證見則不可治筋枯者不治舉動則筋痛者是筋枯以其無血滋潤故也

治痰氣實能食用荆瀝 氣虛少食用竹瀝

此二味用開經絡行血氣入四物湯中必用薑汁助之

肥白人多濕少用附子烏頭行經

初昏倒急掐人中至醒然後用去痰藥二陳湯四物
四君子等湯加減用

六鬱

戴云鬱者結聚而不得發越也當升者不得升當降
者不得降當變化者不得變化也此爲傳化失當六
鬱之病見矣氣鬱者胸脇痛脈沉澁濕鬱者周身走
痛或關節痛遇陰寒則發脈沉細痰鬱者動則卽喘
寸口脈沉滑熱鬱者脬小便赤脈沉數血鬱者四肢

無力能食便紅脈沉食鬱者噯酸腹飽不能食人迎脈平和氣口脈緊盛者是也

氣血中和萬病不生一有怫鬱諸病生焉

氣鬱

香附子

蒼朮

川芎

濕

蒼朮

川芎

白芷

痰

海石

香附

南星

瓜蒌

熱

青黛

香附

蒼朮

川芎

梔子

血

桃仁

紅花

青黛

川芎

香附

食

蒼朮

香附

鍼沙

醋炒

山查

神麴

炒

春加芎

夏加苦參

秋冬加吳茱萸

起鞠丸

解諸鬱

又名芎朮丸

蒼朮

香附

撫芎

神麴

梔子

各等分

爲末水丸如菉豆大

凡鬱皆在中焦以蒼朮撫芎開提其氣以升之假如

食在氣上提其氣則食自降餘皆倣此

癩

大風病是受得天地間殺物之氣古人謂之癘風者以其酷烈暴悍可畏耳人得之者須分在上在下夫在上者以醉仙散取涎血於齒縫中出在下者以通天散取惡物陳蟲於穀道中取出雖有道路之異然皆不外乎陽明一經治此證者須知此意看其疙痞與瘡上先見者上體多者在上也下先見者下體多者在下也上下同得者在上復在下也陽明胃經

與大腸無物不受此風之入人也氣受之則在上多血受之則在下多血氣俱受之者上下俱多也自非醫者神手病者鐵心罕有免此夫從上從下以漸而來者皆可治人見其病勢之緩多忽之雖按法施治病已痊可若不能忌口絕色皆不免再發發則終於不能救也余曾治五人中間惟一婦人不再發以其貧甚而且寡無物可喫也餘四人三四年後皆再發孫真人云吾嘗治四五十人終無一人免於死非真人不能治蓋無一人能守禁忌耳此婦人本病藥外

又服百餘貼加減四物湯半年之上方得經行十分
安愈

治法 在上者醉仙散在下者通天再造散後用通神
散及三稜鍼於委中出血但不能忌口絕房者不治
之也

醉仙散

胡麻仁

牛蒡子

蔓荊子

枸杞子

各半

兩爲粗末
同炒紫色

白蒺藜

苦參

瓜蒌根

防風
各半兩

右八味爲細末每一兩半入輕粉三錢拌勻大人一錢空心日午臨睡各一服淡茶調下五七日間必於齒縫中出臭涎水渾身覺痛昏悶如醉利下惡臭屎爲度量大小虛實加減與之證候重而急者須以再造散下之候補養得還復與此藥喫須斷鹽醬醋諸般魚肉椒料果子燒炙等物止可淡粥及淡煮熟時菜食之茄尙不可食惟有烏稍蛇菜花蛇可以淡酒煮熟食之以助藥力

再造散