



醫方易簡新編卷二目錄

治婦女各症癥瘕辨論並方胎前產後各症臨產要方產後用性賦湯

室女經閉

經水不通

又方

又方

又方

又方

月經久閉

月經不調

又方

經閉驗胎

月信澀滯

經行不止

又方

經時腹痛

又方

經後腹痛

先期行經各症

後期行經

乾血氣痛

又方

婦人血厥

婦人血結

婦人血癖作痛

婦人血暈

婦人血風

老婦行經

經閉容枯

月經久閉逆行

婦人肌熱

調經酒

丹參散

婦人血崩

又方

崩漏不止及赤白帶下

赤白帶下

赤白帶年久不止

白帶白淫

白帶

血淋

調經奇驗

憂悲嘔血

遺溺

陰痒

又方

陰腫

陰痛

爛脚

纏脚生瘡

交媾非時血出不止

肥胖不孕

瘦弱不孕

經閉乾血癆等症神方

又方

妻妾生妬

年久無子

又方

婦女陰吹

婦女夜夢鬼交

陰挺

陰痔

女人臟燥

女人腸葦

女人石瘕

婦人胃漕吐水

婦人血黃

老年倒經

婦人乳癰

下血血崩

經血俱崩

血痢血崩

崩中腹痛

崩中垂死

崩中痢下

白淫

婦人白濁

血逆血厥

毓麟珠種子方

無極丸

養脂丸

陰戶生蟲

陰戶邊生瘡

婦人黃疽

女癆黑疽

婦人髮少能多

頭生白屑

婦人疝痛

種子良方

疔腫乳癰

陰毛蟲痒

癥瘕辨論並方

食癥

五君子煎

五物煎

暖肝煎

解肝煎

排氣飲

烏藥散

四磨湯

抽薪飲

女人邪交

婦人經閉

婦人乳癰

乳上生癰

陰中生風

氣癥

六君子湯

五味異功散

和胃飲

化肝煎

抑扶煎

六安煎

廊清飲

瀉川煎

婦女異疾

崩中漏下

乳癰神方

又方

四君子湯

四物湯

五福飲

木香調氣散

木香順氣散

搜風順氣丸

桃仁承氣湯

大分清飲

小分清飲

七氣湯

補中益氣湯

六味回陽飲

舉元煎

壽脾煎

歸脾湯

溫胃飲

理中湯

良方交加散

加減四物湯

元胡當歸散

四苓散

穿山甲散

麻仁丸

琥珀膏

調經飲

參朮湯

獨參湯

大營煎

逍遙飲

養忠煎

胃關煎

理陰煎

決津煎

失笑散

三稜丸

奪命丹

仁煎

萬病丸

阿魏膏

大補元煎

參歸湯

六味地黃丸

八味地黃丸

加味逍遙散

芩朮二陳煎

丁香茯苓湯

天台烏藥散

通瘀煎

五苓散

荔枝散

活痰丸

赤金丹

炭痞方

治胎前產後各症

胎元飲

固胎煎

涼胎飲

滑胎煎

保胎散

煖胎煎

催生救苦

胞衣先破不產

交骨不閉

產門不閉

逆產橫生

胞乾難產

產後血暈氣脫辨症

傷胎生死俱安

胎墜

保小產秘方

產門不閉

產後子宮不收

產後中風

產後血攻

產後不語

產後語狂

產後腸出不收

產後口噤

產後驚風

產後空肚痛

產後霍亂

產後血虛發熱

產後舌出

產後腸癢

產後嗽喘

胞衣不下

腹中兒啼

橫產手足先出

臨產傷陰成淋

產後陰翻

裂胞生

胎動見黃水

孕婦患淋

橫生逆生灸法

胞衣不下簡便方

胎前瘧疾

下乳方

乳小

產後乳汁自流

乳流回乳

乳癰初起

乳頭破裂乳癰

產後血熱發熱

產後虛寒受風

倒生口噤

生產困悶

胎腫

熱病胎死

傷胎血結

子死腹中

胞破不生

月數未足胎死產危

產後貞血

產後陰腫

產後口乾舌燥

產後血閉

血逆上攻

產後下血

產後瀉血不止

胎漏

產後嘔逆

產後氣逆

產後咳逆

產後腰痛

產後發喘

產後腹痛如絞

產後受寒腹痛

產後心驚欲死

產後肉線

產後淋瀝

產後遺尿

產後迷悶

墮胎下血

產後血衝

產後血脹

產後血攻

產後崩中

產後痲痛

產後下痢

產後血痢

產後痲渴

產後虛羸

產後煩燥

孕婦咳嗽

胎上衝心

胎動腹痛

妊娠腹痛

妊娠胎動

妊娠傷寒

妊娠風寒

妊娠腰痛

臨產下痢

保產神方

毒藥墮胎

子宮脫下

產後血痛

產後血塊疼痛

產後下痢

產後狂言

產後乳懸

產後吹奶

產後尿血

產後尿閉

產後乳癰

產後腹痒

妊娠下痢

子爛

子懸

子煩

子淋

孕婦舌血

產後流尿

產後血昏

勸乳成癰

兒咬破乳

安胎奇方

治小產方

雞爪風

孕中有癰

附臨產要方

霹靂奪命丹

佛手散

加味川芎湯

易簡斤扁

目錄



當歸補血湯

生化湯

產後用生化湯加減法

汗多

寒嗽

傷食

傷肉食

傷冷食

血崩形脫

血崩不止

痰多

足冷

氣促

氣悶

泄瀉

紅白痢

初產七日內痢

噤口痢墜下絞痛

大便不通

大便不禁

少食

妄言見邪

渴

小便閉

遺尿

塊痛

發厥

產戶感風作痛

四肢麻木

潮熱睡中驚語

右噤手足牽搐類中風

因怒吐血

四肢逆冷泄痢類傷寒陰症

遍身痛

霍亂

面目四肢浮腫

塊痛感寒吐衄痛

似瘧頭有汗不及身足

產後時疫

泄瀉

過表傷胃

血暈

陰門突出

室女經閉

治婦女各症

當歸尾二錢沒藥二錢為末紅花

北飲之一日一服服數日後日通

經水不通

茜根一兩煎紹酒服之一日即通甚效

又方

用石榴根一把向東者炙乾水二碗濃煎一碗空心熱服之再服自通或用薏仁根一兩水煎服之亦效

又方

凡婦女月經不通腹內積聚虛脹雷鳴四肢沉重者用高地虎杖根剉二斛水二石五斗煮取一斗半去滓入醇紹酒五升煎如飴每服一合

又方

凡婦女月經不行已久臍腹疼痛腰腿沉重寒熱往來者用白芥子二兩為末每服二錢紹酒溫熱食前調服

又方

凡月經數年不通面色萎黃唇口青白腹內成塊肚上筋起腿脛腫脹者用桃樹根牛蒡根馬鞭草根牛膝蓬蘽各一斤剉以

水三斗煎一斗去滓更以慢火煎如飴狀以瓦器盛之每日用

熱紹酒隨量調服一匙或用乾漆一兩煨大生地二十兩為丸

月經久閉

每日服三錢熱酒調下亦化

蠶沙四兩用砂鍋炒半黃色入無灰酒一壺煮沸澄去沙每日

溫服一盞即通

月經不調

片久而無子者乃衝任伏熱也

用熟地黃半斤當歸二兩黃連

一兩並以好紹酒浸一夜焙研為末煉蜜為丸如梧子大每服

三四錢米湯及溫酒吞服均可

又方

凡血臍冷痛者

用製附子去皮三不當歸三不水煎溫服甚效

經閉驗胎

凡經水三月不行驗胎有無法

用生芎一二錢陳艾三四分空

心煎服一匙腹內微動是有胎不動者非胎也

月信澀滯

蘘荷根半斤細切水煎取二升空心大酒溫服

經行不止

紅雞冠花晒乾為末水煎酒引每服二錢忌三日魚肉葷腥

又木賊炒三不水一盞煎七分溫服日一次

又方

陳蓮蓬壳燒存性研末開水調服每服二錢或用生地黃五錢

好紹酒一小杯水煎服每日二服自止

經時腹痛

凡經水未來之先肚腹脹痛者此乃血氣凝滯也一用烏藥砂仁

又方

延胡索炙甘草及木香製香附檳榔七味各五分同煎服

凡痛重脹輕者用烏藥一錢延胡索一錢當歸三錢赤芍一

二錢生地三錢丹皮八分三稜五分莪木五分官桂八分劉寄

奴五分同煎服

當歸四錢酒炒白芍五分炙甘草五分桂枝五分同煎服

經後腹痛

凡經水未及三旬而至者此乃血熱也但須辨血色以治之方

先期血多色紅而濃者用當歸三錢川芎八分生地黃三錢

炒白芍二錢黃芩一錢黃連三分煎服若血多色紫有塊者

用熟地四錢當歸三錢川芎一錢炒白芍二錢桃仁用須棟去

十四粒紅花四分同煎熱服若先期血少色淡而稀者用川

芎一錢當歸四錢熟地三錢炒白芍二錢桂心後下同煎服

後期行經

凡經水已過三五日始至者此乃血滯也用川芎一錢當歸

三錢四錢生地三錢酒炒白芍二錢桃仁七粒紅花七分香附

子一錢莪木八分甘草五分木香五分木通一錢同煎服

乾血氣痛

凡婦人血氣不行上衝心膈變為乾血氣者用絲瓜一枚燒存

易簡新編

卷二

二

又方

性研末空心温酒調服

用錦紋大黃

四兩

浸好紹酒晒乾為末好醋一升製香附

五錢

熬成膏為丸如決子大卧時酒化一丸調服大便利一二行紅

漏自下此乃調經仙藥也

婦人血厥

凡婦女平居無病忽如死人身不動搖目閉口噤或微知人事眩

胃移時方醒此名血厥又名鬱胃蓋以汗多血少陽氣獨上氣

塞不行故身如死氣退血還陰陽復通故移時方醒婦人每多

此症急用當歸一兩人參二錢炙甘草一錢半水煎服如

無人參真西潞參八錢亦可

婦人血結

凡小腹滿如礮狀小便微難而不渴此乃水與血俱結在血室也

用大黃二兩甘遂一兩陳阿膠一兩水一升半煮半升頓服其

血結自下

大黃一兩酒二升煮十沸頓服一瀉即愈

沒藥末一不紹酒温服即止

婦人血暈

凡婦女血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事者用蒼耳草

婦人血癖作痛

婦人血風

嫩心陰乾爲末以紹酒燉服一錢其功甚效此物善通頂門連

腦蓋

老婦行經

凡婦人五十外經水不止者作敗血論 用茜根一兩陳阿膠

側柏葉五不炙黃芩五不生地黃一兩胎髮一核燒灰分作六

帖每帖水一盞半煎七分入髮灰服之

經閉容枯

凡女子經閉形容枯槁 麥冬去心六斤熬成膏此方惟血熱及

衝任伏熱者 用燈心七根沖湯調服若陰虧虛寒者勿服

月經久閉繼

凡經從口鼻逆行者先以京墨磨汁調服止之 次以當歸尾三

紅花三不水一大盞半煎八分碗溫服即通 或用魚膠切炒

新棉花燒灰每服二錢米湯調服即愈 或用韭菜搗汁一盞

入童便半盞燙熱服即止

婦人肌熱

凡血虛者 黃土炒白朮一兩茯苓一兩炒大生地一兩酒炒白

芍一兩 生甘草五不爲末以大黑棗十四個生薑三大片煨煎

湯調服

調經酒

凡婦人經水不調氣血乖和不能受孕或生過一胎停隔多年多

丹參散

服此酒自能調經受孕或產後無一他病服亦神驗 方用全當歸五兩以行血養血遠志肉五兩生甘草三兩洗一二次以散血中之滯行氣消痰 右二味用稀布袋盛之以甜三白酒十斤如無好者陳紹酒亦可浸過七口晚上溫服慎無間斷將要服完再製經調乃止

凡婦人經脉不調或前或後或多或少產前胎氣不安產後惡血

不下兼治冷熱癆腰脊骨節疼痛心煩等症 丹參四兩洗

淨切晒研末每晚服二錢好紹酒調下溫服 如氣寒者前方

不可服 用大熟地二兩全當歸五兩川芎一兩炒杜仲四兩

龍眼肉五兩用紗袋盛之浸好紹酒一斤溫服每口隨量飲之

吃完再製

婦人血崩

葶薺一歲一個燒存性研末酒調服之或用老母猪尿晒乾酒

服三錢或用舊敗蒲席燒灰酒服二錢或棉花子炒一兩柏葉

焙三錢共研末每服三錢效

凡諸藥不效者 方用杏仁黃皮燒存性為末每服三錢空心酒

燉服此方最驗 或白扁豆花焙乾為末每空心服二錢炒米

煮飲入鹽少許調下即效

凡血崩心腹痛甚者用蒲黃三四五靈脂三四二味煎服好

陳醋調服名失笑散若再血崩不止地榆一兩醋和水煎露一

夜次早溫服立止

百草霜三陳京墨磨濃一桃枝嫩抄三楊枝嫩抄三則用

嫩搗爛用沙糖煎化調服立止

凡因血熱致崩者海螵蛸去甲研末三大生地一兩煎湯調服後

即止

凡水虧火旺氣不攝血以致血崩不止者大熟地一陳阿

膠蛤粉炒成珠三四醋炒陳艾七八淡附子一二此能引火歸

源也同煎涼服

烏梅七個連核燒灰存性研末白開水調服止後再用蓮子四

燒灰香附八炒研為末每服二錢淡醋湯調服

海螵蛸去甲研末五水濃煎汁服效 或用舊摺燒灰每日服二



赤白帶年久

不止

白帶白帶

白帶

血淋

調經奇驗

錢紹酒温服白帶用白舊穗赤帶用紅舊穗

貫仲一個全用刷淨毛切塊好陳醋醱濕煨火炙熱研末每服

二錢空心米湯調服立效 或石燕一枚磨水服立效

風化陳石灰一兩白茯苓三兩共為末糊九桐子大空心米湯

下每服二三十九 用灰無害愈陳愈好屢試屢驗

馬齒莧不論多少搗汁三鍾雞蛋清二個調燙温服再服即止

不論老少孕婦皆可服之 凡此多因七情內傷或下元虛冷

所致沙參為末每服二錢米湯調下

白雞冠花不拘多少燒灰存性米湯調服每日三錢數日即止

當歸好紹酒浸洗陳皮七分川芎八分白芍紹酒炒元胡紫醋

七分大熟地一不五分吳茱萸淡水泡去黑水去香附紹酒炒

分白茯苓八分丹皮七分同煎服經自調暢如經行先期色紫

者此血滯伏熱也前方加條芩紹酒炒如經行後期色淡有

此血虛兼寒也前方加真蘇桂心五分炮薑五分陳艾醋炒生

薑一大片水一大碗煎至八分空心温服渣再煎臨卧時燉服