

秦皇士傷寒大白 卷三

無汗 自汗 頭汗 盜汗 懊懷 不得卧 發黃 面赤色

胸滿 脅滿痛 心下滿 結胸 痞滿 咳逆 哕逆 腹痛

傷寒大白卷一目錄

傷寒熱病總論

驗舌色

驗唇口論

驗二便論

辨脉論

南北方宜發表不同論

南北方宜清裏相同論

三陰熱病論

三陰寒病論

陰症似陽論

陽症似陰論

宜發表忌發表論

宜清裏忌清裏論

宜和解忌和解論

宜吐法忌吐法論

宜溫經忌溫經論

宜攻下忌攻下論

宜消導忌消導論

宜補虛忌補虛論

誤下不宜再下論

惡寒發熱

寒熱症身痛

頭痛項強

咽痛

傷寒大白卷二目錄

似瘧

潮熱

煩燥

譫語

發狂

嘔吐

喘逆

身重

身癢

頭眩

口渴

口燥

唇焦

衄血

畜血

下血

傷寒大白卷三目錄

無汗

痞滿

自汗

咳逆

頭汗

呃逆

盜汗

腹痛

懊懷

不得卧

發黃

面赤色

胸滿

脅滿

心下滿

結胸

傷寒大白卷四目錄

下痢

小便

大便

合病

併病

壞症

附昏冒

熱入血室

不語

發斑

溫病

疫病

夾食

瘧病

陰陽厥

足冷

傷寒大白卷三

雲間秦之楨皇士纂著

無汗

傷寒論無汗者九不得汗者四。不汗出者一。明理論陶氏書。惟寒邪一條失之。太簡。以無汗為表症居多。則可以無汗為止。是寒邪則不可。傷寒論太陽症無汗。發熱身痛。手足冷。脈浮緊。冬用麻黃湯。太陽中風。脈浮緊無汗而煩躁。乃營衛兩傷。冬用大青龍湯。陽明症頭痛鼻乾。脈浮無汗而喘。冬用乾葛湯。此皆是寒邪在表而無汗。用發表者。若陽明症無汗。身必發黃。茵陳梔子豆豉湯。陽明無汗。渴欲飲水。無表症者。白虎湯。此皆熱邪在裏而無汗。用清裏者。又云結胸症。但頭汗。用大陷胸湯。但頭汗。身發黃。用茵陳湯。心中懊懣。但頭汗。梔子豆豉湯。此水飲內結而無汗也。又云脈浮而遲。遲為無陽。不能作汗。身必癢。此陽虛人外冒表邪。不能作汗外解。用扶元發汗者。以上皆傷寒門無汗之症也。今有嘔吐惡心。胸膈滿悶。無汗喘急。脈滑不數。此痰結無汗。用二陳湯。導痰湯。有飽

悶。噦氣發熱無汗。右關滑大。此食滯中焦。胃陽不得敷布而無汗。用平胃保和散等。又有發熱惡寒無汗。脈不出。此表邪內伏。用升陽散火湯。又有發熱無汗。寒涼抑遏。而用溫中升散者。凡此皆不得已而推廣治法也。然無汗之症。到底用發散者多。例如脈伏無汗。用升發正也。脈大無汗。而用升發。無得也。即脈細用升發。寒涼抑遏。用升發。痰凝食滯。用升發。皆無礙也。至如雙解散。小柴胡湯。梔子豆豉湯。治表有邪。裏有熱之無汗者。若治脈伏無汗。則內有一半寒藥。而礙表邪。若治胸滿痰結。寒凝食滯。則內有一半寒藥。而犯凝滯。又如白虎湯。陽明和解發汗者也。而條下註明。表汗未出。表症尚在者。未可服。唇口乾渴。不能消水。脈不數大。亦未可服。夫石膏湯尚如此。則黃連大黃更不宜矣。惟熱鬱火閉之無汗。不忌寒涼耳。然無汗症。第一在脈上消息。經云。熱病脈躁盛。不得汗。陽脈之極也。死。又云。陽病而見陰脈者。死。今細詳陽脈躁盛。無汗一條。後來不論生死。原能作汗外出。若戰慄而出汗。後氣和者。生。若不戰慄。洋洋汗出。氣粗口張。隨汗而死。若陽症脈陰。無汗一條。則胃陽不足。津液內涸。到底無汗而死。

者多。大凡發熱無汗之症。必得汗多。則身熱方解。以其熱在皮膚。無汗。則熱邪何處發泄。故治無汗發熱。不論日數。須善為發汗。要知麻黃桂枝。但發冬月未鬱熱之寒邪無汗。不可用於三時熱令。羌活湯。乾葛柴胡湯。能發在表無汗。不能發在裏火閉無汗。滑石石膏。能發在裏火閉無汗。不能發在表無汗。淡豆豉。白豆蔻。能辛散中焦。抑遏無汗。不能發皮毛閉鬱無汗。枳殼木通。能發大小便下竅不通無汗。不能發在外表邪無汗。桑白皮地骨皮桔梗。能發肺氣壅遏皮毛無汗。不能發他經閉鬱無汗。仲景發表加杏仁。妙以開潤肺之皮毛。亦發汗良法。是以發汗。亦有理肺氣而出者。然治無汗。必要互看頭汗條者。桂枝湯本為解肌。若其人脈浮緊發熱。汗不出者。不可與也。當須識此。勿令誤也。

此以下五節。皆寒邪在表無汗。北方冬月。用麻黃以發汗。故曰。桂枝湯不可與也。

太陽病。頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風。無汗而喘者。麻黃湯主之。

此條承明上章發熱無汗之症。不可與桂枝湯。宜麻黃湯。詳註惡寒頭痛。太陽中風。脈浮緊。發熱惡寒。身疼痛。不汗出而煩躁者。大青龍湯主之。

此條承明營衛兩傷。不可與麻黃湯。宜用大青龍湯。詳註煩躁。

太陽病。脈浮緊。無汗發熱。身疼痛。八九日不解。表症仍在此。當發其汗。服藥已微除。其人發煩熱。目瞑。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。麻黃湯主之。此條詳註衄血。麻黃湯主之一句。在當發其汗下。

太陽病。脈浮緊。發熱。身無汗。自衄者愈。

太陽病。脈浮緊。發熱無汗。當用麻黃湯。因其人正氣旺。未服麻黃湯。而汗自出。病愈。此申明上章太陽無汗症。若自衄乃解。不必再用麻黃湯也。

傷寒脈浮。發熱無汗。其表不解。不可與白虎湯。若渴欲飲水。無表症者。白虎加人參湯。

上半節言無汗之症。宜發汗。戒用白虎。下半節言渴欲飲水。無表症者。忌發汗。宜用白虎。

陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必發黃

陽明病無汗小便又不利則溫熱抑遏不得發泄故心中煩悶懊憹濕熱久鬱身必發黃此條不立一方而暗示陽明無汗四條治法無汗表熱乾葛防風湯發表一法也無汗小便不利猪苓湯清利一法也無汗心中懊憹梔子豆豉湯治煩一法也無汗身發黃茵陳湯治黃一法也

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從耳目出名下厥上竭為難治

此條少陰傳經裏熱症醫見其手足冷而無汗絕似傷寒表邪未伸誤用麻黃桂枝辛溫強散其汗則血得熱而妄行或從口鼻耳目而出

大青龍湯 見煩躁 乾葛湯 見似瘧

茵陳梔子豆豉湯 三味

此陽明熱痰在內蒸發黃家祕加乾葛防風兼散表鬱則全內外分消之治

白虎湯 見潮熱 小青龍湯 見咳嗽

補中益氣湯

人參 白朮 當歸 黃芪 陳皮 柴胡 升麻 甘草

表邪閉鬱而無汗純用發表中氣虛微不能作汗則用此方家秘加荊芥防風治勞力感冒

二陳湯 導痰湯 二方見似瘧 平胃散 見譚語

升陽散火湯

升麻 葛根 獨活 羌活 人參 柴胡 防風 甘草 白芍

表邪內伏寒冷抑遏發熱無汗手足反冷此邪熱不得發越故用火鬱發之消滯升陽湯

厚樸 半夏 枳殼 廣皮 升麻 葛根

陽明無汗胸前飽悶必是胃家有痰飲食滯故用半夏枳樸以消胃滯再加升葛宣發表邪

雙解散 見發狂

純是表邪無汗。則用發表。若表有邪裏有熱。則用此方雙解。

小柴胡湯 見惡寒頭痛

三陽表有邪裏有熱者。用前方雙解。少陽表有邪裏有熱。則用此方。

理肺發表湯 家秘治肺氣抑遏發熱無汗。

羌活 獨活 柴胡 乾葛 枳桔 桑皮

平胃發表湯 家秘治胃氣抑遏發熱無汗。

羌活 獨活 柴胡 乾葛 枳樸 半夏

仲景首條。立麻黃湯。治無汗發熱。氣逆喘滿。用杏仁。默示肺主皮毛。肺氣壅遏。

則喘逆無汗。開發潤肺氣。為發汗之真訣。又桂枝湯下云。服藥後食稀粥。以助

藥力。此默示發熱有汗。必是胃無凝滯。故可食稀粥。以助藥力散邪。若發熱無

汗。必是胃有凝結。不能作汗。故開發胃主肌肉。疎利胃陽。為發汗真訣。又於頭

汗條中。申明但頭有汗。遍身無汗。皆係水飲淤熱凝結中焦。隔絕週身之道路。

治宜宣發胃氣。疎通經絡。細玩麻桂宜北不宜南。故家秘化立敗毒散方法。加

枳桔桑皮名理肺發表湯治風寒壅肺發熱喘逆無汗之症此從麻黃杏仁方中化出治法又以敗毒散方加枳樸半夏蒼朮名平胃發表湯治痰涎食滯胸滿發熱頭痛身痛無汗之症此從太陽病有表症心下水飲用小青龍湯辛散水飲敷布胃中則內伏之水飲作汗而出外冒之表邪隨汗而解此一舉兩解化法用方之妙悟也

### 自汗

太陽症自汗出發熱不解惡風脈浮緩此風傷衛宜解肌仲景用桂枝湯家秘用羌活防風湯若太陽發熱自汗口渴小便不利此熱結膀胱仲景用五苓散家秘用羌活木通湯若太陽表邪已解自汗發熱口渴不惡寒此陽明裏熱自汗宜用涼膈散三黃石膏湯導赤各半湯若大便不通腹脹多汗脈沉而數此乃下症自汗也宜用三承氣湯仲景下法獨詳自汗條內者以下法最怕表症不散今自汗則表邪多解以上論冬令傷寒然亦可參治四時者外有汗自出身仍發熱之冬溫有自汗出發熱不惡寒而渴之溫病有發汗已身灼熱之風溫

有汗出身熱口燥渴之暑病有自汗出身灼熱煩悶口渴長幼相似之溫疫此皆四時有汗之寒熱病而非冬月傷寒自汗症也傷寒初起裏未鬱熱用辛溫散表若三時寒熱病裏先有熱後感風寒在表者用麻桂則礙裏熱故化立辛涼散表和解表裏兩法發散太陽羌獨敗毒散和解太陽羌活冲和湯發散陽明升麻乾葛湯和解陽明乾葛石膏湯發散少陽柴胡防風湯和解少陽小柴胡湯若表散裏熱仍照傷寒清裏之法太陽病欲解時從巳至未止

此言太陽時候也巳午主太陽故太陽病多發辰巳時太陽病欲解必過辰巳午時至未方解也

欲自解者必當先煩乃有汗而解何以知之脈浮故知汗出解也

此明太陽病欲解當必其脈浮先煩知其汗出而解

太陽病發熱汗出惡風脈浮者名為中風

此條言發熱汗出脈浮緩乃是風傷衛之中風症以無汗有汗分別中風傷

寒

太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者。熱自發。陰弱者。汗自出。啻啻惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。桂枝湯主之。

承明太陽中風。因衛之陽分有邪。故脈浮緩。營之陰分無邪。故不緊而弱。衛陽有邪。則發熱。營弱無邪。則不閉鬱。而汗自出。言翕翕發熱。形容表邪拘緊之象。鼻鳴喘逆。表邪氣粗也。乾嘔者。表邪嘔惡也。故用桂枝湯。急解風邪。太陽病。頭痛發熱。汗出惡風者。桂枝湯主之。

此申明頭痛發熱。自汗之中風。宜桂枝湯者。

病人藏無他病。時發熱自汗出而不愈者。此為衛氣不和也。先其時發汗。則愈。宜桂枝湯主之。

藏無他病。言無裏症。但時有發熱自汗表症。此衛氣有病。當未發作時。先服桂枝湯發汗。則愈。

病當自汗出者。此為營氣和。營氣和者。外不譫。以衛氣不共營氣和諧。故爾。以營行脈中。衛行脈外。復發其汗。營衛和。則愈。

此重明自汗出之病。營分本無病。因衛外之衛氣不諧和於營氣。服桂枝湯以和諧營氣。則病愈。

發汗後不可更行桂枝湯。汗出而喘。無大熱者。可與麻黃杏仁甘草石膏湯主之。發汗後飲水多者必喘。以水灌之亦喘。

大凡汗出而喘。似太陽中風桂枝湯症。深恐誤用桂枝。故曰若發汗後不可更行桂枝。即自汗喘熱之表症。若身無大熱。但可用麻黃杏仁甘草石膏湯。蓋麻黃與石膏同用。化辛溫而為辛涼。麻黃同石膏。不惟散表。兼能清肺定喘。石膏得麻黃杏仁。不惟清肺。兼能散表。又云發汗後飲水多。必水寒射肺而喘。若水灌之。則外閉毛竅。亦必喘。

下後不可更行桂枝湯。汗出而喘。無大熱者。可與麻黃杏仁甘草石膏湯。

前條發汗後。汗出而喘。無大熱。不可更用桂枝。此條下後汗出而喘。無大熱。亦不可更行桂枝。亦可與麻黃杏仁甘草石膏湯。兩條汗下不同。然汗出而喘。無大熱。則同。

傷寒發熱汗出不解。心下痞硬嘔吐而下利者。大柴胡湯主之。

發熱汗出不解。心下痞硬下利。此邪走腸胃。宜用下法。然發熱嘔吐。尚非承氣症。故用大柴胡湯。

陽明病。脈遲。出汗多。微惡寒者。表未解也。可發汗。宜桂枝湯。

此申明陽明病。亦有自汗。發熱惡風寒中風者。但以脈遲不浮緩。別陽明也。陽明病。脈浮無汗而喘者。發汗則愈。宜麻黃湯。

此申明陽明病。亦有無汗。寒傷營症。但脈不緊。別陽明也。非教人必服麻桂。當此例用方可也。

問曰。陽明病外症云何。答云。身熱自汗出不惡寒反惡熱也。

此申明陽明病裏熱外症。形象身熱自汗出不惡寒反惡熱者。

陽明病。脈遲。雖汗出不惡寒者。其身必重。短氣腹滿而喘。有潮熱者。此外欲解。可攻裏也。手足濇然而汗。此大便已鞕也。大承氣湯。若腹大滿不通者。可與小承氣湯。微和胃氣。勿令大泄。