

R221.3

1513

黃帝內經素問詳證發微卷四

明太醫院正文會稽序生元臺子

醫學傳

通評虛實論第二十八

評論也。內論病有虛實之義故名篇。

黃帝問曰何謂虛實岐伯對曰邪氣盛則實精氣奪則虛此先明虛實二字之義也言人非無故而實以邪氣盛則實耳邪氣盛者外感也非無故而虛以正氣奪則虛耳正氣虛者內傷也

帝曰虛實何如岐伯曰氣虛者肺虛也氣逆者足寒也非其時則生當其時則死餘藏皆如此

此舉肺虛一藏其生死必隨乎時而可以例諸藏也肺

主氣氣虛者肺虛也氣逆者氣上行而逆則在下之是
以無氣而寒故此肺虛而非相尅之時則生如春秋冬
是也如遇相尅之時則死如夏時之火是也條藏虛者
其生死亦如此而已夫帝問虛實而伯先以虛爲對未
及於實也

帝曰何謂重實岐伯曰所謂重實者言大熱病氣熱脉滿
是謂重實重平聲後同

此言病有重實之義也大熱爲病邪氣甚熱以後文寒氣暴上脉
補而實照之則此氣熱者邪氣熱也非人之中氣也其脉甚滿是實而又實謂之
重實也

帝曰經絡俱實何如何以治之岐伯曰經絡皆實是寸脉急而尺緩也皆當治之故曰滑則從濇則逆也夫虛實者皆從其物類始故五藏骨肉潤利可以長久也帝曰絡氣不足經氣有餘何如岐伯曰絡氣不足經氣有餘者脉口熱而尺寒也秋冬爲逆春夏爲從治主病者帝曰經虛絡滿何如岐伯曰經虛絡滿者尺熱滿脉口寒濇也此春夏死秋冬生也帝曰治此者柰何曰絡滿經虛灸陰刺陽經滿絡虛刺陰灸陽

此節卽經絡俱實絡虛經實經虛絡實者而擬其脈體決其死生分其治法也經者十二經也絡者十五絡也

虛者卽前精氣奪則虛也實者卽前邪氣盛則實也經爲陽絡爲陰故經中亦有屬陰者而以經並之則經皆爲陽絡中亦有屬陽者而以經並之則絡皆爲陰寸部爲陽尺部爲陰急脈爲陽緩脈爲陰滑脈爲陽濇脈爲陰脉熱爲陽脉寒爲陰今寸部急而見陽是經實也尺脉緩而見陰是絡亦實也所謂經絡俱實也必其急緩之脉帶滑則爲順而生帶濇則爲逆而死何也大凡物類皆有虛實必滑澤則生枯濇則死非特脈爲然也故五藏骨肉滑利所以其脉亦滑可以長久而生也若五藏濇滯則其脉亦濇必不能長久而死矣何以異於物

類也哉其有絡氣不足經氣有餘是絡虛經滿也惟經氣有餘故肺口熱惟絡氣不足故尺部寒春夏屬陽合經與寸秋冬屬陰合絡與尺惟脉口熱而尺部寒故時逢秋冬則陰氣盛而脉口不宜熱熱爲逆而死時逢春夏則陽氣高而脉口宜熱尺中宜脉皆爲順而生卽主病者而治之何經有餘則寫之何絡不易則補之其有經氣不足絡氣有餘者卽經虛絡滿也滿者實也唯絡脉滿故尺部亦熱滿惟經脈虛故脉口亦寒濇春夏應經與寸所以寒濇則死秋冬應絡與尺所以熱滿而生不言治主病者卽上文可以例推也治主病者何如絡

爲陰今滿則灸之虛則刺之經爲陽今滿則灸之虛則刺之由此觀之則大抵灸主於屬而刺則可補也

帝曰何謂重虛岐伯曰脉氣上虛尺虛是謂重虛帝曰何以治之岐伯曰虛謂氣虛者言無常也尺虛者行步恒然

脉虛者不象陰也如此者消則生濇則死也

按甲乙經作脾虛脉之下

缺一虛字氣虛氣之下多一上字尺虛三者並虛爲當故下文以氣虛尺虛脉虛爲答詳上文重實以氣熱脉滿爲重實此節脉虛氣虛尺虛爲重虛者甚有理不但尺上但虛爲重虛也王氏似未當還以甲乙經爲的

此言病有重虛之義也脉虛氣虛尺虛謂之重虛氣虛

者真氣不足也故脉動無常尺虛者腎氣不足也故行步惟然脉虛者手太陰寸口所見之脉按之不應手也

如此三虛是謂重虛若帶滑利則生否則滯而死矣
帝曰寒氣暴上脉滿而實何如岐伯曰實而滑則生實而逆則死

此言氣寒而脉實者亦以滑爲生而滯爲死也帝言上文氣熱脉滿已謂重實必滑則從濶則逆今者寒氣暴上脉亦盛滿與氣熱脉滿者異其於滑濶逆從生死何如伯言不問寒熱正論滑濶雖因寒而實必其脉滑而爲順則生脉滯而爲逆則死也

帝曰脉實滿手足寒頭熱何如岐伯曰春秋則生冬夏則死

此卽脉證雜見陰陽者而以時決其死生也。脈實滿者是陽脈也。頭熱者是陽證也。皆邪氣有餘也。手足又寒是陰證也。乃真氣又虛也。若此者真邪不分。陰陽相雜。然春秋者陰陽未盛之時也。正平和之候故生。冬夏者偏陰偏陽之時也。脈盛頭熱者不能支於夏。手足寒者不能支於冬。故死。

脉浮而濶濶而身有熱者死

此言諸與脉反者死也。脉浮而濶乃肺脉之應於秋者也。而身有熱則火盛。金衰主死。此前後無問答之語。疑爲錯簡也歟。

帝曰其形盡滿何如岐伯曰其形盡滿者脈急大堅尺濶而不應也如是者從則生逆則死帝曰何謂從則生逆則死岐伯曰所謂從者手足溫也所謂逆者手足寒也

脉字當下當

有口字

此言陽病者當得陽脈陽證也身形盡滿乃陽病也氣口之脈急大而堅是陽脈也宜尺部則濡而不相應耳然必手足溫者是陽證也故有是脈有是證則爲從而生否則脉雖急大堅而手足反寒是謂逆而死也

帝曰乳子而病熱脉懸小者何如岐伯曰手足溫則生寒則死帝曰乳子中風熱喘鳴肩息者脉何如岐伯曰喘鳴

石患者脉實大也緩則生急則死

此言孔子脉與病反者復有他證可驗病證俱甚者復有脈體可據而決其死生也。孔子而病熱陽證也。而脉則懸小是陽證見陰脉也。然手足溫和正氣猶存。脉雖懸小特未大耳故可以得生。否則手足寒而死矣。又孔子中風發熱喘鳴有息者陽證也。脉當實大。惟實大中而緩則邪氣漸退可以得生。若實大中而急則邪氣愈增其病當死矣。

帝曰。腸澼便血何如。岐伯曰。身熱則死寒則生。帝曰。腸澼下白沫何如。岐伯曰。脉沉則生脉浮則死。帝曰。腸澼下濃

血何如岐伯曰脉懸絕則死滑大則生帝曰腸澼之屬身不熱脈不懸絕何如岐伯曰滑大者曰生懸濇者曰死以藏期之

此言腸澼之屬有便血者有下白沫者有下膿血者隨證隨脉而可以決其死生也腸澼者大小腸有所辟積而生諸證故腸澼爲總名而下三者爲諸證也生氣通因而飽食筋脉橫解腸澼爲疾所以亦川便血者大便陽澼二字太陰陽明篇亦云久爲腸澼中下純血也有等俗名腸風下血有糞前來者爲近血是腎肝有火糞後來者爲遠血是心肺有火今茲腸澼便是血爲陰而下血爲陰證若身熱則火血既下血皆是盛故主死身寒則火衰故主生其下白沫者非膿非血

而白沫下行是肺氣受傷也然亦陰證之類故脉沉則生以陰證宜見陰脉也若脉浮則死以陰證見陽脉也其下膿血者赤白相兼氣血俱傷

靈樞邪氣藏府病形篇謂之瘕泄難經謂

之大瘕泄後世曰痢

然脉以懸絕爲死正氣不足也滑大則生王

氣有餘也帝問凡腸澼之屬有身不熱則證不死脉不懸絕則脉不死伯言終當以元氣爲主故脉必滑大則

生若懸濇則死其死者以藏期之所謂肝見庚辛死心

見壬癸死肺見丙丁死腎見戊己死脾見甲乙死者是也

按脈訣云下痢微小却爲生脉大浮洪無瘥日今属此疾亦有滑大而生沉小而死者其濇大謂邪

當以經言爲的也

帝曰癲疾何如岐伯曰脉搏大滑久自己脉小堅急死不治

此言癲疾之脉得陽脈虛脉而生也癲疾者陽證也故搏大滑則陽證得陽脈所以病久自已若脈小堅急則

得陰脈故死不治然癲疾之脉當有取于虛也必搏大

滑中帶虛可治若帶實則邪氣有餘乃死候也

脉訣云恍惚之

病定癲狂其脈實牢保安吉寸閑尺部沉細時如此未聞人救得正與此大義相合又按長刺節論第十一節則刺狂癲有法又以靈樞癲狂篇考之則義無餘蘊矣

帝曰消癰虛實何如岐伯曰脉實大病久可治脉懸小堅

病久不可治

此言消癰之病得陽脉而生也消癰者熱證也故脉實

大雖病久亦可治若懸小堅又至於病久則益不可治

矣

脈要精微論云癰成爲消中靈樞五變論消癰可參看

帝曰形度骨度脉度筋度何以知其度也

方盛衰論云診有十度脉度藏

度肉度筋度俞度又按靈樞有骨度脉度篇名而又有經筋篇名至於形度則無之今帝以爲問而下文無答語乃他篇

之錯簡也

帝曰春亟治經絡夏亟治經俞秋亟治六府冬則閉塞閉

塞者用藥而少鍼石也所謂少鍼石者非癰疽之謂也癰

疽不得頃時回

取音揅塞大聲

此言三時治病各有所宜而冬時則用藥而不用鍼也

春時治病治其各經之絡穴夏則治其各經之俞穴秋
則治其六府冬則閉塞但用藥而不用鍼石所謂冬時
少用鍼石者非謂冬時癰疽亦不用鍼石也彼癰疽不
得墮刻挽回若不用鍼石以寫之則內爛筋骨藏府豈
得不用鍼石哉特謂他病則冬時不用鍼石耳

癰不知所按之不應手乍來乍已刺手太陰傍三痏與纓
脉各二腋癰大熱刺足少陽五刺而熱不止刺手心主三
刺手太陰經絡者大骨之會各三暴癰筋綱隨分而痛魄
汗不盡胞氣不足治在經俞肩音貽腋同軟同

此承上文而言治癰之法有此三等也凡癰疽痛無定

所故按之不應手亦無定時故乍來而乍已當刺手太陰肺經之傍三痏蓋肺經之穴在胷中者曰雲門今曰肺經之旁則是足陽明胃經氣戶等穴也刺瘡曰痏三次者三次也刺瘡者三其曰纓脉各二者亦以胃經

刺三次，則有
瘡者三。

其曰纓脉各二者亦以胃經

之穴。如人迎水穴，在結喉旁一寸五分，則是結纓之所。

故曰纓脉。各二者。左右各二也。有等腋下生癰。其體大

熱當刺足少陽膽經之穴五竅宜是膽經之淵液穴也

腋下三寸宛宛中舉臂得之鍼三分禁灸

若刺

包絡經卽手心主之穴三指宜是天池穴也

腋下二寸

鍼灸一壯又刺手太陰肺經

之經穴經渠

陷中鍼絡禁灸