



時疫辨卷三

候官林慶銓藥叟述

男象樞校刊

新會區德森子靜箋

瘟有九種

疔瘡瘟

即今之鼠疫也。邪毒分布三焦，有推牆倒壁之猛。

瓜瓢瘟

此症與疔瘡病相近，來呼為標蛇者，即此亦相同。

林藥樵曰：疔瘡、瓜瓢二症，內非不病而特現于外耳。

吳又可曰：瓜瓢瘟、疔瘡瘟，緩者朝發夕死，急者頃刻

而亡。此又諸疫之最重者。

紫雪丹爲核
症要藥羊城
廣芝館有之
若起惡核者
脈多不對証
當從核治不
可從脈治
子靜補箋

按溫邪本五行之毒鬱結成精。事詳于文帝全書。非
妄誕無稽之談也。故其毒之發。直搗三焦。五液立竭。
病家手足荒亂。往往兩誤于藥。或誤于藥之雜投。或
誤于藥之遲進。有心救世者。擇其妥方。配定藥料。施
送與人。茲將三辨分詳于後。

辨脈。或急數。或雀喙。或寸口熱如火灼。或六脈沉
伏不見。以上怪脈。確是此症。若遲緩浮緊。或夾風
寒。不可錯認爲此症也。

辨症。或寒熱交作。或先冷後熱。或頭痛如裂。

或譫語或狂亂。或默默不語。兩脇窩痛結核。

兩脇縫痛結核。或如蚊咬風痕而後痛。或喘氣

不絕。或自汗不止。或手足厥冷。或身如火熾。

或目紅面赤而青慘。或腹痛不已。或大吐乾嘔。

或大泄如注。或大渴思水。或煩燥如狂。或

發病失音。或手足冷過節。或痰中見紅。

辨舌。或極黃。或極黑。或白厚如粉。或苔如刺。

生口糜。或舌心黃黑而厚。要分別下藥。庶不張冠

李戴。要參看四家疫治撮要。

喻氏治疫以解毒為主卽又可之專用大黃葉氏之金汁銀花同用松峰之青蒿綠荳皆此意也子靜補箋

用以開竅使經絡無痰瘀阻礙則疫氣難留

此症脈象變幻無常。可據而不可據。不可據而可據。

李東垣普濟消毒飲

見上卷第六頁

統治諸疫之神方。如用之

不應。宜重用解毒方法。瓜瓢瘟亦用涼膈散。

方見第四卷第

二第二卷所立八門變法中有通解五毒等方並周

華亭六方皆可擇用。十八頁後驗方數十條。屢見功

效。不可輕視。

溫疫忌升表外。亦慮陷邪。所以紫雪丹。至寶丹。

牛黃丸。三丸爲此症之聖藥。葉天士用白虎犀角輩。

必加至寶丹幾分。卽此意也。

藥叟案治鼠疫要內外科合參王洪緒林藥樵

第二卷所製

通解五毒飲

與八面通飲

等方甚妙清

熱消毒開堅

破瘀氣分血

分之熱盡解

周華亭六方

是宗又可法

將承氣為主

繼以白虎加

減亦可酌用

子靜補箋

王清任諸書

傷寒由經絡而入太陽溫病由口鼻而入太陰

蓋邪之入鼻氣通於肺口氣通於胃肺病逆傳則爲心

包上焦病不治則傳中焦胃與脾肺主皮毛故毒外發

溫毒外腫水仙花膏主之並主治一切癰毒按水

仙花得金水之精隆冬開花味苦微辛寒滑無毒苦能

降火敗毒辛能散邪熱之結寒能勝熱滑能利疾其妙

用全在汁之膠粘能拔毒外出使毒邪不致深入臟腑

傷人也

水仙膏方

水仙花根不拘多少，剝去老赤皮，與根鬚入石臼搗如膏，敷腫處，中留一孔，出熱氣，乾則易之，以肌膚上生黍米大小黃瘡爲度。

溫毒敷水仙膏後，皮間有小黃瘡如黍米者，不可再敷。

若水仙膏過敷，則痛甚而爛，急用三黃二香散主之。三黃取其峻瀉諸火而不爛皮，二香取其透絡中餘熱而定痛。

三黃二香散方

苦辛芳香法

三黃二香散
敷平常之瘡
則可若敷惡
核未能勝病
另有敷方
子靜補箋

黃連

壹兩

黃柏

壹兩

生大黃

壹兩

乳香

五錢

沒藥

五錢

右爲極細末初用細茶汁調敷乾則易之繼則用香

油調敷

溫毒神昏譫語者先與安宮牛黃丸紫雪

丹之屬繼以清宮湯

牛黃丸紫雪丹二方見卷二八門變法清宮湯見本卷十七頁

拔毒方

拔毒以草薢子之力最大

草薢子

葱頭

酒糟

右三味搗爛熱敷甚效

又方

熊胆

川連

梅片

牛黃

川射

毛姑

共研末用香油敷患處

又外塗方

熊胆

射香

紅升丹

消毒丸

治時疫疔瘡惡症大黃牡蠣燬白礬蚕炒各壹兩右為末蜜丸彈子大每壹丸新井水化

外治法

或用猴棗

用新頂蓋磨水塗之用二三不可多用

或用水蜚螞吸

蓋用蛇精一

個口向核處

吃毒預備人

乳一杯聽用

俟蛇角吸毒

後將蛇口放

人乳中吐出

毒血又將蛇

角吸毒四五

次毒盡核銷

而愈查蛇角

閩粵省城藥

房皆有之

之

法與眉頭所說蛇角治同

或用鐵鉗以攝之

粵東溫病初有武官某用鐵鉗將風核攝散活

人無

數

或用尖刀割之

申報載粵東有某甲生癰自料必死忍痛用刀自割生核

處出毒

血愈

以上外治之法于風癰多奏效如未生癰不

可亂用

光緒乙未後粵省醫疔瘡瘟新出涼膈散諸方茲

樞見

由羊城摘抄十餘則按之極有理路特補登之

雙解散

大黃式錢

芒硝式錢

羌活叁錢

蟬退十式

羌活七分

防風壹錢

薄荷壹錢

芥穗壹錢

當歸壹錢

白芍壹錢

黃連壹錢

連翹壹錢

枝子壹錢

黃芩叁錢

桔梗式錢

石膏六錢

滑石叁錢

甘草壹錢

神解散

羌活壹錢

蟬退五個

神曲叁錢

銀花式錢

生地式錢

木通壹錢

車前壹錢

酒苓壹錢

如起核先服神解散後服

活血解毒散

連翹 叁錢 葛根 式錢 生地 五錢 銀花 叁錢 赤芍 叁錢

甘草 式錢 柴胡 叁錢 桃仁 八錢 只壳 壹錢 當歸 式錢

紅花 五錢 車前 叁錢

溫病陰枯血燥邪熱不退養陰熱自退

又方

生蚌 茶仔 春爛外敷此核 另春蚌汁飲之卽
時見紅氣暈開喉內似有虫行狀口氣更臭異常俟
大便瀉出如痰涎

又茶仔少許加黃糖煎水飲之

草菓

叁錢

知母

叁錢

川朴

貳錢

山甲

叁錢

黃芩

叁錢

龜板

叁錢

甘草

壹錢

鱉甲

叁錢

大黃

五錢

又起核用

水浮蓮

卽豬蓮

艾碎葉搗到極爛加

雄

黃精末

硫黃末

火水

此味最緊要

以上五味和勻再加正大梅片末同敷毒核留小孔

出毒敷後極痛兩點鐘久換藥一次大半日起無數

小泡一日小泡貫成大泡切勿自行刺穿再敷藥一

天其毒盡出轉了白色皮起皺紋不用敷藥再以拔

毒生肌膏藥貼之加梅片末射香做膏藥心孕婦除
去射香自愈

以上新出諸方極驗

看核生十二經穴部位加用引經藥治之甚妙但街上所賣太醫院錢鏡湖所繪人身形經穴圖不甚分明丹溪經絡圖亦簡而未詳用之不準余所試洞天奧旨身形經穴圖爲驗亦甚簡便易曉然惡核在陽

察看核生部位加藥引經法

案十二經脈流注腧穴一定不易之理。察核所生之部分。知某經受病最重。加以某味。則用藥較捷。因內外循脈會穴太多。不勝枚舉。今特刪繁就簡。但採十二經行度部分列後。以備施用。手之三陰。從臍走手。手之三陽。從手走頭。足之三陰。從足走腹。此內經本文也。人之經絡。分布一身。太陽少陰。在身之後。陽明太陰。在身之前。少陽厥陰。在身之側。此丹溪心法也。

穴用藥易愈
在陰穴用藥
多難愈若用
引經藥又藥
勝其病亦或
可愈子靜
補箋

分經絡辨加藥導之去病較速

腰背顛頂連及風府脹痛難忍病在足太陽膀胱經

兩目赤腫唇乾鼻燥腹中絞痛病在足陽明胃經

脇肋腫脹痛連兩耳病在足少陽膽經

腹脹板痛不能屈伸四肢無力泄瀉不已病在足太

陰脾經

心胸吊痛身重難移作腫作脹病在足厥陰肝經

痛連腰腎外腎也小腹脹硬病在足少陰腎經

咳嗽聲啞氣逆發喘病在手太陰肺經

半身疼痛麻木左足不能屈伸病在手太陽小腸經
半身痛脹廢俛仰右足不能屈伸病在手陽明大腸
經

病重昏沉或狂言不省人事病在手少陰心經
或醒或寐或獨語一二句病在手厥陰心胞經

胸腹熱脹揭去衣被乾燥無極病在手少陽三焦經

按十二經受病見症隨症施治其引經藥亦不可少今

通列手足經脈後

手少陰心循手小指內側出其端

手太陽小腸起手小指端循外側上行

手少陽三焦起手無名指端

手厥陰心胞絡又名手心主出中指端

手陽明大腸起手食指端

手太陰肺出手大指端

足厥陰肝起足大指羖毛上

足太陰脾起足大指端

足陽明胃起足次指外間又一支亦入大指端又一

支入中指外間