

武昌醫館叢書

三三

仲景傷寒補亡論目錄

卷第一

傷寒名例十問

敘論五問

治法大要九問

脈法刺法六問

仲景元化五問

卷第二

仲景辨脈法三十八條

卷第三

仲景平脈法四十五條

卷第四

六經統論二十二問

太陽經證治上九十五條

卷第五

太陽經證治下九十一條

卷第六

陽明經證治八十七條

少陽經證治十一條

卷第七

太陰經證治十條

少陰經證治四十七條

厥陰經證治六十三條

卷第八

不可發汗四十條

可發汗五十八條

卷第九

汗後四十四條

不可吐五條

可吐十條

卷第十

不可下四十七條

可下四十八條

卷第十一

發汗吐下後七十三條

卷第十二

病可溫十三條

病不可灸七條

病可灸八條

病不可刺八條

病可刺二十九條

病不可水十條

病可水八條

病不可火十一條

病可火二條

火邪三條

卷第十三

兩感證五條

陰陽交十一條

三陽合病十五條

結胸二十二條

心下痞二十五條

卷第十四

陽毒五條

陰毒七條

發斑十三條

發黃三十條

卷第十五

瘀血圍血便血證十一條

衄血吐血證十條

傷寒狐惑匿病十條

傷寒百合病十四條
傷寒勞復三十二條

傷寒陰陽易病六條

卷第十六

缺

卷第十七

痙溼暍敘論一條
痙瘓證二十六條

溼病十八條
中暍證六條

霍亂證二十六條
虛煩證七條

卷第十八

傷寒溫疫論一條

溫病論六條

風溫溫毒論四條

傷寒相似證論十四條

卷第十九

婦人傷寒證十八條

妊娠傷寒證三十三條

小兒傷寒證十九條

小兒瘡疹上四十七條

卷第二十

小兒瘡疹下十八條

斑瘡癰疹辨一條

仲景傷寒補亡論卷第十四

河南郭雍譔次

陽毒五條

陰毒七條

發斑十三條

發黃三十條

陽毒五條

雍曰傷寒陰陽二毒最爲疾勢重者張仲景有升麻甘草二湯今竟不見於仲景書中惟脈經載其論證二篇千金方中略言之今二湯用藥加減與仲景異同金匱要略復合爲一曰陰毒陽毒升麻鼈甲湯主

之前後諸方書皆無是說然二疾冰炭也用藥正相反諸書之間雖有升麻甘草二湯方味皆同又與要略異以此不能無疑惟活人書二方用藥不同最爲當理第不見活人書升麻湯所出方書想朱氏必有所據今從活人書用二藥

士弱曰二方載外臺秘要云出古今錄驗方

王叔和脈經曰陽毒爲病身重腰背痛煩悶不安狂言或走或見鬼或吐下利其脈浮動大數面赤斑斑如錦文咽喉痛吐膿血五日可治至七日不可治有傷寒二三月便成陽毒或服藥吐下後變成陽毒升

麻湯主之龐氏云又宜葛根龍膽湯雍曰此疾常有之不知治多大吐下血而死雖用助陰去熱藥亦須有解毒在其中則可用

活人書曰陽毒病陽氣獨盛陰氣暴絕必發躁狂言妄走面赤斑斑如錦文咽痛或下利赤黃脈洪實滑促宜用酸苦之藥令陰氣復而大汗解矣葶藶苦酒湯升麻湯大黃散梔子仁湯黑奴丸可選而用之雍曰表裏皆大熱證者宜黑奴丸審知熱在裏不在表以朴消大黃桃人藥下之其物則多服升麻也蓋陽

毒之作甚暴非陰毒比

下原文缺

雷時強人

下原文

缺及小兒便宜用升麻湯豫防其毒

又曰近人治傷寒脈洪大內外結熱舌卷焦黑鼻中如煙煤者則以水漬布薄之疊布數重新水漬之稍挨去水搭於胸上須臾蒸熱又漬令冷如前薄之乃換新水日數十易熱甚者置病人於水中熱勢纔退卽已亦良法也

雍曰置人水中之法勢甚不得已雖可用亦難用須內熱少衰勢未解則可不然水迫外熱併歸于內則

不可支也大抵陽毒狂躁與傷寒下證不同下證只坐臥不安陽毒則必欲起走且有力人不能制雖見江河亦入也亦有偶然得解者非常道也雍曰嶺南治熱瘴取蚯蚓研爛新冷水漬取清汁飲之此未試也蓋說言癩肝治熱不治冷余嘗苦病後潮熱以冷水調少許未服之則止然未嘗用治大熱也漫書之以備用

陰毒七條

叔和脈經曰陰毒爲病身重背強腹中絞痛咽喉不

利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆脣青面黑
四肢厥冷其脈沈細緊數身如被杖五六日可治至
七日不可治也或傷寒病一二日便結成陰毒或服
藥六七日以上至十日變成陰毒甘草湯主之雍曰
要略有咽喉痛字千金二毒並同脈經金匱要略陽
毒之爲病面赤斑斑如錦文咽喉痛吐膿血陰毒之
爲病面目青身痛如被杖咽喉痛此與脈經證同語
異第語簡而易明故重錄之

龐氏曰陰毒之爲病因汗下藥性冷所變多在四五

日也或素表陽氣虛冷始得病便成陰毒或始因傷
寒冷物便成陰毒服甘草湯仍作返陰丹喘促吐逆
者入口便定服藥三五服不退便於臍下一寸半灸
之大炷百壯未愈可至二百壯若手足極冷小便濇
小腹鞭痛囊縮卽須於臍下四寸如前灸之仍用當
歸四逆加吳茱萸湯同返陰丹頻頻與服內外逼逐
亦可解稍緩則死矣其陰毒氣結在小腹故小便濇
切不可用利小便藥有以炒鹽及熱藥熨臍下者其
冷氣在少腹之間被熱物所熨無處通出卽衝上奔

心其死尤速也當須預服溫劑然後熨之非不當熨也

又曰陰毒脈沈微欲絕四肢逆冷大躁而渴不止宜服附子飲子仍下硫黃丸尤妙

活人書曰陰毒之爲病初得病手足冷背強咽痛糜粥不下毒氣攻心腹痛短氣四肢逆冷嘔吐不利身如被打宜服陰毒甘草湯白朮散附子散正陽散肉桂散返陽丹返陰丹天雄散正元散退陰散之類可選用之雍曰升麻甘草二湯觀其用藥性甚緩然諸

家必先用之者以古人治陰陽二毒者惟此二湯故
須用之以去其毒勢而後輔之以他藥也

又曰陰毒本因胃氣虛寒或因冷物傷脾外傷風寒
內既伏陰外又感寒或先感外寒而內伏陰內外皆
陰則陽氣不守遂發頭疼腰重

又曰陰盛傷寒心間煩躁四肢逆冷白朮散返陰丹
皆主之雍曰朱氏返陰丹比之龐氏加附子乾薑桂
心爲六物其灸法先灸臍下一寸閒若其人手足冷
少腹鞭卽更于臍下兩邊各一寸三處齊灸之仍與